

APPENDICE

10.B3

BEVANDE ALCOLICHE E SOSTITUTI (g/ die)

BEVANDE ALCOLICHE E SOSTITUTI**Tabella 1.A.1.1(a)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del gruppo alimentare "BEVANDE ALCOLICHE E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: FEMMINE del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	5	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	5	0	0	0	0	0
	Nord orientale	4	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	9	0	0	0	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	14	6	21	0	80	80
	Nord occidentale	23	0	0	0	0	2
	Nord orientale	17	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	45	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>99</i>	<i>1(▲)</i>	<i>8(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0</i>	<i>80</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	25	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	29	4	12	0	40	55
	Nord orientale	25	0	1	0	0	7
	Sud-Isole	60	1(▲)	9(▲)	0(▲)	0	67
	<i>TOTALE</i>	<i>139</i>	<i>1(▲)</i>	<i>8(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0</i>	<i>55</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	248	60(▲)	95(▲)	0(▲)	240(▲)	400
	Nord occidentale	320	61(▲)	99(▲)	0(▲)	258(▲)	387
	Nord orientale	237	70(▲)	111(▲)	0(▲)	307(▲)	480
	Sud-Isole	440	49(▲)	81(▲)	0(▲)	232(▲)	373
	<i>TOTALE</i>	<i>1245</i>	<i>58(▲)</i>	<i>95(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>253(▲)</i>	<i>407(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	64	63(▲)	103(▲)	0(▲)	240	480
	Nord occidentale	96	85(▲)	113(▲)	4(▲)	307	453
	Nord orientale	65	57(▲)	101(▲)	0(▲)	240	507
	Sud-Isole	91	35(▲)	64(▲)	0(▲)	200	300
	<i>TOTALE</i>	<i>316</i>	<i>60(▲)</i>	<i>98(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>240(▲)</i>	<i>420</i>
TOTALE	Centro	356	53(▲)	93(▲)	0(▲)	240(▲)	400
	Nord occidentale	473	59(▲)	99(▲)	0(▲)	257(▲)	420
	Nord orientale	348	58(▲)	104(▲)	0(▲)	280(▲)	480
	Sud-Isole	645	38(▲)	73(▲)	0(▲)	200(▲)	320
	<i>TOTALE</i>	<i>1822</i>	<i>50(▲)</i>	<i>91(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>240(▲)</i>	<i>400(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.1.1(b) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del gruppo alimentare "BEVANDE ALCOLICHE E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	6	0	0	0	0,1	0,1
	Nord occidentale	5	0	0	0	0	0
	Nord orientale	6	0	0	0	0,1	0,1
	Sud-Isole	12	0	0	0	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	15	0	0	0	0,1	0,1
	Nord occidentale	25	0	0,1	0	0,1	0,2
	Nord orientale	12	1	4	0	13	13
	Sud-Isole	42	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0,1	0,1
	<i>TOTALE</i>	<i>94</i>	<i>0,2(▲)</i>	<i>1(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0,1</i>	<i>13</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	20	9	34	0	95	150
	Nord occidentale	32	2(▲)	7(▲)	0(▲)	27	27
	Nord orientale	19	6	19	0	67	67
	Sud-Isole	37	3(▲)	12(▲)	0(▲)	53	53
	<i>TOTALE</i>	<i>108</i>	<i>5(▲)</i>	<i>18(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>40</i>	<i>67</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	187	164(▲)	171(▲)	120(▲)	507(▲)	654
	Nord occidentale	271	182(▲)	213(▲)	120(▲)	640(▲)	947
	Nord orientale	213	214(▲)	255(▲)	134(▲)	634(▲)	1200
	Sud-Isole	397	122(▲)	140(▲)	80(▲)	373(▲)	640
	<i>TOTALE</i>	<i>1068</i>	<i>163(▲)</i>	<i>195(▲)</i>	<i>110(▲)</i>	<i>534(▲)</i>	<i>800(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	39	189(▲)	181(▲)	160(▲)	560	747
	Nord occidentale	51	204(▲)	181(▲)	200(▲)	573	667
	Nord orientale	44	191(▲)	168(▲)	160(▲)	467	680
	Sud-Isole	68	143(▲)	163(▲)	113(▲)	467	667
	<i>TOTALE</i>	<i>202</i>	<i>178(▲)</i>	<i>173(▲)</i>	<i>160(▲)</i>	<i>480(▲)</i>	<i>667</i>
TOTALE	Centro	267	143(▲)	170(▲)	87(▲)	507(▲)	654
	Nord occidentale	384	156(▲)	202(▲)	73(▲)	581(▲)	911
	Nord orientale	294	184(▲)	237(▲)	110(▲)	627(▲)	1200
	Sud-Isole	556	105(▲)	139(▲)	53(▲)	373(▲)	640
	<i>TOTALE</i>	<i>1501</i>	<i>140(▲)</i>	<i>186(▲)</i>	<i>67(▲)</i>	<i>507(▲)</i>	<i>747(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.1.1(c) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del gruppo alimentare "BEVANDE ALCOLICHE E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	11	0	0	0	0,1	0,1
	Nord occidentale	10	0	0	0	0	0
	Nord orientale	10	0	0	0	0,1	0,1
	Sud-Isole	21	0	0	0	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>52</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0</i>	<i>0,1</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	29	3	15	0	0,2	80
	Nord occidentale	48	0,1(▲)	0,3(▲)	0(▲)	0,2	2
	Nord orientale	29	0,5	2	0	0,1	13
	Sud-Isole	87	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0,1	0,2
	<i>TOTALE</i>	<i>193</i>	<i>0,5(▲)</i>	<i>6(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0,2(▲)</i>	<i>13</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	45	4(▲)	23(▲)	0(▲)	0,3	150
	Nord occidentale	61	3(▲)	10(▲)	0(▲)	27	55
	Nord orientale	44	3(▲)	13(▲)	0(▲)	7	67
	Sud-Isole	97	2(▲)	10(▲)	0(▲)	0,3	67
	<i>TOTALE</i>	<i>247</i>	<i>3(▲)</i>	<i>14(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>7(▲)</i>	<i>67</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	435	105(▲)	143(▲)	40(▲)	400(▲)	600
	Nord occidentale	591	117(▲)	172(▲)	40(▲)	467(▲)	800
	Nord orientale	450	138(▲)	206(▲)	53(▲)	547(▲)	747
	Sud-Isole	837	84(▲)	118(▲)	40(▲)	320(▲)	480(▲)
	<i>TOTALE</i>	<i>2313</i>	<i>107(▲)</i>	<i>158(▲)</i>	<i>40(▲)</i>	<i>400(▲)</i>	<i>654(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	103	110(▲)	150(▲)	40(▲)	373	560
	Nord occidentale	147	127(▲)	151(▲)	80(▲)	453	600
	Nord orientale	109	111(▲)	147(▲)	80(▲)	453	640
	Sud-Isole	159	81(▲)	129(▲)	0,2(▲)	387	647
	<i>TOTALE</i>	<i>518</i>	<i>106(▲)</i>	<i>144(▲)</i>	<i>35(▲)</i>	<i>413(▲)</i>	<i>640</i>
TOTALE	Centro	623	92(▲)	139(▲)	0,2(▲)	373(▲)	600
	Nord occidentale	857	102(▲)	161(▲)	0,3(▲)	407(▲)	757(▲)
	Nord orientale	642	116(▲)	188(▲)	0,6(▲)	467(▲)	680
	Sud-Isole	1201	69(▲)	114(▲)	0,1(▲)	320(▲)	480(▲)
	<i>TOTALE</i>	<i>3323</i>	<i>91(▲)</i>	<i>149(▲)</i>	<i>0,2(▲)</i>	<i>373(▲)</i>	<i>640(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.1.2(a) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del gruppo alimentare "BEVANDE ALCOLICHE E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: FEMMINE dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% ^(*)	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	3	60	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	1	25	0	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>4</i>	<i>17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	9	64	9	27	0	80	80
	Nord occidentale	16	70	0	0	0	2	2
	Nord orientale	14	82	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	22	49	0	0	0	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>61</i>	<i>62</i>	<i>1^(▲)</i>	<i>10^(▲)</i>	<i>0^(▲)</i>	<i>0</i>	<i>80</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	13	52	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	16	55	6	16	0	55	55
	Nord orientale	18	72	0	2	0	7	7
	Sud-Isole	35	58	2 ^(▲)	11 ^(▲)	0 ^(▲)	0	67
	<i>TOTALE</i>	<i>82</i>	<i>59</i>	<i>2^(▲)</i>	<i>10^(▲)</i>	<i>0^(▲)</i>	<i>3</i>	<i>67</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	169	68	88 ^(▲)	104 ^(▲)	60 ^(▲)	293 ^(▲)	480
	Nord occidentale	240	75	81 ^(▲)	107 ^(▲)	40 ^(▲)	297 ^(▲)	427
	Nord orientale	176	74	94 ^(▲)	120 ^(▲)	43 ^(▲)	320 ^(▲)	493
	Sud-Isole	310	70	69 ^(▲)	89 ^(▲)	40 ^(▲)	253 ^(▲)	400
	<i>TOTALE</i>	<i>895</i>	<i>72</i>	<i>81^(▲)</i>	<i>104^(▲)</i>	<i>40^(▲)</i>	<i>293^(▲)</i>	<i>480^(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	43	67	93 ^(▲)	115 ^(▲)	40 ^(▲)	260	480
	Nord occidentale	72	75	114 ^(▲)	118 ^(▲)	90 ^(▲)	320	453
	Nord orientale	40	62	92 ^(▲)	116 ^(▲)	80 ^(▲)	347	507
	Sud-Isole	55	60	57 ^(▲)	74 ^(▲)	30 ^(▲)	227	300
	<i>TOTALE</i>	<i>210</i>	<i>66</i>	<i>91^(▲)</i>	<i>108^(▲)</i>	<i>60^(▲)</i>	<i>300^(▲)</i>	<i>453</i>
TOTALE	Centro	237	67	80 ^(▲)	104 ^(▲)	40 ^(▲)	267 ^(▲)	480
	Nord occidentale	344	73	81 ^(▲)	108 ^(▲)	40 ^(▲)	293 ^(▲)	427
	Nord orientale	249	72	81 ^(▲)	115 ^(▲)	13 ^(▲)	320 ^(▲)	493
	Sud-Isole	422	65	59 ^(▲)	84 ^(▲)	13 ^(▲)	240 ^(▲)	373
	<i>TOTALE</i>	<i>1252</i>	<i>69</i>	<i>73^(▲)</i>	<i>102^(▲)</i>	<i>35^(▲)</i>	<i>267^(▲)</i>	<i>453^(▲)</i>

(*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: n ≥ 30 per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); n ≥ 160 per P95 e n ≥ 800 per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.1.2(b) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del gruppo alimentare "BEVANDE ALCOLICHE E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: MASCHI dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% ^(*)	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	3	50	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	2	40	0	0	0	0	0
	Nord orientale	1	17	0	--	--	--	--
	Sud-Isole	1	8	0	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	7	24	0	0	0	0	0
Bambini (3-9 anni)	Centro	7	47	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	17	68	0	0	0	0	0
	Nord orientale	6	50	2	5	0	13	13
	Sud-Isole	22	52	0	0	0	0	0
	<i>TOTALE</i>	52	55	0 ^(▲)	2 ^(▲)	0 ^(▲)	0	13
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	11	55	17	46	0	150	150
	Nord occidentale	25	78	3	7	0	27	27
	Nord orientale	12	63	10	24	0	67	67
	Sud-Isole	22	59	6	16	0	53	53
	<i>TOTALE</i>	70	65	7 ^(▲)	23 ^(▲)	0 ^(▲)	53	150
Adulti (18-64 anni)	Centro	155	83	198 ^(▲)	170 ^(▲)	187 ^(▲)	533 ^(▲)	654
	Nord occidentale	239	88	206 ^(▲)	216 ^(▲)	160 ^(▲)	717 ^(▲)	947
	Nord orientale	190	89	240 ^(▲)	258 ^(▲)	180 ^(▲)	640 ^(▲)	1254
	Sud-Isole	335	84	145 ^(▲)	141 ^(▲)	120 ^(▲)	380 ^(▲)	640
	<i>TOTALE</i>	919	86	190 ^(▲)	198 ^(▲)	133 ^(▲)	581 ^(▲)	813 ^(▲)
Anziani (65-97 anni)	Centro	33	85	223 ^(▲)	177 ^(▲)	200 ^(▲)	560	747
	Nord occidentale	43	84	242 ^(▲)	171 ^(▲)	240 ^(▲)	573	667
	Nord orientale	43	98	195 ^(▲)	167 ^(▲)	160 ^(▲)	467	680
	Sud-Isole	58	85	168 ^(▲)	165 ^(▲)	120 ^(▲)	480	667
	<i>TOTALE</i>	177	88	203 ^(▲)	170 ^(▲)	180 ^(▲)	560 ^(▲)	680
TOTALE	Centro	209	78	183 ^(▲)	172 ^(▲)	160 ^(▲)	520 ^(▲)	654
	Nord occidentale	326	85	183 ^(▲)	208 ^(▲)	133 ^(▲)	607 ^(▲)	911
	Nord orientale	252	86	215 ^(▲)	242 ^(▲)	160 ^(▲)	634 ^(▲)	1200
	Sud-Isole	438	79	133 ^(▲)	144 ^(▲)	107 ^(▲)	400 ^(▲)	647
	<i>TOTALE</i>	1225	82	172 ^(▲)	192 ^(▲)	120 ^(▲)	537 ^(▲)	773 ^(▲)

(^o) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(^{*}) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: n ≥ 30 per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); n ≥ 160 per P95 e n ≥ 800 per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.1.2(c) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del gruppo alimentare "BEVANDE ALCOLICHE E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% ^(*)	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	6	55	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	2	20	0	0	0	0	0
	Nord orientale	2	20	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	1	5	0	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	11	21	0	0	0	0	0
Bambini (3-9 anni)	Centro	16	55	5	20	0	80	80
	Nord occidentale	33	69	0 ^(▲)	0 ^(▲)	0 ^(▲)	0	2
	Nord orientale	20	69	1	3	0	7	13
	Sud-Isole	44	51	0 ^(▲)	0 ^(▲)	0 ^(▲)	0	0
	<i>TOTALE</i>	113	59	1 ^(▲)	8 ^(▲)	0 ^(▲)	0	13
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	24	53	8	31	0	40	150
	Nord occidentale	41	67	4 ^(▲)	12 ^(▲)	0 ^(▲)	27	55
	Nord orientale	30	68	4 ^(▲)	15 ^(▲)	0 ^(▲)	53	67
	Sud-Isole	57	59	3 ^(▲)	13 ^(▲)	0 ^(▲)	53	67
	<i>TOTALE</i>	152	62	5 ^(▲)	17 ^(▲)	0 ^(▲)	40	67
Adulti (18-64 anni)	Centro	324	74	141 ^(▲)	149 ^(▲)	108 ^(▲)	460 ^(▲)	640
	Nord occidentale	479	81	144 ^(▲)	181 ^(▲)	80 ^(▲)	533 ^(▲)	813
	Nord orientale	366	81	170 ^(▲)	216 ^(▲)	110 ^(▲)	587 ^(▲)	1014
	Sud-Isole	645	77	109 ^(▲)	125 ^(▲)	80 ^(▲)	360 ^(▲)	493
	<i>TOTALE</i>	1814	78	136 ^(▲)	168 ^(▲)	80 ^(▲)	453 ^(▲)	717 ^(▲)
Anziani (65-97 anni)	Centro	76	74	150 ^(▲)	158 ^(▲)	120 ^(▲)	480	747
	Nord occidentale	115	78	162 ^(▲)	153 ^(▲)	147 ^(▲)	480	600
	Nord orientale	83	76	146 ^(▲)	153 ^(▲)	110 ^(▲)	453	680
	Sud-Isole	113	71	114 ^(▲)	140 ^(▲)	80 ^(▲)	400	647
	<i>TOTALE</i>	387	75	142 ^(▲)	151 ^(▲)	110 ^(▲)	453 ^(▲)	667
TOTALE	Centro	446	72	128 ^(▲)	149 ^(▲)	80 ^(▲)	440 ^(▲)	640
	Nord occidentale	670	78	131 ^(▲)	172 ^(▲)	67 ^(▲)	480 ^(▲)	776
	Nord orientale	501	78	148 ^(▲)	201 ^(▲)	80 ^(▲)	534 ^(▲)	693
	Sud-Isole	860	72	97 ^(▲)	124 ^(▲)	53 ^(▲)	340 ^(▲)	493 ^(▲)
	<i>TOTALE</i>	2477	75	122 ^(▲)	161 ^(▲)	67 ^(▲)	428 ^(▲)	667 ^(▲)

^(*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

^(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.1.3(a) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "VINO E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: FEMMINE del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	5	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	5	0	0	0	0	0
	Nord orientale	4	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	9	0	0	0	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	14	6	21	0	80	80
	Nord occidentale	23	0	0	0	0	0
	Nord orientale	17	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	45	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>99</i>	<i>1(▲)</i>	<i>8(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0</i>	<i>80</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	25	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	29	0	0	0	0	0
	Nord orientale	25	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	60	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>139</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	248	43(▲)	74(▲)	0(▲)	200(▲)	293
	Nord occidentale	320	41(▲)	72(▲)	0(▲)	207(▲)	287
	Nord orientale	237	46(▲)	79(▲)	0(▲)	213(▲)	320
	Sud-Isole	440	29(▲)	55(▲)	0(▲)	160(▲)	267
	<i>TOTALE</i>	<i>1245</i>	<i>38(▲)</i>	<i>69(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>200(▲)</i>	<i>267(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	64	58(▲)	102(▲)	0(▲)	240	480
	Nord occidentale	96	80(▲)	111(▲)	0(▲)	307	453
	Nord orientale	65	53(▲)	95(▲)	0(▲)	227	507
	Sud-Isole	91	33(▲)	62(▲)	0(▲)	200	300
	<i>TOTALE</i>	<i>316</i>	<i>57(▲)</i>	<i>96(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>240(▲)</i>	<i>420</i>
TOTALE	Centro	356	41(▲)	77(▲)	0(▲)	200(▲)	347
	Nord occidentale	473	44(▲)	80(▲)	0(▲)	240(▲)	333
	Nord orientale	348	41(▲)	79(▲)	0(▲)	200(▲)	320
	Sud-Isole	645	25(▲)	53(▲)	0(▲)	120(▲)	253
	<i>TOTALE</i>	<i>1822</i>	<i>36(▲)</i>	<i>71(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>200(▲)</i>	<i>293(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per area geografica (g/die)

Tabella 1.A.1.3(b) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "VINO E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	6	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	5	0	0	0	0	0
	Nord orientale	6	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	12	0	0	0	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	15	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	25	0	0	0	0	0
	Nord orientale	12	1	4	0	13	13
	Sud-Isole	42	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>94</i>	<i>0(▲)</i>	<i>1(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0</i>	<i>13</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	20	4	12	0	40	40
	Nord occidentale	32	2(▲)	7(▲)	0(▲)	27	27
	Nord orientale	19	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	37	3(▲)	13(▲)	0(▲)	53	53
	<i>TOTALE</i>	<i>108</i>	<i>3(▲)</i>	<i>10(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>27</i>	<i>53</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	187	126(▲)	153(▲)	80(▲)	440(▲)	640
	Nord occidentale	271	113(▲)	147(▲)	40(▲)	380(▲)	560
	Nord orientale	213	122(▲)	159(▲)	53(▲)	427(▲)	600
	Sud-Isole	397	84(▲)	108(▲)	40(▲)	293(▲)	480
	<i>TOTALE</i>	<i>1068</i>	<i>106(▲)</i>	<i>139(▲)</i>	<i>53(▲)</i>	<i>373(▲)</i>	<i>587(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	39	178(▲)	183(▲)	160(▲)	533	747
	Nord occidentale	51	191(▲)	174(▲)	200(▲)	533	600
	Nord orientale	44	165(▲)	128(▲)	160(▲)	360	547
	Sud-Isole	68	136(▲)	149(▲)	100(▲)	427	533
	<i>TOTALE</i>	<i>202</i>	<i>164(▲)</i>	<i>159(▲)</i>	<i>160(▲)</i>	<i>480(▲)</i>	<i>560</i>
TOTALE	Centro	267	115(▲)	154(▲)	40(▲)	440(▲)	640
	Nord occidentale	384	105(▲)	148(▲)	0(▲)	380(▲)	560
	Nord orientale	294	113(▲)	151(▲)	47(▲)	427(▲)	600
	Sud-Isole	556	77(▲)	111(▲)	0(▲)	320(▲)	480
	<i>TOTALE</i>	<i>1501</i>	<i>98(▲)</i>	<i>138(▲)</i>	<i>4(▲)</i>	<i>373(▲)</i>	<i>560(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.1.3(c) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "VINO E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	11	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	10	0	0	0	0	0
	Nord orientale	10	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	21	0	0	0	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>52</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	29	3	15	0	0	80
	Nord occidentale	48	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	0
	Nord orientale	29	0	2	0	0	13
	Sud-Isole	87	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>193</i>	<i>1(▲)</i>	<i>6(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>13</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	45	2(▲)	8(▲)	0(▲)	0	40
	Nord occidentale	61	1(▲)	5(▲)	0(▲)	4	27
	Nord orientale	44	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	0
	Sud-Isole	97	1(▲)	8(▲)	0(▲)	0	53
	<i>TOTALE</i>	<i>247</i>	<i>1(▲)</i>	<i>7(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>40</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	435	79(▲)	122(▲)	0(▲)	333(▲)	533
	Nord occidentale	591	74(▲)	118(▲)	0(▲)	320(▲)	480
	Nord orientale	450	82(▲)	129(▲)	0(▲)	320(▲)	600
	Sud-Isole	837	55(▲)	89(▲)	0(▲)	253(▲)	360(▲)
	<i>TOTALE</i>	<i>2313</i>	<i>70(▲)</i>	<i>112(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>293(▲)</i>	<i>480(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	103	104(▲)	149(▲)	13(▲)	373	533
	Nord occidentale	147	119(▲)	145(▲)	40(▲)	453	560
	Nord orientale	109	98(▲)	122(▲)	67(▲)	320	507
	Sud-Isole	159	77(▲)	119(▲)	0(▲)	387	480
	<i>TOTALE</i>	<i>518</i>	<i>99(▲)</i>	<i>135(▲)</i>	<i>13(▲)</i>	<i>373(▲)</i>	<i>533</i>
TOTALE	Centro	623	72(▲)	122(▲)	0(▲)	320(▲)	533
	Nord occidentale	857	72(▲)	120(▲)	0(▲)	320(▲)	480(▲)
	Nord orientale	642	74(▲)	123(▲)	0(▲)	320(▲)	547
	Sud-Isole	1201	49(▲)	89(▲)	0(▲)	253(▲)	400(▲)
	<i>TOTALE</i>	<i>3323</i>	<i>64(▲)</i>	<i>111(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>293(▲)</i>	<i>480(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.1.4(a) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "VINO E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: FEMMINE dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% ^(*)	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	3	60	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	1	25	0	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	4	17	0	0	0	0	0
Bambini (3-9 anni)	Centro	9	64	9	27	0	80	80
	Nord occidentale	14	61	0	0	0	0	0
	Nord orientale	14	82	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	20	44	0	0	0	0	0
	<i>TOTALE</i>	57	58	1 ^(▲)	11 ^(▲)	0 ^(▲)	0	80
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	13	52	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	16	55	0	0	0	0	0
	Nord orientale	18	72	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	31	52	0 ^(▲)	0 ^(▲)	0 ^(▲)	0	0
	<i>TOTALE</i>	78	56	0 ^(▲)	0 ^(▲)	0 ^(▲)	0	0
Adulti (18-64 anni)	Centro	154	62	69 ^(▲)	84 ^(▲)	40 ^(▲)	213	347
	Nord occidentale	227	71	58 ^(▲)	79 ^(▲)	20 ^(▲)	240 ^(▲)	307
	Nord orientale	158	67	70 ^(▲)	88 ^(▲)	33 ^(▲)	240	400
	Sud-Isole	281	64	46 ^(▲)	63 ^(▲)	20 ^(▲)	160 ^(▲)	267
	<i>TOTALE</i>	820	66	58 ^(▲)	77 ^(▲)	20 ^(▲)	220 ^(▲)	293 ^(▲)
Anziani (65-97 anni)	Centro	40	63	93 ^(▲)	116 ^(▲)	50 ^(▲)	310	480
	Nord occidentale	70	73	110 ^(▲)	117 ^(▲)	80 ^(▲)	320	453
	Nord orientale	38	58	90 ^(▲)	111 ^(▲)	80 ^(▲)	320	507
	Sud-Isole	55	60	55 ^(▲)	73 ^(▲)	20 ^(▲)	227	300
	<i>TOTALE</i>	203	64	88 ^(▲)	107 ^(▲)	60 ^(▲)	280 ^(▲)	453
TOTALE	Centro	219	62	66 ^(▲)	89 ^(▲)	20 ^(▲)	240 ^(▲)	360
	Nord occidentale	327	69	64 ^(▲)	90 ^(▲)	0 ^(▲)	240 ^(▲)	340
	Nord orientale	229	66	63 ^(▲)	90 ^(▲)	0 ^(▲)	240 ^(▲)	400
	Sud-Isole	387	60	41 ^(▲)	63 ^(▲)	0 ^(▲)	160 ^(▲)	267
	<i>TOTALE</i>	1162	64	57 ^(▲)	82 ^(▲)	0 ^(▲)	240 ^(▲)	333 ^(▲)

(^o) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(^{*}) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.1.4(b) - *Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "VINO E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: MASCHI dei soli consumatori*

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% ^(*)	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	2	33	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	2	40	0	0	0	0	0
	Nord orientale	1	17	0	--	--	--	--
	Sud-Isole	1	8	0	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	6	21	0	0	0	0	0
Bambini (3-9 anni)	Centro	7	47	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	16	64	0	0	0	0	0
	Nord orientale	6	50	2	5	0	13	13
	Sud-Isole	22	52	0	0	0	0	0
	<i>TOTALE</i>	51	54	0 ^(▲)	2 ^(▲)	0 ^(▲)	0	13
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	11	55	7	16	0	40	40
	Nord occidentale	24	75	3	8	0	27	27
	Nord orientale	11	58	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	20	54	6	17	0	53	53
	<i>TOTALE</i>	66	61	4 ^(▲)	12 ^(▲)	0 ^(▲)	40	53
Adulti (18-64 anni)	Centro	150	80	157 ^(▲)	156 ^(▲)	120 ^(▲)	480	640
	Nord occidentale	222	82	138 ^(▲)	152 ^(▲)	80 ^(▲)	387 ^(▲)	560
	Nord orientale	173	81	151 ^(▲)	164 ^(▲)	107 ^(▲)	463 ^(▲)	640
	Sud-Isole	311	78	107 ^(▲)	111 ^(▲)	80 ^(▲)	320 ^(▲)	480
	<i>TOTALE</i>	856	80	133 ^(▲)	143 ^(▲)	100 ^(▲)	400 ^(▲)	600 ^(▲)
Anziani (65-97 anni)	Centro	32	82	217 ^(▲)	180 ^(▲)	197 ^(▲)	533	747
	Nord occidentale	43	84	226 ^(▲)	166 ^(▲)	200 ^(▲)	533	600
	Nord orientale	42	95	173 ^(▲)	126 ^(▲)	160 ^(▲)	360	547
	Sud-Isole	57	84	162 ^(▲)	149 ^(▲)	120 ^(▲)	467	533
	<i>TOTALE</i>	174	86	191 ^(▲)	156 ^(▲)	167 ^(▲)	480 ^(▲)	600
TOTALE	Centro	202	76	151 ^(▲)	161 ^(▲)	120 ^(▲)	480 ^(▲)	640
	Nord occidentale	307	80	132 ^(▲)	155 ^(▲)	80 ^(▲)	440 ^(▲)	560
	Nord orientale	233	79	143 ^(▲)	156 ^(▲)	107 ^(▲)	440 ^(▲)	600
	Sud-Isole	411	74	104 ^(▲)	118 ^(▲)	80 ^(▲)	320 ^(▲)	480
	<i>TOTALE</i>	1153	77	128 ^(▲)	145 ^(▲)	80 ^(▲)	413 ^(▲)	600 ^(▲)

(^o) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: n ≥ 30 per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); n ≥ 160 per P95 e n ≥ 800 per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.1.4(c) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "VINO E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% ^(*)	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	5	45	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	2	20	0	0	0	0	0
	Nord orientale	2	20	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	1	5	0	--	0	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>10</i>	<i>19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	16	55	5	20	0	80	80
	Nord occidentale	30	63	0 ^(▲)	0 ^(▲)	0 ^(▲)	0	0
	Nord orientale	20	69	1	3	0	7	13
	Sud-Isole	42	48	0 ^(▲)	0 ^(▲)	0 ^(▲)	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>108</i>	<i>56</i>	<i>1^(▲)</i>	<i>8^(▲)</i>	<i>0^(▲)</i>	<i>0</i>	<i>13</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	24	53	3	11	0	40	40
	Nord occidentale	40	66	2 ^(▲)	6 ^(▲)	0 ^(▲)	16	27
	Nord orientale	29	66	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	51	53	3 ^(▲)	11 ^(▲)	0 ^(▲)	20	53
	<i>TOTALE</i>	<i>144</i>	<i>58</i>	<i>2^(▲)</i>	<i>8^(▲)</i>	<i>0^(▲)</i>	<i>4</i>	<i>53</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	304	70	113 ^(▲)	132 ^(▲)	80 ^(▲)	387 ^(▲)	573
	Nord occidentale	449	76	98 ^(▲)	127 ^(▲)	40 ^(▲)	333 ^(▲)	507
	Nord orientale	331	74	112 ^(▲)	139 ^(▲)	80 ^(▲)	400 ^(▲)	600
	Sud-Isole	592	71	78 ^(▲)	96 ^(▲)	40 ^(▲)	267 ^(▲)	467
	<i>TOTALE</i>	<i>1676</i>	<i>72</i>	<i>96^(▲)</i>	<i>121^(▲)</i>	<i>53^(▲)</i>	<i>320^(▲)</i>	<i>533^(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	72	70	148 ^(▲)	159 ^(▲)	120 ^(▲)	480	747
	Nord occidentale	113	77	154 ^(▲)	148 ^(▲)	127 ^(▲)	480	560
	Nord orientale	80	73	133 ^(▲)	125 ^(▲)	120 ^(▲)	340	547
	Sud-Isole	112	70	110 ^(▲)	129 ^(▲)	80 ^(▲)	400	480
	<i>TOTALE</i>	<i>377</i>	<i>73</i>	<i>135^(▲)</i>	<i>141^(▲)</i>	<i>107^(▲)</i>	<i>453^(▲)</i>	<i>547</i>
TOTALE	Centro	421	68	107 ^(▲)	135 ^(▲)	53 ^(▲)	373 ^(▲)	573
	Nord occidentale	634	74	97 ^(▲)	130 ^(▲)	40 ^(▲)	333 ^(▲)	533
	Nord orientale	462	72	103 ^(▲)	134 ^(▲)	53 ^(▲)	360 ^(▲)	600
	Sud-Isole	798	66	74 ^(▲)	100 ^(▲)	40 ^(▲)	267 ^(▲)	467
	<i>TOTALE</i>	<i>2315</i>	<i>70</i>	<i>92^(▲)</i>	<i>123^(▲)</i>	<i>40^(▲)</i>	<i>320^(▲)</i>	<i>533^(▲)</i>

(*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: n ≥ 30 per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); n ≥ 160 per P95 e n ≥ 800 per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.1.5(a) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "BIRRA, SIDRO E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: FEMMINE del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	5	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	5	0	0	0	0	0
	Nord orientale	4	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	9	0	0	0	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	14	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	23	0	0	0	0	0
	Nord orientale	17	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	45	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>99</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	25	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	29	2	10	0	0	55
	Nord orientale	25	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	60	1(▲)	9(▲)	0(▲)	0	67
	<i>TOTALE</i>	<i>139</i>	<i>1(▲)</i>	<i>7(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0</i>	<i>55</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	248	15(▲)	55(▲)	0(▲)	110(▲)	213
	Nord occidentale	320	17(▲)	56(▲)	0(▲)	122(▲)	267
	Nord orientale	237	20(▲)	59(▲)	0(▲)	133(▲)	320
	Sud-Isole	440	19(▲)	53(▲)	0(▲)	133(▲)	267
	<i>TOTALE</i>	<i>1245</i>	<i>18(▲)</i>	<i>55(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>133(▲)</i>	<i>267(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	64	4(▲)	21(▲)	0(▲)	0	133
	Nord occidentale	96	4(▲)	27(▲)	0(▲)	0	240
	Nord orientale	65	4(▲)	21(▲)	0(▲)	0	133
	Sud-Isole	91	1(▲)	8(▲)	0(▲)	0	67
	<i>TOTALE</i>	<i>316</i>	<i>3(▲)</i>	<i>21(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>110</i>
TOTALE	Centro	356	11(▲)	48(▲)	0(▲)	107(▲)	187
	Nord occidentale	473	13(▲)	48(▲)	0(▲)	107(▲)	267
	Nord orientale	348	15(▲)	50(▲)	0(▲)	133(▲)	267
	Sud-Isole	645	13(▲)	44(▲)	0(▲)	83(▲)	213
	<i>TOTALE</i>	<i>1822</i>	<i>13(▲)</i>	<i>47(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>110(▲)</i>	<i>240(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: n ≥ 30 per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); n ≥ 160 per P95 e n ≥ 800 per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.1.5(b) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "BIRRA, SIDRO E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	6	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	5	0	0	0	0	0
	Nord orientale	6	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	12	0	0	0	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	15	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	25	0	0	0	0	0
	Nord orientale	12	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	42	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>94</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	20	6	25	0	55	110
	Nord occidentale	32	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	0
	Nord orientale	19	4	15	0	67	67
	Sud-Isole	37	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>108</i>	<i>2(▲)</i>	<i>12(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0</i>	<i>67</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	187	36(▲)	84(▲)	0(▲)	220(▲)	440
	Nord occidentale	271	62(▲)	142(▲)	0(▲)	400(▲)	667
	Nord orientale	213	85(▲)	165(▲)	0(▲)	353(▲)	600
	Sud-Isole	397	35(▲)	74(▲)	0(▲)	200(▲)	400
	<i>TOTALE</i>	<i>1068</i>	<i>52(▲)</i>	<i>119(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>267(▲)</i>	<i>533(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	39	8(▲)	29(▲)	0(▲)	110	133
	Nord occidentale	51	12(▲)	41(▲)	0(▲)	133	177
	Nord orientale	44	25(▲)	77(▲)	0(▲)	133	400
	Sud-Isole	68	6(▲)	32(▲)	0(▲)	0	220
	<i>TOTALE</i>	<i>202</i>	<i>12(▲)</i>	<i>47(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>110(▲)</i>	<i>220</i>
TOTALE	Centro	267	27(▲)	73(▲)	0(▲)	133(▲)	387
	Nord occidentale	384	46(▲)	123(▲)	0(▲)	320(▲)	533
	Nord orientale	294	65(▲)	147(▲)	0(▲)	330(▲)	600
	Sud-Isole	556	26(▲)	65(▲)	0(▲)	133(▲)	373
	<i>TOTALE</i>	<i>1501</i>	<i>39(▲)</i>	<i>104(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>243(▲)</i>	<i>467(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.1.5(c) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "BIRRA, SIDRO E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	11	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	10	0	0	0	0	0
	Nord orientale	10	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	21	0	0	0	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>52</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	29	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	48	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	0
	Nord orientale	29	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	87	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>193</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	45	2(▲)	16(▲)	0(▲)	0	110
	Nord occidentale	61	1(▲)	7(▲)	0(▲)	0	55
	Nord orientale	44	2(▲)	10(▲)	0(▲)	0	67
	Sud-Isole	97	1(▲)	7(▲)	0(▲)	0	67
	<i>TOTALE</i>	<i>247</i>	<i>1(▲)</i>	<i>10(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>67</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	435	24(▲)	70(▲)	0(▲)	133(▲)	333
	Nord occidentale	591	38(▲)	107(▲)	0(▲)	243(▲)	533
	Nord orientale	450	51(▲)	125(▲)	0(▲)	267(▲)	467
	Sud-Isole	837	26(▲)	64(▲)	0(▲)	133(▲)	287(▲)
	<i>TOTALE</i>	<i>2313</i>	<i>34(▲)</i>	<i>92(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>200(▲)</i>	<i>407(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	103	5(▲)	25(▲)	0(▲)	0	133
	Nord occidentale	147	7(▲)	33(▲)	0(▲)	53	177
	Nord orientale	109	12(▲)	52(▲)	0(▲)	110	267
	Sud-Isole	159	3(▲)	22(▲)	0(▲)	0	133
	<i>TOTALE</i>	<i>518</i>	<i>7(▲)</i>	<i>34(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>40(▲)</i>	<i>163</i>
TOTALE	Centro	623	18(▲)	60(▲)	0(▲)	120(▲)	267
	Nord occidentale	857	27(▲)	91(▲)	0(▲)	163(▲)	487(▲)
	Nord orientale	642	38(▲)	109(▲)	0(▲)	267(▲)	400
	Sud-Isole	1201	19(▲)	55(▲)	0(▲)	133(▲)	267(▲)
	<i>TOTALE</i>	<i>3323</i>	<i>25(▲)</i>	<i>79(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>133(▲)</i>	<i>400(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.1.6(a) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "BIRRA, SIDRO E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: FEMMINE dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% ^(*)	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--
Bambini (3-9 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	1	4	0	--	--	--	--
	Nord occidentale	1	3	55	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	1	2	67	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>41</i>	<i>36</i>	<i>55</i>	<i>67</i>	<i>67</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	37	15	102 ^(▲)	109 ^(▲)	67 ^(▲)	267	667
	Nord occidentale	50	16	110 ^(▲)	99 ^(▲)	67 ^(▲)	387	417
	Nord orientale	39	16	124 ^(▲)	90 ^(▲)	133 ^(▲)	333	467
	Sud-Isole	74	17	110 ^(▲)	80 ^(▲)	67 ^(▲)	267	400
	<i>TOTALE</i>	<i>200</i>	<i>16</i>	<i>112^(▲)</i>	<i>92^(▲)</i>	<i>80^(▲)</i>	<i>277^(▲)</i>	<i>442</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	2	3	122	16	122	133	133
	Nord occidentale	3	3	134	96	110	240	240
	Nord orientale	2	3	122	16	122	133	133
	Sud-Isole	2	2	53	19	53	67	67
	<i>TOTALE</i>	<i>9</i>	<i>3</i>	<i>111</i>	<i>59</i>	<i>110</i>	<i>240</i>	<i>240</i>
TOTALE	Centro	40	11	101 ^(▲)	106 ^(▲)	67 ^(▲)	240	667
	Nord occidentale	54	11	111 ^(▲)	97 ^(▲)	67 ^(▲)	387	417
	Nord orientale	41	12	124 ^(▲)	88 ^(▲)	133 ^(▲)	320	467
	Sud-Isole	77	12	108 ^(▲)	79 ^(▲)	67 ^(▲)	267	400
	<i>TOTALE</i>	<i>212</i>	<i>12</i>	<i>111^(▲)</i>	<i>91^(▲)</i>	<i>80^(▲)</i>	<i>267^(▲)</i>	<i>417</i>

(^o) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: n ≥ 30 per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); n ≥ 160 per P95 e n ≥ 800 per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.1.6(b) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "BIRRA, SIDRO E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: MASCHI dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% ^(*)	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--
Bambini (3-9 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	1	5	110	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	1	5	67	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>88</i>	<i>31</i>	<i>88</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	45	24	150 ^(▲)	111 ^(▲)	120 ^(▲)	387	533
	Nord occidentale	80	30	212 ^(▲)	192 ^(▲)	133 ^(▲)	533	933
	Nord orientale	85	40	212 ^(▲)	204 ^(▲)	133 ^(▲)	400	1673
	Sud-Isole	109	27	128 ^(▲)	90 ^(▲)	107 ^(▲)	373	400
	<i>TOTALE</i>	<i>319</i>	<i>30</i>	<i>175^(▲)</i>	<i>162^(▲)</i>	<i>133^(▲)</i>	<i>467^(▲)</i>	<i>667</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	3	8	103	34	110	133	133
	Nord occidentale	5	10	127	49	133	177	177
	Nord orientale	6	14	183	127	133	400	400
	Sud-Isole	3	4	136	83	133	220	220
	<i>TOTALE</i>	<i>17</i>	<i>8</i>	<i>144</i>	<i>88</i>	<i>133</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
TOTALE	Centro	49	18	147 ^(▲)	107 ^(▲)	120 ^(▲)	387	533
	Nord occidentale	85	22	207 ^(▲)	188 ^(▲)	133 ^(▲)	533	933
	Nord orientale	92	31	209 ^(▲)	199 ^(▲)	133 ^(▲)	400	1673
	Sud-Isole	112	20	128 ^(▲)	89 ^(▲)	108 ^(▲)	373	400
	<i>TOTALE</i>	<i>338</i>	<i>23</i>	<i>173^(▲)</i>	<i>158^(▲)</i>	<i>133^(▲)</i>	<i>440^(▲)</i>	<i>667</i>

(^o) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: n ≥ 30 per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); n ≥ 160 per P95 e n ≥ 800 per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.1.6(c) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "BIRRA, SIDRO E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% ^(°)	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--
Bambini (3-9 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	2	4	55	78	55	110	110
	Nord occidentale	1	2	55	--	--	--	--
	Nord orientale	1	2	67	--	--	--	--
	Sud-Isole	1	1	67	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>5</i>	<i>2</i>	<i>60</i>	<i>39</i>	<i>67</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	82	19	129 ^(▲)	112 ^(▲)	110 ^(▲)	333	667
	Nord occidentale	130	22	173 ^(▲)	170 ^(▲)	110 ^(▲)	533	910
	Nord orientale	124	28	185 ^(▲)	180 ^(▲)	133 ^(▲)	400	600
	Sud-Isole	183	22	121 ^(▲)	86 ^(▲)	107 ^(▲)	267 ^(▲)	400
	<i>TOTALE</i>	<i>519</i>	<i>22</i>	<i>150^(▲)</i>	<i>142^(▲)</i>	<i>110^(▲)</i>	<i>400^(▲)</i>	<i>600</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	5	5	111	27	110	133	133
	Nord occidentale	8	5	130	63	122	240	240
	Nord orientale	8	7	167	112	133	400	400
	Sud-Isole	5	3	103	75	67	220	220
	<i>TOTALE</i>	<i>26</i>	<i>5</i>	<i>132</i>	<i>79</i>	<i>122</i>	<i>267</i>	<i>400</i>
TOTALE	Centro	89	14	126 ^(▲)	109 ^(▲)	110 ^(▲)	333	667
	Nord occidentale	139	16	169 ^(▲)	165 ^(▲)	110 ^(▲)	533	910
	Nord orientale	133	21	183 ^(▲)	176 ^(▲)	133 ^(▲)	400	600
	Sud-Isole	189	16	120 ^(▲)	86 ^(▲)	107 ^(▲)	267 ^(▲)	400
	<i>TOTALE</i>	<i>550</i>	<i>17</i>	<i>149^(▲)</i>	<i>140^(▲)</i>	<i>110^(▲)</i>	<i>400^(▲)</i>	<i>600</i>

(°) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.1.7(a) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "VINO DOLCE, SPUMANTE, APERITIVI E LIQUORI" per classi di età e area geografica: FEMMINE del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	5	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	5	0	0	0	0	0
	Nord orientale	4	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	9	0	0	0	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	14	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	23	0	0	0	0	2
	Nord orientale	17	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	45	0 ^(▲)	0 ^(▲)	0 ^(▲)	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>99</i>	<i>0^(▲)</i>	<i>0^(▲)</i>	<i>0^(▲)</i>	<i>0</i>	<i>2</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	25	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	29	2	7	0	3	40
	Nord orientale	25	0	1	0	0	7
	Sud-Isole	60	0 ^(▲)	0 ^(▲)	0 ^(▲)	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>139</i>	<i>0^(▲)</i>	<i>3^(▲)</i>	<i>0^(▲)</i>	<i>0</i>	<i>7</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	248	2 ^(▲)	8 ^(▲)	0 ^(▲)	1 ^(▲)	40
	Nord occidentale	320	3 ^(▲)	10 ^(▲)	0 ^(▲)	20 ^(▲)	43
	Nord orientale	237	3 ^(▲)	10 ^(▲)	0 ^(▲)	27 ^(▲)	40
	Sud-Isole	440	1 ^(▲)	7 ^(▲)	0 ^(▲)	1 ^(▲)	40
	<i>TOTALE</i>	<i>1245</i>	<i>2^(▲)</i>	<i>9^(▲)</i>	<i>0^(▲)</i>	<i>13^(▲)</i>	<i>40^(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	64	1 ^(▲)	5 ^(▲)	0 ^(▲)	0	40
	Nord occidentale	96	0 ^(▲)	2 ^(▲)	0 ^(▲)	1	17
	Nord orientale	65	0 ^(▲)	2 ^(▲)	0 ^(▲)	0	13
	Sud-Isole	91	0 ^(▲)	2 ^(▲)	0 ^(▲)	0	13
	<i>TOTALE</i>	<i>316</i>	<i>0^(▲)</i>	<i>3^(▲)</i>	<i>0^(▲)</i>	<i>0^(▲)</i>	<i>13</i>
TOTALE	Centro	356	1 ^(▲)	7 ^(▲)	0 ^(▲)	0 ^(▲)	40
	Nord occidentale	473	2 ^(▲)	9 ^(▲)	0 ^(▲)	13 ^(▲)	40
	Nord orientale	348	2 ^(▲)	8 ^(▲)	0 ^(▲)	13 ^(▲)	40
	Sud-Isole	645	1 ^(▲)	5 ^(▲)	0 ^(▲)	0 ^(▲)	13
	<i>TOTALE</i>	<i>1822</i>	<i>1^(▲)</i>	<i>7^(▲)</i>	<i>0^(▲)</i>	<i>2^(▲)</i>	<i>40^(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.1.7(b) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "VINO DOLCE, SPUMANTE, APERITIVI E LIQUORI" per classi di età e area geografica: MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	6	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	5	0	0	0	0	0
	Nord orientale	6	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	12	0	0	0	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	15	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	25	0	0	0	0	0
	Nord orientale	12	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	42	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>94</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	20	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	32	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	1
	Nord orientale	19	3	12	0	53	53
	Sud-Isole	37	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>108</i>	<i>1(▲)</i>	<i>5(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	187	2(▲)	8(▲)	0(▲)	13(▲)	40
	Nord occidentale	271	6(▲)	20(▲)	0(▲)	40(▲)	127
	Nord orientale	213	7(▲)	23(▲)	0(▲)	40(▲)	120
	Sud-Isole	397	3(▲)	14(▲)	0(▲)	14(▲)	80
	<i>TOTALE</i>	<i>1068</i>	<i>4(▲)</i>	<i>17(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>33(▲)</i>	<i>87(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	39	3(▲)	8(▲)	0(▲)	27	40
	Nord occidentale	51	1(▲)	6(▲)	0(▲)	8	40
	Nord orientale	44	1(▲)	6(▲)	0(▲)	1	40
	Sud-Isole	68	1(▲)	5(▲)	0(▲)	7	40
	<i>TOTALE</i>	<i>202</i>	<i>1(▲)</i>	<i>6(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>13(▲)</i>	<i>40</i>
TOTALE	Centro	267	2(▲)	7(▲)	0(▲)	13(▲)	40
	Nord occidentale	384	4(▲)	17(▲)	0(▲)	31	87
	Nord orientale	294	6(▲)	20(▲)	0(▲)	40(▲)	120
	Sud-Isole	556	2(▲)	12(▲)	0(▲)	13(▲)	60
	<i>TOTALE</i>	<i>1501</i>	<i>3(▲)</i>	<i>15(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>20(▲)</i>	<i>80(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.1.7(c) - *Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "VINO DOLCE, SPUMANTE, APERITIVI E LIQUORI" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI del campione totale*

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	11	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	10	0	0	0	0	0
	Nord orientale	10	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	21	0	0	0	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>52</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	29	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	48	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	2
	Nord orientale	29	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	87	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>193</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	45	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	0
	Nord occidentale	61	1(▲)	5(▲)	0(▲)	1	40
	Nord orientale	44	1(▲)	8(▲)	0(▲)	0	53
	Sud-Isole	97	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>247</i>	<i>0(▲)</i>	<i>4(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>7</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	435	2(▲)	8(▲)	0(▲)	13(▲)	40
	Nord occidentale	591	4(▲)	16(▲)	0(▲)	40(▲)	80
	Nord orientale	450	5(▲)	18(▲)	0(▲)	40(▲)	80
	Sud-Isole	837	2(▲)	11(▲)	0(▲)	13(▲)	53(▲)
	<i>TOTALE</i>	<i>2313</i>	<i>3(▲)</i>	<i>13(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>20(▲)</i>	<i>67(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	103	1(▲)	6(▲)	0(▲)	0	40
	Nord occidentale	147	1(▲)	4(▲)	0(▲)	1	17
	Nord orientale	109	1(▲)	4(▲)	0(▲)	0	13
	Sud-Isole	159	1(▲)	4(▲)	0(▲)	0	13
	<i>TOTALE</i>	<i>518</i>	<i>1(▲)</i>	<i>5(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>1(▲)</i>	<i>27</i>
TOTALE	Centro	623	1(▲)	7(▲)	0(▲)	10(▲)	40
	Nord occidentale	857	3(▲)	13(▲)	0(▲)	20(▲)	67(▲)
	Nord orientale	642	4(▲)	15(▲)	0(▲)	27(▲)	53
	Sud-Isole	1201	1(▲)	9(▲)	0(▲)	1(▲)	40(▲)
	<i>TOTALE</i>	<i>3323</i>	<i>2(▲)</i>	<i>11(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>13(▲)</i>	<i>53(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: n ≥ 30 per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); n ≥ 160 per P95 e n ≥ 800 per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.1.8(a) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "VINO DOLCE, SPUMANTE, APERITIVI E LIQUORI" per classi di età e area geografica: FEMMINE dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% ^(*)	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--
Bambini (3-9 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	2	9	1	1	1	2	2
	Nord orientale	1	6	0	--	--	--	--
	Sud-Isole	2	4	0	0	0	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	4	16	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	5	17	9	17	2	40	40
	Nord orientale	1	4	7	--	--	--	--
	Sud-Isole	7	12	0	0	0	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>17</i>	<i>12</i>	<i>3</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	30	12	13 ^(▲)	19 ^(▲)	0 ^(▲)	53	73
	Nord occidentale	42	13	19 ^(▲)	21 ^(▲)	13 ^(▲)	53	81
	Nord orientale	39	16	16 ^(▲)	20 ^(▲)	7 ^(▲)	53	80
	Sud-Isole	45	10	9 ^(▲)	19 ^(▲)	1 ^(▲)	40	80
	<i>TOTALE</i>	<i>156</i>	<i>13</i>	<i>14^(▲)</i>	<i>20^(▲)</i>	<i>1^(▲)</i>	<i>53</i>	<i>80</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	4	6	10	20	0	40	40
	Nord occidentale	6	6	7	7	5	17	17
	Nord orientale	6	9	3	6	0	13	13
	Sud-Isole	7	8	3	6	0	13	13
	<i>TOTALE</i>	<i>23</i>	<i>7</i>	<i>6</i>	<i>9</i>	<i>1</i>	<i>17</i>	<i>40</i>
TOTALE	Centro	38	11	11 ^(▲)	18 ^(▲)	0 ^(▲)	53	73
	Nord occidentale	55	12	17 ^(▲)	20 ^(▲)	7 ^(▲)	53	81
	Nord orientale	47	14	14 ^(▲)	19 ^(▲)	3 ^(▲)	40	80
	Sud-Isole	61	9	7 ^(▲)	16 ^(▲)	0 ^(▲)	40	80
	<i>TOTALE</i>	<i>201</i>	<i>11</i>	<i>12^(▲)</i>	<i>19^(▲)</i>	<i>1^(▲)</i>	<i>40^(▲)</i>	<i>80</i>

(*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: n ≥ 30 per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); n ≥ 160 per P95 e n ≥ 800 per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.1.8(b) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "VINO DOLCE, SPUMANTE, APERITIVI E LIQUORI" per classi di età e area geografica: MASCHI dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% ^(*)	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	1	17	0	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	--	--	--	--
Bambini (3-9 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	2	8	0	0	0	0	0
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	3	9	0	0	0	1	1
	Nord orientale	2	11	27	38	27	53	53
	Sud-Isole	5	14	0	0	0	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>10</i>	<i>9</i>	<i>5</i>	<i>17</i>	<i>0</i>	<i>53</i>	<i>53</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	29	16	13 ^(▲)	16 ^(▲)	13 ^(▲)	40	53
	Nord occidentale	54	20	31 ^(▲)	37 ^(▲)	15 ^(▲)	127	173
	Nord orientale	58	27	27 ^(▲)	39 ^(▲)	13 ^(▲)	120	200
	Sud-Isole	56	14	22 ^(▲)	31 ^(▲)	13 ^(▲)	107	133
	<i>TOTALE</i>	<i>197</i>	<i>18</i>	<i>24^(▲)</i>	<i>34^(▲)</i>	<i>13^(▲)</i>	<i>93^(▲)</i>	<i>173</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	5	13	20	15	20	40	40
	Nord occidentale	5	10	12	17	8	40	40
	Nord orientale	7	16	8	15	0	40	40
	Sud-Isole	9	13	8	13	0	40	40
	<i>TOTALE</i>	<i>26</i>	<i>13</i>	<i>11</i>	<i>15</i>	<i>4</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
TOTALE	Centro	35	13	14 ^(▲)	16 ^(▲)	13 ^(▲)	40	53
	Nord occidentale	64	17	27 ^(▲)	35 ^(▲)	13 ^(▲)	87	173
	Nord orientale	67	23	25 ^(▲)	37 ^(▲)	13 ^(▲)	93	200
	Sud-Isole	70	13	19 ^(▲)	29 ^(▲)	13 ^(▲)	80	133
	<i>TOTALE</i>	<i>236</i>	<i>16</i>	<i>22^(▲)</i>	<i>32^(▲)</i>	<i>13^(▲)</i>	<i>80^(▲)</i>	<i>167</i>

(^o) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(^{*}) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: n ≥ 30 per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); n ≥ 160 per P95 e n ≥ 800 per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.1.8(c) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "VINO DOLCE, SPUMANTE, APERITIVI E LIQUORI" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% ^(*)	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	1	9	0	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	4	8	1	1	0	2	2
	Nord orientale	1	3	0	--	--	--	--
	Sud-Isole	2	2	0	0	0	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>7</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	4	9	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	8	13	6	14	1	40	40
	Nord orientale	3	7	20	29	7	53	53
	Sud-Isole	12	12	0	0	0	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>27</i>	<i>11</i>	<i>4</i>	<i>13</i>	<i>0</i>	<i>40</i>	<i>53</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	59	14	13 ^(▲)	18 ^(▲)	1 ^(▲)	53	73
	Nord occidentale	96	16	26 ^(▲)	31 ^(▲)	13 ^(▲)	81	173
	Nord orientale	97	22	22 ^(▲)	33 ^(▲)	13 ^(▲)	80	200
	Sud-Isole	101	12	16 ^(▲)	27 ^(▲)	4 ^(▲)	80	120
	<i>TOTALE</i>	<i>353</i>	<i>15</i>	<i>20^(▲)</i>	<i>29^(▲)</i>	<i>13^(▲)</i>	<i>80^(▲)</i>	<i>133</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	9	9	16	17	13	40	40
	Nord occidentale	11	7	10	12	6	40	40
	Nord orientale	13	12	6	11	0	40	40
	Sud-Isole	16	10	6	11	0	40	40
	<i>TOTALE</i>	<i>49</i>	<i>9</i>	<i>9^(▲)</i>	<i>13^(▲)</i>	<i>1^(▲)</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
TOTALE	Centro	73	12	12 ^(▲)	17 ^(▲)	0 ^(▲)	40	73
	Nord occidentale	119	14	22 ^(▲)	29 ^(▲)	13 ^(▲)	80	133
	Nord orientale	114	18	20 ^(▲)	31 ^(▲)	13 ^(▲)	80	167
	Sud-Isole	131	11	13 ^(▲)	24 ^(▲)	1 ^(▲)	67	120
	<i>TOTALE</i>	<i>437</i>	<i>13</i>	<i>17^(▲)</i>	<i>27^(▲)</i>	<i>7^(▲)</i>	<i>67^(▲)</i>	<i>133</i>

(*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: n ≥ 30 per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); n ≥ 160 per P95 e n ≥ 800 per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

