

# APPENDICE

## 10.B4

### *BEVANDE ALCOLICHE E SOSTITUTI*

*(g/ kg peso corporeo/ die)*

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

**BEVANDE ALCOLICHE E SOSTITUTI****Tabella 1.A.1.1(a)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del gruppo alimentare "BEVANDE ALCOLICHE E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: FEMMINE del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	N	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord occidentale	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord orientale	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sud-Isole	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE</i>	<i>23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	14	0,18	0,65	0,00	2,42	2,42
	Nord occidentale	23	0,00	0,01	0,00	0,01	0,04
	Nord orientale	17	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	Sud-Isole	45	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00	0,01
	<i>TOTALE</i>	<i>99</i>	<i>0,03(▲)</i>	<i>0,24(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,01</i>	<i>2,42</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	Nord occidentale	29	0,07	0,23	0,00	0,67	1,10
	Nord orientale	25	0,01	0,02	0,00	0,00	0,12
	Sud-Isole	60	0,02(▲)	0,13(▲)	0,00(▲)	0,00	1,01
	<i>TOTALE</i>	<i>139</i>	<i>0,02(▲)</i>	<i>0,14(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,01</i>	<i>1,01</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	248	0,97(▲)	1,50(▲)	0,00(▲)	4,04(▲)	5,85
	Nord occidentale	320	1,02(▲)	1,68(▲)	0,00(▲)	4,35(▲)	7,38
	Nord orientale	237	1,12(▲)	1,77(▲)	0,00(▲)	4,92(▲)	7,52
	Sud-Isole(♯)	439	0,80(▲)	1,35(▲)	0,00(▲)	3,75(▲)	6,25
	<i>TOTALE(♯)</i>	<i>1244</i>	<i>0,95(▲)</i>	<i>1,56(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>4,14(▲)</i>	<i>6,43(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	64	0,95(▲)	1,50(▲)	0,00(▲)	4,14	5,65
	Nord occidentale	96	1,33(▲)	1,77(▲)	0,06(▲)	4,90	7,24
	Nord orientale	65	0,95(▲)	1,82(▲)	0,00(▲)	4,29	9,90
	Sud-Isole	91	0,52(▲)	0,97(▲)	0,00(▲)	2,40	4,80
	<i>TOTALE</i>	<i>316</i>	<i>0,94(▲)</i>	<i>1,56(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>4,29(▲)</i>	<i>5,93</i>
TOTALE	Centro	356	0,86(▲)	1,44(▲)	0,00(▲)	3,98(▲)	5,74
	Nord occidentale	473	0,97(▲)	1,64(▲)	0,00(▲)	4,38(▲)	7,24
	Nord orientale	348	0,94(▲)	1,69(▲)	0,00(▲)	4,37(▲)	7,52
	Sud-Isole(♯)	644	0,62(▲)	1,21(▲)	0,00(▲)	3,21(▲)	5,42
	<i>TOTALE(♯)</i>	<i>1821</i>	<i>0,82(▲)</i>	<i>1,48(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>4,04(▲)</i>	<i>6,22(▲)</i>

(\*) Deviazione Standard

(♯) La numerosità può non coincidere con quella riportata nelle tabelle della parte B2, in quanto il dato del peso risulta mancante per una femmina adulta del "Sud-Isole"

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

**Tabella 1.A.1.1(b)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del gruppo alimentare "BEVANDE ALCOLICHE E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	6	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	Nord occidentale	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord orientale	6	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	Sud-Isole	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE</i>	<i>29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	15	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	Nord occidentale	25	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	Nord orientale	12	0,06	0,19	0,00	0,67	0,67
	Sud-Isole	42	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00	0,00
	<i>TOTALE</i>	<i>94</i>	<i>0,01(▲)</i>	<i>0,07(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,67</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	20	0,14	0,53	0,00	1,44	2,31
	Nord occidentale	32	0,03(▲)	0,10(▲)	0,00(▲)	0,39	0,39
	Nord orientale	19	0,11	0,33	0,00	1,13	1,13
	Sud-Isole	37	0,05(▲)	0,16(▲)	0,00(▲)	0,67	0,71
	<i>TOTALE</i>	<i>108</i>	<i>0,07(▲)</i>	<i>0,28(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,57</i>	<i>1,13</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	187	2,10(▲)	2,20(▲)	1,60(▲)	6,59(▲)	9,23
	Nord occidentale	271	2,41(▲)	2,86(▲)	1,57(▲)	8,26(▲)	13,71
	Nord orientale	213	2,70(▲)	3,24(▲)	1,78(▲)	8,54(▲)	11,21
	Sud-Isole	397	1,57(▲)	1,82(▲)	1,07(▲)	5,14(▲)	7,97
	<i>TOTALE</i>	<i>1068</i>	<i>2,10(▲)</i>	<i>2,53(▲)</i>	<i>1,44(▲)</i>	<i>6,94(▲)</i>	<i>10,43(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	39	2,35(▲)	2,30(▲)	2,00(▲)	7,62	8,24
	Nord occidentale	51	2,65(▲)	2,32(▲)	2,63(▲)	7,41	8,00
	Nord orientale	44	2,46(▲)	2,10(▲)	2,25(▲)	5,67	8,21
	Sud-Isole	68	1,85(▲)	2,12(▲)	1,29(▲)	6,00	9,24
	<i>TOTALE</i>	<i>202</i>	<i>2,28(▲)</i>	<i>2,21(▲)</i>	<i>2,00(▲)</i>	<i>6,86(▲)</i>	<i>8,21</i>
TOTALE	Centro	267	1,83(▲)	2,17(▲)	1,17(▲)	6,58(▲)	8,67
	Nord occidentale	384	2,06(▲)	2,70(▲)	0,97(▲)	7,68(▲)	11,99
	Nord orientale	294	2,33(▲)	3,00(▲)	1,39(▲)	8,10(▲)	11,21
	Sud-Isole	556	1,35(▲)	1,80(▲)	0,59(▲)	5,00(▲)	7,84
	<i>TOTALE</i>	<i>1501</i>	<i>1,81(▲)</i>	<i>2,41(▲)</i>	<i>0,89(▲)</i>	<i>6,58(▲)</i>	<i>9,41(▲)</i>

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

**Tabella 1.A.1.1(c)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del gruppo alimentare "BEVANDE ALCOLICHE E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS <sup>(*)</sup>	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	11	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	Nord occidentale	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord orientale	10	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	Sud-Isole	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE</i>	<i>52</i>	<i>0,00<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,00<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,00<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,00</i>	<i>0,01</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	29	0,08	0,45	0,00	0,01	2,42
	Nord occidentale	48	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,01 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,01	0,04
	Nord orientale	29	0,02	0,12	0,00	0,01	0,67
	Sud-Isole	87	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,00	0,01
	<i>TOTALE</i>	<i>193</i>	<i>0,02<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,18<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,00<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,01<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,67</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	45	0,06 <sup>(▲)</sup>	0,35 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,01	2,31
	Nord occidentale	61	0,05 <sup>(▲)</sup>	0,18 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,39	1,10
	Nord orientale	44	0,05 <sup>(▲)</sup>	0,22 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,12	1,13
	Sud-Isole	97	0,03 <sup>(▲)</sup>	0,14 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,01	1,01
	<i>TOTALE</i>	<i>247</i>	<i>0,04<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,22<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,00<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,12<sup>(▲)</sup></i>	<i>1,10</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	435	1,46 <sup>(▲)</sup>	1,91 <sup>(▲)</sup>	0,67 <sup>(▲)</sup>	5,17 <sup>(▲)</sup>	8,19
	Nord occidentale	591	1,66 <sup>(▲)</sup>	2,40 <sup>(▲)</sup>	0,65 <sup>(▲)</sup>	6,53 <sup>(▲)</sup>	11,38
	Nord orientale	450	1,87 <sup>(▲)</sup>	2,69 <sup>(▲)</sup>	0,78 <sup>(▲)</sup>	7,31 <sup>(▲)</sup>	10,20
	Sud-Isole <sup>(#)</sup>	836	1,17 <sup>(▲)</sup>	1,63 <sup>(▲)</sup>	0,47 <sup>(▲)</sup>	4,38 <sup>(▲)</sup>	6,67 <sup>(▲)</sup>
	<i>TOTALE<sup>(#)</sup></i>	<i>2312</i>	<i>1,48<sup>(▲)</sup></i>	<i>2,14<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,59<sup>(▲)</sup></i>	<i>5,57<sup>(▲)</sup></i>	<i>9,14<sup>(▲)</sup></i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	103	1,48 <sup>(▲)</sup>	1,96 <sup>(▲)</sup>	0,56 <sup>(▲)</sup>	5,20	7,62
	Nord occidentale	147	1,79 <sup>(▲)</sup>	2,07 <sup>(▲)</sup>	1,30 <sup>(▲)</sup>	5,65	7,75
	Nord orientale	109	1,56 <sup>(▲)</sup>	2,06 <sup>(▲)</sup>	1,03 <sup>(▲)</sup>	5,67	8,21
	Sud-Isole	159	1,09 <sup>(▲)</sup>	1,70 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	4,80	7,84
	<i>TOTALE</i>	<i>518</i>	<i>1,46<sup>(▲)</sup></i>	<i>1,95<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,40<sup>(▲)</sup></i>	<i>5,62<sup>(▲)</sup></i>	<i>8,00</i>
TOTALE	Centro	623	1,27 <sup>(▲)</sup>	1,85 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	5,00 <sup>(▲)</sup>	7,69
	Nord occidentale	857	1,46 <sup>(▲)</sup>	2,24 <sup>(▲)</sup>	0,01 <sup>(▲)</sup>	5,71 <sup>(▲)</sup>	9,34 <sup>(▲)</sup>
	Nord orientale	642	1,58 <sup>(▲)</sup>	2,48 <sup>(▲)</sup>	0,01 <sup>(▲)</sup>	6,08 <sup>(▲)</sup>	9,96
	Sud-Isole <sup>(#)</sup>	1200	0,96 <sup>(▲)</sup>	1,56 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	4,20 <sup>(▲)</sup>	6,55 <sup>(▲)</sup>
	<i>TOTALE<sup>(#)</sup></i>	<i>3322</i>	<i>1,27<sup>(▲)</sup></i>	<i>2,02<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,00<sup>(▲)</sup></i>	<i>5,25<sup>(▲)</sup></i>	<i>8,67<sup>(▲)</sup></i>

(\*) Deviazione Standard

(#) La numerosità può non coincidere con quella riportata nelle tabelle della parte B2, in quanto il dato del peso risulta mancante per una femmina adulta del "Sud-Isole"

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: n ≥ 30 per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); n ≥ 160 per P95 e n ≥ 800 per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

**Tabella 1.A.1.2(a)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del gruppo alimentare "BEVANDE ALCOLICHE E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: FEMMINE dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% <sup>(*)</sup>	Media	DS <sup>(*)</sup>	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	3	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	1	25	0,00	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	4	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bambini (3-9 anni)	Centro	9	64	0,27	0,81	0,00	2,42	2,42
	Nord occidentale	16	70	0,01	0,01	0,00	0,04	0,04
	Nord orientale	14	82	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	Sud-Isole	22	49	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	<i>TOTALE</i>	61	62	0,04 <sup>(▲)</sup>	0,31 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,01	2,42
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	13	52	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	Nord occidentale	16	55	0,12	0,31	0,00	1,10	1,10
	Nord orientale	18	72	0,01	0,03	0,00	0,12	0,12
	Sud-Isole	35	58	0,03 <sup>(▲)</sup>	0,17 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,00	1,01
	<i>TOTALE</i>	82	59	0,04 <sup>(▲)</sup>	0,18 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,08	1,10
Adulti (18-64 anni)	Centro	169	68	1,43 <sup>(▲)</sup>	1,63 <sup>(▲)</sup>	0,95 <sup>(▲)</sup>	4,27 <sup>(▲)</sup>	6,35
	Nord occidentale	240	75	1,36 <sup>(▲)</sup>	1,82 <sup>(▲)</sup>	0,79 <sup>(▲)</sup>	4,73 <sup>(▲)</sup>	7,44
	Nord orientale	176	74	1,51 <sup>(▲)</sup>	1,90 <sup>(▲)</sup>	0,83 <sup>(▲)</sup>	5,57 <sup>(▲)</sup>	8,81
	Sud-Isole <sup>(#)</sup>	309	70	1,14 <sup>(▲)</sup>	1,49 <sup>(▲)</sup>	0,62 <sup>(▲)</sup>	4,14 <sup>(▲)</sup>	6,43
	<i>TOTALE<sup>(#)</sup></i>	894	72	1,33 <sup>(▲)</sup>	1,70 <sup>(▲)</sup>	0,77 <sup>(▲)</sup>	4,44 <sup>(▲)</sup>	7,38 <sup>(▲)</sup>
Anziani (65-97 anni)	Centro	43	67	1,41 <sup>(▲)</sup>	1,65 <sup>(▲)</sup>	0,71 <sup>(▲)</sup>	5,14	5,65
	Nord occidentale	72	75	1,77 <sup>(▲)</sup>	1,84 <sup>(▲)</sup>	1,41 <sup>(▲)</sup>	4,93	7,24
	Nord orientale	40	62	1,55 <sup>(▲)</sup>	2,11 <sup>(▲)</sup>	1,13 <sup>(▲)</sup>	6,08	9,90
	Sud-Isole	55	60	0,87 <sup>(▲)</sup>	1,13 <sup>(▲)</sup>	0,33 <sup>(▲)</sup>	3,75	4,80
	<i>TOTALE</i>	210	66	1,42 <sup>(▲)</sup>	1,73 <sup>(▲)</sup>	0,98 <sup>(▲)</sup>	4,90 <sup>(▲)</sup>	6,22
TOTALE	Centro	237	67	1,29 <sup>(▲)</sup>	1,60 <sup>(▲)</sup>	0,71 <sup>(▲)</sup>	4,27 <sup>(▲)</sup>	5,85
	Nord occidentale	344	73	1,33 <sup>(▲)</sup>	1,79 <sup>(▲)</sup>	0,63 <sup>(▲)</sup>	4,67 <sup>(▲)</sup>	7,38
	Nord orientale	249	72	1,31 <sup>(▲)</sup>	1,88 <sup>(▲)</sup>	0,15 <sup>(▲)</sup>	5,22 <sup>(▲)</sup>	8,81
	Sud-Isole <sup>(#)</sup>	421	65	0,95 <sup>(▲)</sup>	1,39 <sup>(▲)</sup>	0,19 <sup>(▲)</sup>	3,78 <sup>(▲)</sup>	6,25
	<i>TOTALE<sup>(#)</sup></i>	1251	69	1,19 <sup>(▲)</sup>	1,66 <sup>(▲)</sup>	0,50 <sup>(▲)</sup>	4,37 <sup>(▲)</sup>	6,67 <sup>(▲)</sup>

(\*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(\*) Deviazione Standard

(#) La numerosità può non coincidere con quella riportata nelle tabelle della parte B2, in quanto il dato del peso risulta mancante per una femmina adulta del "Sud-Isole"

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: n ≥ 30 per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); n ≥ 160 per P95 e n ≥ 800 per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

**Tabella 1.A.1.2(b)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del gruppo alimentare "BEVANDE ALCOLICHE E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: MASCHI dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% <sup>(*)</sup>	Media	DS <sup>(*)</sup>	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	3	50	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	Nord occidentale	2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord orientale	1	17	0,01	--	--	--	--
	Sud-Isole	1	8	0,00	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>7</i>	<i>24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	7	47	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	Nord occidentale	17	68	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	Nord orientale	6	50	0,11	0,27	0,00	0,67	0,67
	Sud-Isole	22	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE</i>	<i>52</i>	<i>55</i>	<i>0,01<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,09<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,00<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,01</i>	<i>0,67</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	11	55	0,26	0,70	0,00	2,31	2,31
	Nord occidentale	25	78	0,04	0,11	0,00	0,39	0,39
	Nord orientale	12	63	0,17	0,41	0,00	1,13	1,13
	Sud-Isole	22	59	0,08	0,21	0,00	0,67	0,71
	<i>TOTALE</i>	<i>70</i>	<i>65</i>	<i>0,11<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,35<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,00<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,71</i>	<i>2,31</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	155	83	2,53 <sup>(▲)</sup>	2,17 <sup>(▲)</sup>	2,35 <sup>(▲)</sup>	6,67	9,23
	Nord occidentale	239	88	2,74 <sup>(▲)</sup>	2,89 <sup>(▲)</sup>	2,05 <sup>(▲)</sup>	8,67 <sup>(▲)</sup>	13,71
	Nord orientale	190	89	3,03 <sup>(▲)</sup>	3,28 <sup>(▲)</sup>	2,14 <sup>(▲)</sup>	8,60 <sup>(▲)</sup>	15,38
	Sud-Isole	335	84	1,86 <sup>(▲)</sup>	1,84 <sup>(▲)</sup>	1,50 <sup>(▲)</sup>	5,33 <sup>(▲)</sup>	7,97
	<i>TOTALE</i>	<i>919</i>	<i>86</i>	<i>2,44<sup>(▲)</sup></i>	<i>2,57<sup>(▲)</sup></i>	<i>1,84<sup>(▲)</sup></i>	<i>7,59<sup>(▲)</sup></i>	<i>10,90<sup>(▲)</sup></i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	33	85	2,78 <sup>(▲)</sup>	2,25 <sup>(▲)</sup>	2,50 <sup>(▲)</sup>	7,62	8,24
	Nord occidentale	43	84	3,15 <sup>(▲)</sup>	2,20 <sup>(▲)</sup>	2,92 <sup>(▲)</sup>	7,41	8,00
	Nord orientale	43	98	2,52 <sup>(▲)</sup>	2,09 <sup>(▲)</sup>	2,29 <sup>(▲)</sup>	5,67	8,21
	Sud-Isole	58	85	2,17 <sup>(▲)</sup>	2,14 <sup>(▲)</sup>	1,62 <sup>(▲)</sup>	6,22	9,24
	<i>TOTALE</i>	<i>177</i>	<i>88</i>	<i>2,60<sup>(▲)</sup></i>	<i>2,18<sup>(▲)</sup></i>	<i>2,33<sup>(▲)</sup></i>	<i>7,56<sup>(▲)</sup></i>	<i>8,24</i>
TOTALE	Centro	209	78	2,33 <sup>(▲)</sup>	2,20 <sup>(▲)</sup>	2,00 <sup>(▲)</sup>	6,67 <sup>(▲)</sup>	8,67
	Nord occidentale	326	85	2,42 <sup>(▲)</sup>	2,77 <sup>(▲)</sup>	1,80 <sup>(▲)</sup>	8,00 <sup>(▲)</sup>	11,99
	Nord orientale	252	86	2,72 <sup>(▲)</sup>	3,07 <sup>(▲)</sup>	1,90 <sup>(▲)</sup>	8,29 <sup>(▲)</sup>	11,21
	Sud-Isole	438	79	1,72 <sup>(▲)</sup>	1,87 <sup>(▲)</sup>	1,28 <sup>(▲)</sup>	5,33 <sup>(▲)</sup>	7,97
	<i>TOTALE</i>	<i>1225</i>	<i>82</i>	<i>2,22<sup>(▲)</sup></i>	<i>2,49<sup>(▲)</sup></i>	<i>1,60<sup>(▲)</sup></i>	<i>7,31<sup>(▲)</sup></i>	<i>10,14<sup>(▲)</sup></i>

(\*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

**Tabella 1.A.1.2(c)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del gruppo alimentare "BEVANDE ALCOLICHE E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% <sup>(*)</sup>	Media	DS <sup>(*)</sup>	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	6	55	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	Nord occidentale	2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord orientale	2	20	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	Sud-Isole	1	5	0,00	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>11</i>	<i>21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	16	55	0,15	0,61	0,00	2,42	2,42
	Nord occidentale	33	69	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,01 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,01	0,04
	Nord orientale	20	69	0,04	0,15	0,00	0,34	0,67
	Sud-Isole	44	51	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,00	0,01
	<i>TOTALE</i>	<i>113</i>	<i>59</i>	<i>0,03<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,24<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,00<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,01</i>	<i>0,67</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	24	53	0,12	0,48	0,00	0,57	2,31
	Nord occidentale	41	67	0,07 <sup>(▲)</sup>	0,21 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,39	1,10
	Nord orientale	30	68	0,08 <sup>(▲)</sup>	0,26 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,95	1,13
	Sud-Isole	57	59	0,05 <sup>(▲)</sup>	0,19 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,67	1,01
	<i>TOTALE</i>	<i>152</i>	<i>62</i>	<i>0,07<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,27<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,00<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,67</i>	<i>1,13</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	324	74	1,96 <sup>(▲)</sup>	1,98 <sup>(▲)</sup>	1,53 <sup>(▲)</sup>	5,77 <sup>(▲)</sup>	8,67
	Nord occidentale	479	81	2,05 <sup>(▲)</sup>	2,51 <sup>(▲)</sup>	1,21 <sup>(▲)</sup>	7,44 <sup>(▲)</sup>	11,99
	Nord orientale	366	81	2,30 <sup>(▲)</sup>	2,81 <sup>(▲)</sup>	1,54 <sup>(▲)</sup>	7,67 <sup>(▲)</sup>	10,90
	Sud-Isole <sup>(#)</sup>	644	77	1,52 <sup>(▲)</sup>	1,71 <sup>(▲)</sup>	1,04 <sup>(▲)</sup>	4,80 <sup>(▲)</sup>	6,85
	<i>TOTALE<sup>(#)</sup></i>	<i>1813</i>	<i>78</i>	<i>1,89<sup>(▲)</sup></i>	<i>2,26<sup>(▲)</sup></i>	<i>1,27<sup>(▲)</sup></i>	<i>6,04<sup>(▲)</sup></i>	<i>9,41<sup>(▲)</sup></i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	76	74	2,00 <sup>(▲)</sup>	2,03 <sup>(▲)</sup>	1,64 <sup>(▲)</sup>	6,40	8,24
	Nord occidentale	115	78	2,29 <sup>(▲)</sup>	2,08 <sup>(▲)</sup>	2,16 <sup>(▲)</sup>	6,86	7,75
	Nord orientale	83	76	2,05 <sup>(▲)</sup>	2,14 <sup>(▲)</sup>	1,60 <sup>(▲)</sup>	5,93	9,90
	Sud-Isole	113	71	1,53 <sup>(▲)</sup>	1,84 <sup>(▲)</sup>	1,10 <sup>(▲)</sup>	5,02	7,84
	<i>TOTALE</i>	<i>387</i>	<i>75</i>	<i>1,96<sup>(▲)</sup></i>	<i>2,03<sup>(▲)</sup></i>	<i>1,52<sup>(▲)</sup></i>	<i>5,91<sup>(▲)</sup></i>	<i>8,21</i>
TOTALE	Centro	446	72	1,78 <sup>(▲)</sup>	1,97 <sup>(▲)</sup>	1,27 <sup>(▲)</sup>	5,65 <sup>(▲)</sup>	8,24
	Nord occidentale	670	78	1,86 <sup>(▲)</sup>	2,38 <sup>(▲)</sup>	1,06 <sup>(▲)</sup>	6,80 <sup>(▲)</sup>	10,43
	Nord orientale	501	78	2,02 <sup>(▲)</sup>	2,64 <sup>(▲)</sup>	1,19 <sup>(▲)</sup>	7,31 <sup>(▲)</sup>	10,14
	Sud-Isole <sup>(#)</sup>	859	72	1,34 <sup>(▲)</sup>	1,70 <sup>(▲)</sup>	0,76 <sup>(▲)</sup>	4,62 <sup>(▲)</sup>	6,85 <sup>(▲)</sup>
	<i>TOTALE<sup>(#)</sup></i>	<i>2476</i>	<i>75</i>	<i>1,70<sup>(▲)</sup></i>	<i>2,17<sup>(▲)</sup></i>	<i>1,00<sup>(▲)</sup></i>	<i>5,76<sup>(▲)</sup></i>	<i>9,23<sup>(▲)</sup></i>

(\*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(\*) Deviazione Standard

(#) La numerosità può non coincidere con quella riportata nelle tabelle della parte B2, in quanto il dato del peso risulta mancante per una femmina adulta del "Sud-Isole"

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: n ≥ 30 per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); n ≥ 160 per P95 e n ≥ 800 per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

**Tabella 1.A.1.3(a)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del sottogruppo alimentare "VINO E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: FEMMINE del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS <sup>(*)</sup>	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord occidentale	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord orientale	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sud-Isole	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE</i>	<i>23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	14	0,18	0,65	0,00	2,42	2,42
	Nord occidentale	23	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	Nord orientale	17	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	Sud-Isole	45	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,00	0,01
	<i>TOTALE</i>	<i>99</i>	<i>0,03<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,24<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,00<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,01</i>	<i>2,42</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	Nord occidentale	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord orientale	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sud-Isole	60	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,00	0,00
	<i>TOTALE</i>	<i>139</i>	<i>0,00<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,00<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,00<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	248	0,70 <sup>(▲)</sup>	1,16 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	3,39 <sup>(▲)</sup>	4,66
	Nord occidentale	320	0,69 <sup>(▲)</sup>	1,21 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	3,28 <sup>(▲)</sup>	4,90
	Nord orientale	237	0,74 <sup>(▲)</sup>	1,24 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	3,34 <sup>(▲)</sup>	4,37
	Sud-Isole <sup>(#)</sup>	439	0,47 <sup>(▲)</sup>	0,89 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	2,31 <sup>(▲)</sup>	4,17
	<i>TOTALE<sup>(#)</sup></i>	<i>1244</i>	<i>0,62<sup>(▲)</sup></i>	<i>1,11<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,00<sup>(▲)</sup></i>	<i>3,16<sup>(▲)</sup></i>	<i>4,61<sup>(▲)</sup></i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	64	0,87 <sup>(▲)</sup>	1,47 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	4,14	5,65
	Nord occidentale	96	1,24 <sup>(▲)</sup>	1,71 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	4,44	7,24
	Nord orientale	65	0,89 <sup>(▲)</sup>	1,73 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	3,78	9,90
	Sud-Isole	91	0,50 <sup>(▲)</sup>	0,95 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	2,40	4,80
	<i>TOTALE</i>	<i>316</i>	<i>0,88<sup>(▲)</sup></i>	<i>1,51<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,00<sup>(▲)</sup></i>	<i>4,14<sup>(▲)</sup></i>	<i>5,65</i>
TOTALE	Centro	356	0,65 <sup>(▲)</sup>	1,18 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	3,39 <sup>(▲)</sup>	5,05
	Nord occidentale	473	0,72 <sup>(▲)</sup>	1,30 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	3,64 <sup>(▲)</sup>	5,21
	Nord orientale	348	0,67 <sup>(▲)</sup>	1,29 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	3,34 <sup>(▲)</sup>	5,87
	Sud-Isole <sup>(#)</sup>	644	0,39 <sup>(▲)</sup>	0,84 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	2,05 <sup>(▲)</sup>	4,14
	<i>TOTALE<sup>(#)</sup></i>	<i>1821</i>	<i>0,58<sup>(▲)</sup></i>	<i>1,14<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,00<sup>(▲)</sup></i>	<i>3,20<sup>(▲)</sup></i>	<i>4,80<sup>(▲)</sup></i>

(\*) Deviazione Standard

(#) La numerosità può non coincidere con quella riportata nelle tabelle della parte B2, in quanto il dato del peso risulta mancante per una femmina adulta del "Sud-Isole"

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.



I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

**Tabella 1.A.1.3(b)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del sottogruppo alimentare "VINO E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	6	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	Nord occidentale	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord orientale	6	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	Sud-Isole	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE</i>	<i>29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	15	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	Nord occidentale	25	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	Nord orientale	12	0,06	0,19	0,00	0,67	0,67
	Sud-Isole	42	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00	0,00
	<i>TOTALE</i>	<i>94</i>	<i>0,01(▲)</i>	<i>0,07(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,67</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	20	0,06	0,18	0,00	0,59	0,62
	Nord occidentale	32	0,03(▲)	0,10(▲)	0,00(▲)	0,39	0,39
	Nord orientale	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sud-Isole	37	0,05(▲)	0,16(▲)	0,00(▲)	0,67	0,71
	<i>TOTALE</i>	<i>108</i>	<i>0,04(▲)</i>	<i>0,13(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,39</i>	<i>0,67</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	187	1,58(▲)	1,89(▲)	0,87(▲)	5,30(▲)	8,19
	Nord occidentale	271	1,49(▲)	1,95(▲)	0,54(▲)	5,25(▲)	7,05
	Nord orientale	213	1,53(▲)	1,96(▲)	0,73(▲)	5,41(▲)	7,93
	Sud-Isole	397	1,07(▲)	1,39(▲)	0,58(▲)	3,81(▲)	6,00
	<i>TOTALE</i>	<i>1068</i>	<i>1,36(▲)</i>	<i>1,76(▲)</i>	<i>0,61(▲)</i>	<i>4,85(▲)</i>	<i>7,11(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	39	2,20(▲)	2,32(▲)	2,00(▲)	7,62	7,84
	Nord occidentale	51	2,49(▲)	2,26(▲)	2,35(▲)	6,86	8,00
	Nord orientale	44	2,12(▲)	1,61(▲)	2,21(▲)	4,66	6,51
	Sud-Isole	68	1,75(▲)	1,91(▲)	1,24(▲)	6,00	6,28
	<i>TOTALE</i>	<i>202</i>	<i>2,11(▲)</i>	<i>2,04(▲)</i>	<i>2,00(▲)</i>	<i>6,22(▲)</i>	<i>7,62</i>
TOTALE	Centro	267	1,43(▲)	1,92(▲)	0,44(▲)	5,30(▲)	7,84
	Nord occidentale	384	1,39(▲)	1,95(▲)	0,00(▲)	5,26(▲)	7,18
	Nord orientale	294	1,43(▲)	1,87(▲)	0,59(▲)	5,30(▲)	7,93
	Sud-Isole	556	0,98(▲)	1,43(▲)	0,00(▲)	4,00(▲)	6,10
	<i>TOTALE</i>	<i>1501</i>	<i>1,25(▲)</i>	<i>1,76(▲)</i>	<i>0,07(▲)</i>	<i>4,78(▲)</i>	<i>7,11(▲)</i>

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

**Tabella 1.A.1.3(c)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del sottogruppo alimentare "VINO E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	11	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	Nord occidentale	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord orientale	10	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	Sud-Isole	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE</i>	<i>52</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,01</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	29	0,08	0,45	0,00	0,01	2,42
	Nord occidentale	48	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00(▲)	0,01	0,01
	Nord orientale	29	0,02	0,12	0,00	0,01	0,67
	Sud-Isole	87	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00	0,01
	<i>TOTALE</i>	<i>193</i>	<i>0,02(▲)</i>	<i>0,18(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,01(▲)</i>	<i>0,67</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	45	0,03(▲)	0,12(▲)	0,00(▲)	0,01	0,62
	Nord occidentale	61	0,02(▲)	0,07(▲)	0,00(▲)	0,06	0,39
	Nord orientale	44	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00	0,00
	Sud-Isole	97	0,02(▲)	0,10(▲)	0,00(▲)	0,00	0,71
	<i>TOTALE</i>	<i>247</i>	<i>0,02(▲)</i>	<i>0,09(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,62</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	435	1,08(▲)	1,58(▲)	0,00(▲)	4,10(▲)	6,53
	Nord occidentale	591	1,06(▲)	1,64(▲)	0,00(▲)	4,57(▲)	6,38
	Nord orientale	450	1,11(▲)	1,67(▲)	0,00(▲)	4,37(▲)	7,27
	Sud-Isole <sup>(#)</sup>	836	0,76(▲)	1,19(▲)	0,00(▲)	3,33(▲)	4,76(▲)
	<i>TOTALE<sup>(#)</sup></i>	<i>2312</i>	<i>0,96(▲)</i>	<i>1,49(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>4,10(▲)</i>	<i>6,28(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	103	1,38(▲)	1,94(▲)	0,22(▲)	5,20	7,62
	Nord occidentale	147	1,68(▲)	2,00(▲)	0,62(▲)	5,60	7,57
	Nord orientale	109	1,39(▲)	1,78(▲)	0,96(▲)	4,29	6,51
	Sud-Isole	159	1,04(▲)	1,57(▲)	0,00(▲)	4,80	6,22
	<i>TOTALE</i>	<i>518</i>	<i>1,36(▲)</i>	<i>1,83(▲)</i>	<i>0,23(▲)</i>	<i>5,05(▲)</i>	<i>7,56</i>
TOTALE	Centro	623	0,99(▲)	1,59(▲)	0,00(▲)	4,14(▲)	6,59
	Nord occidentale	857	1,02(▲)	1,66(▲)	0,00(▲)	4,51(▲)	6,80(▲)
	Nord orientale	642	1,02(▲)	1,63(▲)	0,00(▲)	4,27(▲)	7,14
	Sud-Isole <sup>(#)</sup>	1200	0,67(▲)	1,19(▲)	0,00(▲)	3,33(▲)	5,24(▲)
	<i>TOTALE<sup>(#)</sup></i>	<i>3322</i>	<i>0,88(▲)</i>	<i>1,49(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>4,07(▲)</i>	<i>6,38(▲)</i>

(\*) Deviazione Standard

(#) La numerosità può non coincidere con quella riportata nelle tabelle della parte B2, in quanto il dato del peso risulta mancante per una femmina adulta del "Sud-Isole"

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

**Tabella 1.A.1.4(a)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del sottogruppo alimentare "VINO E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: FEMMINE dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% <sup>(°)</sup>	Media	DS <sup>(*)</sup>	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	3	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	1	25	0,00	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	4	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bambini (3-9 anni)	Centro	9	64	0,27	0,81	0,00	2,42	2,42
	Nord occidentale	14	61	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	Nord orientale	14	82	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	Sud-Isole	20	44	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	<i>TOTALE</i>	57	58	0,04 <sup>(▲)</sup>	0,32 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,01	2,42
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	13	52	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	Nord occidentale	16	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord orientale	18	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sud-Isole	31	52	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,00	0,00
	<i>TOTALE</i>	78	56	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,00	0,01
Adulti (18-64 anni)	Centro	154	62	1,12 <sup>(▲)</sup>	1,30 <sup>(▲)</sup>	0,69 <sup>(▲)</sup>	3,70	4,95
	Nord occidentale	227	71	0,97 <sup>(▲)</sup>	1,34 <sup>(▲)</sup>	0,29 <sup>(▲)</sup>	4,10 <sup>(▲)</sup>	5,21
	Nord orientale	158	67	1,10 <sup>(▲)</sup>	1,38 <sup>(▲)</sup>	0,62 <sup>(▲)</sup>	3,84	5,87
	Sud-Isole <sup>(#)</sup>	280	64	0,74 <sup>(▲)</sup>	1,03 <sup>(▲)</sup>	0,22 <sup>(▲)</sup>	3,08 <sup>(▲)</sup>	4,44
	<i>TOTALE<sup>(#)</sup></i>	819	66	0,95 <sup>(▲)</sup>	1,25 <sup>(▲)</sup>	0,38 <sup>(▲)</sup>	3,60 <sup>(▲)</sup>	4,90 <sup>(▲)</sup>
Anziani (65-97 anni)	Centro	40	63	1,40 <sup>(▲)</sup>	1,66 <sup>(▲)</sup>	0,85 <sup>(▲)</sup>	5,17	5,65
	Nord occidentale	70	73	1,71 <sup>(▲)</sup>	1,80 <sup>(▲)</sup>	1,40 <sup>(▲)</sup>	4,93	7,24
	Nord orientale	38	58	1,52 <sup>(▲)</sup>	2,05 <sup>(▲)</sup>	1,13 <sup>(▲)</sup>	5,93	9,90
	Sud-Isole	55	60	0,83 <sup>(▲)</sup>	1,11 <sup>(▲)</sup>	0,30 <sup>(▲)</sup>	3,75	4,80
	<i>TOTALE</i>	203	64	1,37 <sup>(▲)</sup>	1,69 <sup>(▲)</sup>	0,98 <sup>(▲)</sup>	4,44 <sup>(▲)</sup>	5,93
TOTALE	Centro	219	62	1,06 <sup>(▲)</sup>	1,36 <sup>(▲)</sup>	0,36 <sup>(▲)</sup>	3,77 <sup>(▲)</sup>	5,14
	Nord occidentale	327	69	1,04 <sup>(▲)</sup>	1,46 <sup>(▲)</sup>	0,01 <sup>(▲)</sup>	4,29 <sup>(▲)</sup>	5,23
	Nord orientale	229	66	1,01 <sup>(▲)</sup>	1,48 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	3,78 <sup>(▲)</sup>	5,93
	Sud-Isole <sup>(#)</sup>	386	60	0,66 <sup>(▲)</sup>	1,00 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	2,70 <sup>(▲)</sup>	4,44
	<i>TOTALE<sup>(#)</sup></i>	1161	64	0,91 <sup>(▲)</sup>	1,32 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	3,70 <sup>(▲)</sup>	5,14 <sup>(▲)</sup>

(°) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(\*) Deviazione Standard

(#) La numerosità può non coincidere con quella riportata nelle tabelle della parte B2, in quanto il dato del peso risulta mancante per una femmina adulta del "Sud-Isole"

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: n ≥ 30 per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); n ≥ 160 per P95 e n ≥ 800 per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

**Tabella 1.A.1.4(b)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del sottogruppo alimentare "VINO E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: MASCHI dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	%(*)	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	2	33	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
	Nord occidentale	2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord orientale	1	17	0,01	--	--	--	--
	Sud-Isole	1	8	0,00	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>6</i>	<i>21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	7	47	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	Nord occidentale	16	64	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	Nord orientale	6	50	0,11	0,27	0,00	0,67	0,67
	Sud-Isole	22	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE</i>	<i>51</i>	<i>54</i>	<i>0,01(▲)</i>	<i>0,09(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,01</i>	<i>0,67</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	11	55	0,11	0,24	0,00	0,62	0,62
	Nord occidentale	24	75	0,04	0,11	0,00	0,39	0,39
	Nord orientale	11	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sud-Isole	20	54	0,09	0,22	0,00	0,69	0,71
	<i>TOTALE</i>	<i>66</i>	<i>61</i>	<i>0,06(▲)</i>	<i>0,17(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,57</i>	<i>0,71</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	150	80	1,97(▲)	1,92(▲)	1,59(▲)	5,63	8,19
	Nord occidentale	222	82	1,82(▲)	2,01(▲)	1,20(▲)	5,43(▲)	7,05
	Nord orientale	173	81	1,88(▲)	2,02(▲)	1,37(▲)	6,28(▲)	8,54
	Sud-Isole	311	78	1,37(▲)	1,44(▲)	1,11(▲)	4,00(▲)	6,00
	<i>TOTALE</i>	<i>856</i>	<i>80</i>	<i>1,70(▲)</i>	<i>1,82(▲)</i>	<i>1,27(▲)</i>	<i>5,26(▲)</i>	<i>7,18(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	32	82	2,68(▲)	2,30(▲)	2,40(▲)	7,62	7,84
	Nord occidentale	43	84	2,95(▲)	2,16(▲)	2,73(▲)	6,86	8,00
	Nord orientale	42	95	2,23(▲)	1,57(▲)	2,25(▲)	4,66	6,51
	Sud-Isole	57	84	2,09(▲)	1,91(▲)	1,65(▲)	6,10	6,28
	<i>TOTALE</i>	<i>174</i>	<i>86</i>	<i>2,44(▲)</i>	<i>2,00(▲)</i>	<i>2,30(▲)</i>	<i>6,40(▲)</i>	<i>7,84</i>
TOTALE	Centro	202	76	1,89(▲)	2,00(▲)	1,51(▲)	5,78(▲)	7,84
	Nord occidentale	307	80	1,73(▲)	2,04(▲)	0,98(▲)	5,65(▲)	7,18
	Nord orientale	233	79	1,80(▲)	1,93(▲)	1,33(▲)	5,52(▲)	7,93
	Sud-Isole	411	74	1,33(▲)	1,52(▲)	1,00(▲)	4,19(▲)	6,22
	<i>TOTALE</i>	<i>1153</i>	<i>77</i>	<i>1,63(▲)</i>	<i>1,85(▲)</i>	<i>1,11(▲)</i>	<i>5,34(▲)</i>	<i>7,56(▲)</i>

(\*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

**Tabella 1.A.1.4(c)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del sottogruppo alimentare "VINO E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% <sup>(*)</sup>	Media	DS <sup>(*)</sup>	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	5	45	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	Nord occidentale	2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord orientale	2	20	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	Sud-Isole	1	5	0,00	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>10</i>	<i>19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	16	55	0,15	0,61	0,00	2,42	2,42
	Nord occidentale	30	63	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,01	0,01
	Nord orientale	20	69	0,04	0,15	0,00	0,34	0,67
	Sud-Isole	42	48	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,00	0,01
	<i>TOTALE</i>	<i>108</i>	<i>56</i>	<i>0,03<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,24<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,00<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,01</i>	<i>0,67</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	24	53	0,05	0,17	0,00	0,57	0,62
	Nord occidentale	40	66	0,03 <sup>(▲)</sup>	0,09 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,23	0,39
	Nord orientale	29	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sud-Isole	51	53	0,03 <sup>(▲)</sup>	0,14 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,31	0,71
	<i>TOTALE</i>	<i>144</i>	<i>58</i>	<i>0,03<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,12<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,00<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,07</i>	<i>0,67</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	304	70	1,54 <sup>(▲)</sup>	1,69 <sup>(▲)</sup>	1,13 <sup>(▲)</sup>	4,66 <sup>(▲)</sup>	6,59
	Nord occidentale	449	76	1,39 <sup>(▲)</sup>	1,75 <sup>(▲)</sup>	0,67 <sup>(▲)</sup>	4,90 <sup>(▲)</sup>	6,67
	Nord orientale	331	74	1,51 <sup>(▲)</sup>	1,79 <sup>(▲)</sup>	1,00 <sup>(▲)</sup>	5,13 <sup>(▲)</sup>	7,50
	Sud-Isole <sup>(#)</sup>	591	71	1,07 <sup>(▲)</sup>	1,30 <sup>(▲)</sup>	0,67 <sup>(▲)</sup>	3,72 <sup>(▲)</sup>	5,49
	<i>TOTALE<sup>(#)</sup></i>	<i>1675</i>	<i>72</i>	<i>1,33<sup>(▲)</sup></i>	<i>1,61<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,79<sup>(▲)</sup></i>	<i>4,44<sup>(▲)</sup></i>	<i>6,67<sup>(▲)</sup></i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	72	70	1,97 <sup>(▲)</sup>	2,06 <sup>(▲)</sup>	1,60 <sup>(▲)</sup>	6,40	7,84
	Nord occidentale	113	77	2,18 <sup>(▲)</sup>	2,03 <sup>(▲)</sup>	2,00 <sup>(▲)</sup>	5,93	7,57
	Nord orientale	80	73	1,89 <sup>(▲)</sup>	1,84 <sup>(▲)</sup>	1,67 <sup>(▲)</sup>	5,16	9,90
	Sud-Isole	112	70	1,47 <sup>(▲)</sup>	1,69 <sup>(▲)</sup>	1,08 <sup>(▲)</sup>	5,02	6,22
	<i>TOTALE</i>	<i>377</i>	<i>73</i>	<i>1,87<sup>(▲)</sup></i>	<i>1,91<sup>(▲)</sup></i>	<i>1,45<sup>(▲)</sup></i>	<i>5,67<sup>(▲)</sup></i>	<i>7,62</i>
TOTALE	Centro	421	68	1,46 <sup>(▲)</sup>	1,74 <sup>(▲)</sup>	0,79 <sup>(▲)</sup>	4,95 <sup>(▲)</sup>	7,56
	Nord occidentale	634	74	1,38 <sup>(▲)</sup>	1,80 <sup>(▲)</sup>	0,51 <sup>(▲)</sup>	4,93 <sup>(▲)</sup>	6,86
	Nord orientale	462	72	1,41 <sup>(▲)</sup>	1,77 <sup>(▲)</sup>	0,80 <sup>(▲)</sup>	4,57 <sup>(▲)</sup>	7,50
	Sud-Isole <sup>(#)</sup>	797	66	1,00 <sup>(▲)</sup>	1,34 <sup>(▲)</sup>	0,54 <sup>(▲)</sup>	3,81 <sup>(▲)</sup>	6,00
	<i>TOTALE<sup>(#)</sup></i>	<i>2314</i>	<i>70</i>	<i>1,27<sup>(▲)</sup></i>	<i>1,65<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,62<sup>(▲)</sup></i>	<i>4,44<sup>(▲)</sup></i>	<i>6,86<sup>(▲)</sup></i>

(\*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(\*) Deviazione Standard

(#) La numerosità può non coincidere con quella riportata nelle tabelle della parte B2, in quanto il dato del peso risulta mancante per una femmina adulta del "Sud-Isole"

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: n ≥ 30 per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); n ≥ 160 per P95 e n ≥ 800 per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

**Tabella 1.A.1.5(a)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del sottogruppo alimentare "BIRRA, SIDRO E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: FEMMINE del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord occidentale	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord orientale	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sud-Isole	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE</i>	<i>23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord occidentale	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord orientale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sud-Isole	45	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00	0,00
	<i>TOTALE</i>	<i>99</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord occidentale	29	0,04	0,20	0,00	0,00	1,10
	Nord orientale	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sud-Isole	60	0,02(▲)	0,13(▲)	0,00(▲)	0,00	1,01
	<i>TOTALE</i>	<i>139</i>	<i>0,02(▲)</i>	<i>0,13(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,00</i>	<i>1,01</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	248	0,25(▲)	0,88(▲)	0,00(▲)	1,80(▲)	3,28
	Nord occidentale	320	0,29(▲)	0,95(▲)	0,00(▲)	1,92(▲)	4,26
	Nord orientale	237	0,34(▲)	0,96(▲)	0,00(▲)	2,38(▲)	3,48
	Sud-Isole(■)	439	0,31(▲)	0,89(▲)	0,00(▲)	2,22(▲)	4,07
	<i>TOTALE(■)</i>	<i>1244</i>	<i>0,30(▲)</i>	<i>0,92(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>2,12(▲)</i>	<i>4,10(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	64	0,06(▲)	0,36(▲)	0,00(▲)	0,00	2,05
	Nord occidentale	96	0,08(▲)	0,53(▲)	0,00(▲)	0,00	4,90
	Nord orientale	65	0,06(▲)	0,35(▲)	0,00(▲)	0,00	2,22
	Sud-Isole	91	0,02(▲)	0,13(▲)	0,00(▲)	0,00	1,06
	<i>TOTALE</i>	<i>316</i>	<i>0,05(▲)</i>	<i>0,38(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>2,00</i>
TOTALE	Centro	356	0,19(▲)	0,76(▲)	0,00(▲)	1,41(▲)	3,06
	Nord occidentale	473	0,21(▲)	0,83(▲)	0,00(▲)	1,39(▲)	4,26
	Nord orientale	348	0,24(▲)	0,82(▲)	0,00(▲)	2,22(▲)	3,38
	Sud-Isole(■)	644	0,22(▲)	0,75(▲)	0,00(▲)	1,44(▲)	3,77
	<i>TOTALE(■)</i>	<i>1821</i>	<i>0,21(▲)</i>	<i>0,79(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>1,64(▲)</i>	<i>3,77(▲)</i>

(\*) Deviazione Standard

(■) La numerosità può non coincidere con quella riportata nelle tabelle della parte B2, in quanto il dato del peso risulta mancante per una femmina adulta del "Sud-Isole"

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

**Tabella 1.A.1.5(b)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del sottogruppo alimentare "BIRRA, SIDRO E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS <sup>(*)</sup>	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord occidentale	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord orientale	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sud-Isole	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE</i>	<i>29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord occidentale	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord orientale	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sud-Isole	42	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,00	0,00
	<i>TOTALE</i>	<i>94</i>	<i>0,00<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,00<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,00<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	20	0,08	0,38	0,00	0,85	1,69
	Nord occidentale	32	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,00	0,00
	Nord orientale	19	0,06	0,26	0,00	1,13	1,13
	Sud-Isole	37	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,00	0,00
	<i>TOTALE</i>	<i>108</i>	<i>0,03<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,19<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,00<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,00</i>	<i>1,13</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	187	0,49 <sup>(▲)</sup>	1,20 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	2,88 <sup>(▲)</sup>	7,33
	Nord occidentale	271	0,84 <sup>(▲)</sup>	1,97 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	5,21 <sup>(▲)</sup>	10,26
	Nord orientale	213	1,08 <sup>(▲)</sup>	2,15 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	4,85 <sup>(▲)</sup>	7,02
	Sud-Isole	397	0,46 <sup>(▲)</sup>	0,98 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	2,56 <sup>(▲)</sup>	4,71
	<i>TOTALE</i>	<i>1068</i>	<i>0,69<sup>(▲)</sup></i>	<i>1,60<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,00<sup>(▲)</sup></i>	<i>3,76<sup>(▲)</sup></i>	<i>7,41<sup>(▲)</sup></i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	39	0,11 <sup>(▲)</sup>	0,40 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	1,63	1,72
	Nord occidentale	51	0,15 <sup>(▲)</sup>	0,48 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	1,48	2,01
	Nord orientale	44	0,32 <sup>(▲)</sup>	0,98 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	1,67	5,13
	Sud-Isole	68	0,08 <sup>(▲)</sup>	0,43 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,00	3,14
	<i>TOTALE</i>	<i>202</i>	<i>0,16<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,60<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,00<sup>(▲)</sup></i>	<i>1,48<sup>(▲)</sup></i>	<i>3,14</i>
TOTALE	Centro	267	0,37 <sup>(▲)</sup>	1,04 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	2,22 <sup>(▲)</sup>	5,77
	Nord occidentale	384	0,61 <sup>(▲)</sup>	1,70 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	3,81 <sup>(▲)</sup>	7,62
	Nord orientale	294	0,83 <sup>(▲)</sup>	1,91 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	4,05 <sup>(▲)</sup>	7,02
	Sud-Isole	556	0,34 <sup>(▲)</sup>	0,86 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	2,00 <sup>(▲)</sup>	4,44
	<i>TOTALE</i>	<i>1501</i>	<i>0,51<sup>(▲)</sup></i>	<i>1,40<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,00<sup>(▲)</sup></i>	<i>2,96<sup>(▲)</sup></i>	<i>6,67<sup>(▲)</sup></i>

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

**Tabella 1.A.1.5(c)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del sottogruppo alimentare "BIRRA, SIDRO E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord occidentale	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord orientale	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sud-Isole	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE</i>	<i>52</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord occidentale	48	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00	0,00
	Nord orientale	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sud-Isole	87	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00	0,00
	<i>TOTALE</i>	<i>193</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,00</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	45	0,04(▲)	0,25(▲)	0,00(▲)	0,00	1,69
	Nord occidentale	61	0,02(▲)	0,14(▲)	0,00(▲)	0,00	1,10
	Nord orientale	44	0,03(▲)	0,17(▲)	0,00(▲)	0,00	1,13
	Sud-Isole	97	0,01(▲)	0,10(▲)	0,00(▲)	0,00	1,01
	<i>TOTALE</i>	<i>247</i>	<i>0,02(▲)</i>	<i>0,16(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>1,10</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	435	0,36(▲)	1,04(▲)	0,00(▲)	2,05(▲)	4,94
	Nord occidentale	591	0,54(▲)	1,53(▲)	0,00(▲)	3,74(▲)	7,51
	Nord orientale	450	0,69(▲)	1,67(▲)	0,00(▲)	3,70(▲)	6,45
	Sud-Isole(§)	836	0,38(▲)	0,94(▲)	0,00(▲)	2,42(▲)	4,44(▲)
	<i>TOTALE(§)</i>	<i>2312</i>	<i>0,48(▲)</i>	<i>1,30(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>2,70(▲)</i>	<i>6,45(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	103	0,08(▲)	0,37(▲)	0,00(▲)	0,00	2,00
	Nord occidentale	147	0,10(▲)	0,51(▲)	0,00(▲)	0,76	2,01
	Nord orientale	109	0,16(▲)	0,69(▲)	0,00(▲)	1,59	3,51
	Sud-Isole	159	0,04(▲)	0,30(▲)	0,00(▲)	0,00	1,57
	<i>TOTALE</i>	<i>518</i>	<i>0,09(▲)</i>	<i>0,48(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,61(▲)</i>	<i>2,05</i>
TOTALE	Centro	623	0,26(▲)	0,89(▲)	0,00(▲)	1,80(▲)	4,27
	Nord occidentale	857	0,39(▲)	1,31(▲)	0,00(▲)	2,20(▲)	7,41(▲)
	Nord orientale	642	0,51(▲)	1,46(▲)	0,00(▲)	3,27(▲)	5,71
	Sud-Isole(§)	1200	0,27(▲)	0,81(▲)	0,00(▲)	1,90(▲)	4,09(▲)
	<i>TOTALE(§)</i>	<i>3322</i>	<i>0,35(▲)</i>	<i>1,12(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>2,15(▲)</i>	<i>5,21(▲)</i>

(\*) Deviazione Standard

(#) La numerosità può non coincidere con quella riportata nelle tabelle della parte B2, in quanto il dato del peso risulta mancante per una femmina adulta del "Sud-Isole"

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.



I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

**Tabella 1.A.1.6(a)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del sottogruppo alimentare "BIRRA, SIDRO E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: FEMMINE dei soli consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% <sup>(*)</sup>	Media	DS <sup>(*)</sup>	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--
Bambini (3-9 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	1	4	0,00	--	--	--	--
	Nord occidentale	1	3	1,10	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	1	2	1,01	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>0,70</i>	<i>0,61</i>	<i>1,01</i>	<i>1,10</i>	<i>1,10</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	37	15	1,68 <sup>(▲)</sup>	1,70 <sup>(▲)</sup>	1,15 <sup>(▲)</sup>	4,94	10,10
	Nord occidentale	50	16	1,84 <sup>(▲)</sup>	1,74 <sup>(▲)</sup>	1,25 <sup>(▲)</sup>	6,72	7,44
	Nord orientale	39	16	2,06 <sup>(▲)</sup>	1,44 <sup>(▲)</sup>	2,12 <sup>(▲)</sup>	5,95	7,78
	Sud-Isole <sup>(#)</sup>	74	17	1,86 <sup>(▲)</sup>	1,37 <sup>(▲)</sup>	1,20 <sup>(▲)</sup>	4,10	8,00
	<i>TOTALE<sup>(#)</sup></i>	<i>200</i>	<i>16</i>	<i>1,86<sup>(▲)</sup></i>	<i>1,54<sup>(▲)</sup></i>	<i>1,31<sup>(▲)</sup></i>	<i>4,55<sup>(▲)</sup></i>	<i>7,89</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	2	3	2,03	0,04	2,03	2,05	2,05
	Nord occidentale	3	3	2,47	2,13	1,59	4,90	4,90
	Nord orientale	2	3	2,03	0,27	2,03	2,22	2,22
	Sud-Isole	2	2	0,83	0,32	0,83	1,06	1,06
	<i>TOTALE</i>	<i>9</i>	<i>3</i>	<i>1,91</i>	<i>1,25</i>	<i>1,83</i>	<i>4,90</i>	<i>4,90</i>
TOTALE	Centro	40	11	1,66 <sup>(▲)</sup>	1,66 <sup>(▲)</sup>	1,17 <sup>(▲)</sup>	4,11	10,10
	Nord occidentale	54	11	1,86 <sup>(▲)</sup>	1,73 <sup>(▲)</sup>	1,25 <sup>(▲)</sup>	6,72	7,44
	Nord orientale	41	12	2,06 <sup>(▲)</sup>	1,41 <sup>(▲)</sup>	2,12 <sup>(▲)</sup>	3,48	7,78
	Sud-Isole <sup>(#)</sup>	77	12	1,82 <sup>(▲)</sup>	1,36 <sup>(▲)</sup>	1,11 <sup>(▲)</sup>	4,10	8,00
	<i>TOTALE<sup>(#)</sup></i>	<i>212</i>	<i>12</i>	<i>1,84<sup>(▲)</sup></i>	<i>1,52<sup>(▲)</sup></i>	<i>1,31<sup>(▲)</sup></i>	<i>4,85<sup>(▲)</sup></i>	<i>7,78</i>

(\*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(\*) Deviazione Standard

(\*) La numerosità può non coincidere con quella riportata nelle tabelle della parte B2, in quanto il dato del peso risulta mancante per una femmina adulta del "Sud-Isole"

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: n ≥ 30 per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); n ≥ 160 per P95 e n ≥ 800 per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

**Tabella 1.A.1.6(b)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del sottogruppo alimentare "BIRRA, SIDRO E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: MASCHI dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% <sup>(*)</sup>	Media	DS <sup>(*)</sup>	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--
Bambini (3-9 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	1	5	1,69	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	1	5	1,13	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>1,41</i>	<i>0,40</i>	<i>1,41</i>	<i>1,69</i>	<i>1,69</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	45	24	2,06 <sup>(▲)</sup>	1,68 <sup>(▲)</sup>	1,53 <sup>(▲)</sup>	5,77	7,41
	Nord occidentale	80	30	2,85 <sup>(▲)</sup>	2,74 <sup>(▲)</sup>	1,85 <sup>(▲)</sup>	7,62	13,33
	Nord orientale	85	40	2,70 <sup>(▲)</sup>	2,68 <sup>(▲)</sup>	1,90 <sup>(▲)</sup>	5,71	22,31
	Sud-Isole	109	27	1,67 <sup>(▲)</sup>	1,22 <sup>(▲)</sup>	1,48 <sup>(▲)</sup>	4,44	5,47
	<i>TOTALE</i>	<i>319</i>	<i>30</i>	<i>2,30<sup>(▲)</sup></i>	<i>2,22<sup>(▲)</sup></i>	<i>1,63<sup>(▲)</sup></i>	<i>6,67<sup>(▲)</sup></i>	<i>10,26</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	3	8	1,47	0,36	1,63	1,72	1,72
	Nord occidentale	5	10	1,53	0,49	1,48	2,01	2,01
	Nord orientale	6	14	2,32	1,66	1,63	5,13	5,13
	Sud-Isole	3	4	1,82	1,21	1,57	3,14	3,14
	<i>TOTALE</i>	<i>17</i>	<i>8</i>	<i>1,85</i>	<i>1,12</i>	<i>1,59</i>	<i>5,13</i>	<i>5,13</i>
TOTALE	Centro	49	18	2,01 <sup>(▲)</sup>	1,61 <sup>(▲)</sup>	1,57 <sup>(▲)</sup>	5,77	7,41
	Nord occidentale	85	22	2,77 <sup>(▲)</sup>	2,68 <sup>(▲)</sup>	1,84 <sup>(▲)</sup>	7,62	13,33
	Nord orientale	92	31	2,66 <sup>(▲)</sup>	2,62 <sup>(▲)</sup>	1,88 <sup>(▲)</sup>	5,71	22,31
	Sud-Isole	112	20	1,68 <sup>(▲)</sup>	1,21 <sup>(▲)</sup>	1,48 <sup>(▲)</sup>	4,44	5,47
	<i>TOTALE</i>	<i>338</i>	<i>23</i>	<i>2,27<sup>(▲)</sup></i>	<i>2,17<sup>(▲)</sup></i>	<i>1,63<sup>(▲)</sup></i>	<i>6,67<sup>(▲)</sup></i>	<i>10,26</i>

(\*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: n ≥ 30 per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); n ≥ 160 per P95 e n ≥ 800 per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

**Tabella 1.A.1.6(c)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del sottogruppo alimentare "BIRRA, SIDRO E SOSTITUTI" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI dei sol consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	%(*)	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--
Bambini (3-9 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	2	4	0,85	1,20	0,85	1,69	1,69
	Nord occidentale	1	2	1,10	--	--	--	--
	Nord orientale	1	2	1,13	--	--	--	--
	Sud-Isole	1	1	1,01	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>5</i>	<i>2</i>	<i>0,99</i>	<i>0,61</i>	<i>1,10</i>	<i>1,69</i>	<i>1,69</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	82	19	1,89 <sup>(▲)</sup>	1,69 <sup>(▲)</sup>	1,42 <sup>(▲)</sup>	4,94	10,10
	Nord occidentale	130	22	2,46 <sup>(▲)</sup>	2,45 <sup>(▲)</sup>	1,57 <sup>(▲)</sup>	7,44	12,64
	Nord orientale	124	28	2,50 <sup>(▲)</sup>	2,38 <sup>(▲)</sup>	1,90 <sup>(▲)</sup>	5,71	7,78
	Sud-Isole <sup>(#)</sup>	183	22	1,75 <sup>(▲)</sup>	1,28 <sup>(▲)</sup>	1,33 <sup>(▲)</sup>	4,30 <sup>(▲)</sup>	6,67
	<i>TOTALE<sup>(#)</sup></i>	<i>519</i>	<i>22</i>	<i>2,13<sup>(▲)</sup></i>	<i>2,00<sup>(▲)</sup></i>	<i>1,57<sup>(▲)</sup></i>	<i>5,95<sup>(▲)</sup></i>	<i>8,00</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	5	5	1,69	0,40	1,72	2,05	2,05
	Nord occidentale	8	5	1,88	1,29	1,54	4,90	4,90
	Nord orientale	8	7	2,25	1,42	1,75	5,13	5,13
	Sud-Isole	5	3	1,43	1,03	1,06	3,14	3,14
	<i>TOTALE</i>	<i>26</i>	<i>5</i>	<i>1,87</i>	<i>1,15</i>	<i>1,61</i>	<i>4,90</i>	<i>5,13</i>
TOTALE	Centro	89	14	1,85 <sup>(▲)</sup>	1,63 <sup>(▲)</sup>	1,45 <sup>(▲)</sup>	4,94	10,10
	Nord occidentale	139	16	2,42 <sup>(▲)</sup>	2,39 <sup>(▲)</sup>	1,57 <sup>(▲)</sup>	7,44	12,64
	Nord orientale	133	21	2,48 <sup>(▲)</sup>	2,32 <sup>(▲)</sup>	1,90 <sup>(▲)</sup>	5,71	7,78
	Sud-Isole <sup>(#)</sup>	189	16	1,73 <sup>(▲)</sup>	1,27 <sup>(▲)</sup>	1,29 <sup>(▲)</sup>	4,30 <sup>(▲)</sup>	6,67
	<i>TOTALE<sup>(#)</sup></i>	<i>550</i>	<i>17</i>	<i>2,10<sup>(▲)</sup></i>	<i>1,96<sup>(▲)</sup></i>	<i>1,57<sup>(▲)</sup></i>	<i>5,71<sup>(▲)</sup></i>	<i>8,00</i>

(\*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(\*) Deviazione Standard

(#) La numerosità può non coincidere con quella riportata nelle tabelle della parte B2, in quanto il dato del peso risulta mancante per una femmina adulta del "Sud-Isole"

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

**Tabella 1.A.1.7(a)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del sottogruppo alimentare "VINO DOLCE, SPUMANTE, APERITIVI E LIQUORI" per classi di età e area geografica: FEMMINE del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS <sup>(*)</sup>	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord occidentale	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord orientale	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sud-Isole	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE</i>	<i>23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord occidentale	23	0,00	0,01	0,00	0,01	0,04
	Nord orientale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sud-Isole	45	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,00	0,00
	<i>TOTALE</i>	<i>99</i>	<i>0,00<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,00<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,00<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,00</i>	<i>0,04</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord occidentale	29	0,03	0,12	0,00	0,08	0,67
	Nord orientale	25	0,00	0,02	0,00	0,00	0,12
	Sud-Isole	60	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,00	0,00
	<i>TOTALE</i>	<i>139</i>	<i>0,01<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,06<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,00<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,00</i>	<i>0,12</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	248	0,03 <sup>(▲)</sup>	0,13 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,02 <sup>(▲)</sup>	0,62
	Nord occidentale	320	0,04 <sup>(▲)</sup>	0,18 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,33 <sup>(▲)</sup>	0,74
	Nord orientale	237	0,04 <sup>(▲)</sup>	0,17 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,44 <sup>(▲)</sup>	0,92
	Sud-Isole <sup>(#)</sup>	439	0,02 <sup>(▲)</sup>	0,11 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,01 <sup>(▲)</sup>	0,65
	<i>TOTALE<sup>(#)</sup></i>	<i>1244</i>	<i>0,03<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,15<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,00<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,19<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,74<sup>(▲)</sup></i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	64	0,01 <sup>(▲)</sup>	0,09 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,00	0,69
	Nord occidentale	96	0,01 <sup>(▲)</sup>	0,04 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,02	0,30
	Nord orientale	65	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,03 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,00	0,22
	Sud-Isole	91	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,03 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,00	0,18
	<i>TOTALE</i>	<i>316</i>	<i>0,01<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,05<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,00<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,00<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,20</i>
TOTALE	Centro	356	0,02 <sup>(▲)</sup>	0,12 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,62
	Nord occidentale	473	0,03 <sup>(▲)</sup>	0,16 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,20 <sup>(▲)</sup>	0,73
	Nord orientale	348	0,03 <sup>(▲)</sup>	0,14 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,19 <sup>(▲)</sup>	0,74
	Sud-Isole <sup>(#)</sup>	644	0,01 <sup>(▲)</sup>	0,09 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,26
	<i>TOTALE<sup>(#)</sup></i>	<i>1821</i>	<i>0,02<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,13<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,00<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,03<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,72<sup>(▲)</sup></i>

(\*) Deviazione Standard

(#) La numerosità può non coincidere con quella riportata nelle tabelle della parte B2, in quanto il dato del peso risulta mancante per una femmina adulta del "Sud-Isole"

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

**Tabella 1.A.1.7(b)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del sottogruppo alimentare "VINO DOLCE, SPUMANTE, APERITIVI E LIQUORI" per classi di età e area geografica: MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord occidentale	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord orientale	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sud-Isole	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE</i>	<i>29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord occidentale	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord orientale	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sud-Isole	42	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00	0,00
	<i>TOTALE</i>	<i>94</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord occidentale	32	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00	0,03
	Nord orientale	19	0,05	0,22	0,00	0,95	0,95
	Sud-Isole	37	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00	0,00
	<i>TOTALE</i>	<i>108</i>	<i>0,01(▲)</i>	<i>0,09(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,03</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	187	0,03(▲)	0,10(▲)	0,00(▲)	0,19(▲)	0,59
	Nord occidentale	271	0,08(▲)	0,27(▲)	0,00(▲)	0,53(▲)	1,36
	Nord orientale	213	0,09(▲)	0,29(▲)	0,00(▲)	0,54(▲)	1,60
	Sud-Isole	397	0,04(▲)	0,19(▲)	0,00(▲)	0,21(▲)	1,03
	<i>TOTALE</i>	<i>1068</i>	<i>0,06(▲)</i>	<i>0,23(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,42(▲)</i>	<i>1,29(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	39	0,04(▲)	0,14(▲)	0,00(▲)	0,39	0,73
	Nord occidentale	51	0,01(▲)	0,07(▲)	0,00(▲)	0,10	0,45
	Nord orientale	44	0,02(▲)	0,09(▲)	0,00(▲)	0,01	0,58
	Sud-Isole	68	0,01(▲)	0,06(▲)	0,00(▲)	0,09	0,41
	<i>TOTALE</i>	<i>202</i>	<i>0,02(▲)</i>	<i>0,09(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,17(▲)</i>	<i>0,45</i>
TOTALE	Centro	267	0,02(▲)	0,10(▲)	0,00(▲)	0,19(▲)	0,59
	Nord occidentale	384	0,06(▲)	0,23(▲)	0,00(▲)	0,41(▲)	1,33
	Nord orientale	294	0,07(▲)	0,26(▲)	0,00(▲)	0,51(▲)	1,60
	Sud-Isole	556	0,03(▲)	0,16(▲)	0,00(▲)	0,17(▲)	0,68
	<i>TOTALE</i>	<i>1501</i>	<i>0,04(▲)</i>	<i>0,20(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,29(▲)</i>	<i>1,00(▲)</i>

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

**Tabella 1.A.1.7(c)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del sottogruppo alimentare "VINO DOLCE, SPUMANTE, APERITIVI E LIQUORI" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord occidentale	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord orientale	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sud-Isole	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE</i>	<i>52</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord occidentale	48	0,00(▲)	0,01(▲)	0,00(▲)	0,00	0,04
	Nord orientale	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sud-Isole	87	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00	0,00
	<i>TOTALE</i>	<i>193</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,01</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	45	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00	0,00
	Nord occidentale	61	0,01(▲)	0,09(▲)	0,00(▲)	0,03	0,67
	Nord orientale	44	0,02(▲)	0,14(▲)	0,00(▲)	0,00	0,95
	Sud-Isole	97	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00(▲)	0,00	0,00
	<i>TOTALE</i>	<i>247</i>	<i>0,01(▲)</i>	<i>0,07(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,12</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	435	0,03(▲)	0,12(▲)	0,00(▲)	0,19(▲)	0,62
	Nord occidentale	591	0,06(▲)	0,23(▲)	0,00(▲)	0,49(▲)	1,33
	Nord orientale	450	0,07(▲)	0,24(▲)	0,00(▲)	0,50(▲)	1,29
	Sud-Isole(§)	836	0,03(▲)	0,15(▲)	0,00(▲)	0,16(▲)	0,71(▲)
	<i>TOTALE(§)</i>	<i>2312</i>	<i>0,04(▲)</i>	<i>0,19(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,29(▲)</i>	<i>0,95(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	103	0,02(▲)	0,11(▲)	0,00(▲)	0,00	0,69
	Nord occidentale	147	0,01(▲)	0,05(▲)	0,00(▲)	0,02	0,30
	Nord orientale	109	0,01(▲)	0,06(▲)	0,00(▲)	0,01	0,22
	Sud-Isole	159	0,01(▲)	0,04(▲)	0,00(▲)	0,01	0,19
	<i>TOTALE</i>	<i>518</i>	<i>0,01(▲)</i>	<i>0,07(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,01(▲)</i>	<i>0,39</i>
TOTALE	Centro	623	0,02(▲)	0,11(▲)	0,00(▲)	0,13(▲)	0,62
	Nord occidentale	857	0,04(▲)	0,19(▲)	0,00(▲)	0,30(▲)	1,09(▲)
	Nord orientale	642	0,05(▲)	0,20(▲)	0,00(▲)	0,36(▲)	0,95
	Sud-Isole(§)	1200	0,02(▲)	0,13(▲)	0,00(▲)	0,01(▲)	0,65(▲)
	<i>TOTALE(§)</i>	<i>3322</i>	<i>0,03(▲)</i>	<i>0,16(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,18(▲)</i>	<i>0,74(▲)</i>

(\*) Deviazione Standard

(§) La numerosità può non coincidere con quella riportata nelle tabelle della parte B2, in quanto il dato del peso risulta mancante per una femmina adulta del "Sud-Isole"

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

**Tabella 1.A.1.8(a)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del sottogruppo alimentare "VINO DOLCE, SPUMANTE, APERITIVI E LIQUORI" per classi di età e area geografica: FEMMINE dei soli consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	%(*)	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--
Bambini (3-9 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	2	9	0,03	0,02	0,03	0,04	0,04
	Nord orientale	1	6	0,00	--	--	--	--
	Sud-Isole	2	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>0,01</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,04</i>	<i>0,04</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	4	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord occidentale	5	17	0,16	0,29	0,04	0,67	0,67
	Nord orientale	1	4	0,12	--	--	--	--
	Sud-Isole	7	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE</i>	<i>17</i>	<i>12</i>	<i>0,05</i>	<i>0,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,67</i>	<i>0,67</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	30	12	0,21(▲)	0,34(▲)	0,00(▲)	0,89	1,41
	Nord occidentale	42	13	0,34(▲)	0,40(▲)	0,21(▲)	1,09	1,61
	Nord orientale	39	16	0,27(▲)	0,34(▲)	0,11(▲)	0,95	1,33
	Sud-Isole(■)	45	10	0,16(▲)	0,32(▲)	0,01(▲)	0,83	1,33
	<i>TOTALE(■)</i>	<i>156</i>	<i>13</i>	<i>0,25(▲)</i>	<i>0,36(▲)</i>	<i>0,02(▲)</i>	<i>0,95</i>	<i>1,42</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	4	6	0,17	0,34	0,00	0,69	0,69
	Nord occidentale	6	6	0,11	0,11	0,08	0,30	0,30
	Nord orientale	6	9	0,05	0,09	0,00	0,22	0,22
	Sud-Isole	7	8	0,05	0,08	0,00	0,18	0,18
	<i>TOTALE</i>	<i>23</i>	<i>7</i>	<i>0,09</i>	<i>0,16</i>	<i>0,01</i>	<i>0,30</i>	<i>0,69</i>
TOTALE	Centro	38	11	0,18(▲)	0,32(▲)	0,00(▲)	0,89	1,41
	Nord occidentale	55	12	0,29(▲)	0,37(▲)	0,13(▲)	1,09	1,61
	Nord orientale	47	14	0,23(▲)	0,32(▲)	0,07(▲)	0,92	1,33
	Sud-Isole(■)	61	9	0,13(▲)	0,28(▲)	0,00(▲)	0,71	1,33
	<i>TOTALE(■)</i>	<i>201</i>	<i>11</i>	<i>0,21(▲)</i>	<i>0,33(▲)</i>	<i>0,01(▲)</i>	<i>0,83(▲)</i>	<i>1,41</i>

(\*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(\*) Deviazione Standard

(■) La numerosità può non coincidere con quella riportata nelle tabelle della parte B2, in quanto il dato del peso risulta mancante per una femmina adulta del "Sud-Isole"

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

**Tabella 1.A.1.8(b)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del sottogruppo alimentare "VINO DOLCE, SPUMANTE, APERITIVI E LIQUORI" per classi di età e area geografica: MASCHI dei sol consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% <sup>(*)</sup>	Media	DS <sup>(*)</sup>	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	1	17	0,00	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>0,00</i>	--	--	--	--
Bambini (3-9 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	2	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	3	9	0,01	0,01	0,00	0,03	0,03
	Nord orientale	2	11	0,48	0,67	0,48	0,95	0,95
	Sud-Isole	5	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE</i>	<i>10</i>	<i>9</i>	<i>0,10</i>	<i>0,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,95</i>	<i>0,95</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	29	16	0,17	0,21	0,13	0,59	0,70
	Nord occidentale	54	20	0,40 <sup>(▲)</sup>	0,49 <sup>(▲)</sup>	0,21 <sup>(▲)</sup>	1,36	2,48
	Nord orientale	58	27	0,33 <sup>(▲)</sup>	0,49 <sup>(▲)</sup>	0,16 <sup>(▲)</sup>	1,60	2,56
	Sud-Isole	56	14	0,29 <sup>(▲)</sup>	0,42 <sup>(▲)</sup>	0,16 <sup>(▲)</sup>	1,43	2,12
	<i>TOTALE</i>	<i>197</i>	<i>18</i>	<i>0,31<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,44<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,17<sup>(▲)</sup></i>	<i>1,33<sup>(▲)</sup></i>	<i>2,48</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	5	13	0,31	0,27	0,22	0,73	0,73
	Nord occidentale	5	10	0,15	0,19	0,10	0,45	0,45
	Nord orientale	7	16	0,11	0,22	0,00	0,58	0,58
	Sud-Isole	9	13	0,10	0,14	0,01	0,41	0,41
	<i>TOTALE</i>	<i>26</i>	<i>13</i>	<i>0,15</i>	<i>0,20</i>	<i>0,05</i>	<i>0,58</i>	<i>0,73</i>
TOTALE	Centro	35	13	0,18 <sup>(▲)</sup>	0,22 <sup>(▲)</sup>	0,14 <sup>(▲)</sup>	0,70	0,73
	Nord occidentale	64	17	0,35 <sup>(▲)</sup>	0,47 <sup>(▲)</sup>	0,19 <sup>(▲)</sup>	1,33	2,48
	Nord orientale	67	23	0,31 <sup>(▲)</sup>	0,47 <sup>(▲)</sup>	0,15 <sup>(▲)</sup>	1,29	2,56
	Sud-Isole	70	13	0,24 <sup>(▲)</sup>	0,39 <sup>(▲)</sup>	0,14 <sup>(▲)</sup>	1,03	2,12
	<i>TOTALE</i>	<i>236</i>	<i>16</i>	<i>0,28<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,42<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,16<sup>(▲)</sup></i>	<i>1,20<sup>(▲)</sup></i>	<i>2,12</i>

(\*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: n ≥ 30 per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); n ≥ 160 per P95 e n ≥ 800 per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.



I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

**Tabella 1.A.1.8(c)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del sottogruppo alimentare "VINO DOLCE, SPUMANTE, APERITIVI E LIQUORI" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI dei soli consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% <sup>(*)</sup>	Media	DS <sup>(*)</sup>	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	1	9	0,00	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>0,00</i>	--	--	--	--
Bambini (3-9 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	4	8	0,01	0,02	0,01	0,04	0,04
	Nord orientale	1	3	0,00	--	--	--	--
	Sud-Isole	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE</i>	<i>7</i>	<i>4</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,04</i>	<i>0,04</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	4	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord occidentale	8	13	0,10	0,23	0,01	0,67	0,67
	Nord orientale	3	7	0,36	0,52	0,12	0,95	0,95
	Sud-Isole	12	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE</i>	<i>27</i>	<i>11</i>	<i>0,07</i>	<i>0,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,67</i>	<i>0,95</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	59	14	0,19 <sup>(▲)</sup>	0,28 <sup>(▲)</sup>	0,01 <sup>(▲)</sup>	0,70	1,41
	Nord occidentale	96	16	0,38 <sup>(▲)</sup>	0,45 <sup>(▲)</sup>	0,21 <sup>(▲)</sup>	1,36	2,48
	Nord orientale	97	22	0,31 <sup>(▲)</sup>	0,43 <sup>(▲)</sup>	0,15 <sup>(▲)</sup>	1,29	2,56
	Sud-Isole <sup>(#)</sup>	101	12	0,23 <sup>(▲)</sup>	0,38 <sup>(▲)</sup>	0,07 <sup>(▲)</sup>	1,03	1,50
	<i>TOTALE<sup>(#)</sup></i>	<i>353</i>	<i>15</i>	<i>0,28<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,41<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,15<sup>(▲)</sup></i>	<i>1,20<sup>(▲)</sup></i>	<i>1,78</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	9	9	0,25	0,29	0,21	0,73	0,73
	Nord occidentale	11	7	0,13	0,14	0,09	0,45	0,45
	Nord orientale	13	12	0,08	0,17	0,00	0,58	0,58
	Sud-Isole	16	10	0,08	0,12	0,00	0,41	0,41
	<i>TOTALE</i>	<i>49</i>	<i>9</i>	<i>0,12<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,18<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,01<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,58</i>	<i>0,73</i>
TOTALE	Centro	73	12	0,18 <sup>(▲)</sup>	0,27 <sup>(▲)</sup>	0,00 <sup>(▲)</sup>	0,70	1,41
	Nord occidentale	119	14	0,32 <sup>(▲)</sup>	0,43 <sup>(▲)</sup>	0,18 <sup>(▲)</sup>	1,33	1,74
	Nord orientale	114	18	0,28 <sup>(▲)</sup>	0,42 <sup>(▲)</sup>	0,13 <sup>(▲)</sup>	1,15	1,78
	Sud-Isole <sup>(#)</sup>	131	11	0,19 <sup>(▲)</sup>	0,35 <sup>(▲)</sup>	0,01 <sup>(▲)</sup>	0,83	1,50
	<i>TOTALE<sup>(#)</sup></i>	<i>437</i>	<i>13</i>	<i>0,25<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,38<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,09<sup>(▲)</sup></i>	<i>1,03<sup>(▲)</sup></i>	<i>1,74</i>

(\*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(\*) Deviazione Standard

(#) La numerosità può non coincidere con quella riportata nelle tabelle della parte B2, in quanto il dato del peso risulta mancante per una femmina adulta del "Sud-Isole"

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: n ≥ 30 per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); n ≥ 160 per P95 e n ≥ 800 per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

