

# APPENDICE

## 12.B3

### *PASTI SOSTITUTIVI* *(g/ die)*

### PASTI SOSTITUTIVI

**Tabella 1,A,n,1(a)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del gruppo alimentare "PASTI SOSTITUTIVI" per classi di età e area geografica: FEMMINE del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS <sup>(*)</sup>	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	5	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	5	0	0	0	0	0
	Nord orientale	4	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	9	0	0	0	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	14	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	23	0	0	0	0	0
	Nord orientale	17	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	45	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>99</i>	<i>0<sup>(▲)</sup></i>	<i>0<sup>(▲)</sup></i>	<i>0<sup>(▲)</sup></i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	25	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	29	0	0	0	0	0
	Nord orientale	25	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	60	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>139</i>	<i>0<sup>(▲)</sup></i>	<i>0<sup>(▲)</sup></i>	<i>0<sup>(▲)</sup></i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	248	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0
	Nord occidentale	320	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0
	Nord orientale	237	0,1 <sup>(▲)</sup>	1,7 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0
	Sud-Isole	440	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0
	<i>TOTALE</i>	<i>1245</i>	<i>0,0<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,7<sup>(▲)</sup></i>	<i>0<sup>(▲)</sup></i>	<i>0<sup>(▲)</sup></i>	<i>0<sup>(▲)</sup></i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	64	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0	0
	Nord occidentale	96	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0	0
	Nord orientale	65	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0	0
	Sud-Isole	91	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>316</i>	<i>0<sup>(▲)</sup></i>	<i>0<sup>(▲)</sup></i>	<i>0<sup>(▲)</sup></i>	<i>0<sup>(▲)</sup></i>	<i>0</i>
TOTALE	Centro	356	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0
	Nord occidentale	473	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0
	Nord orientale	348	0,1 <sup>(▲)</sup>	1,4 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0
	Sud-Isole	645	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	0
	<i>TOTALE</i>	<i>1822</i>	<i>0,0<sup>(▲)</sup></i>	<i>0,6<sup>(▲)</sup></i>	<i>0<sup>(▲)</sup></i>	<i>0<sup>(▲)</sup></i>	<i>0<sup>(▲)</sup></i>

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: n ≥ 30 per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); n ≥ 160 per P95 e n ≥ 800 per P99 (Kroes et al, 2002), Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1,A,n,1(b)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del gruppo alimentare "PASTI SOSTITUTIVI" per classi di età e area geografica: MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS <sup>(*)</sup>	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	6	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	5	0	0	0	0	0
	Nord orientale	6	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	12	0	0	0	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	15	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	25	0	0	0	0	0
	Nord orientale	12	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	42	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>94</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	20	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	32	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	0
	Nord orientale	19	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	37	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>108</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	187	0,2(▲)	2,5(▲)	0(▲)	0(▲)	13,5
	Nord occidentale	271	0,2(▲)	3,0(▲)	0(▲)	0(▲)	0
	Nord orientale	213	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0
	Sud-Isole	397	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0
	<i>TOTALE</i>	<i>1068</i>	<i>0,1(▲)</i>	<i>1,8(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	39	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	0
	Nord occidentale	51	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	0
	Nord orientale	44	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	0
	Sud-Isole	68	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>202</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0</i>
TOTALE	Centro	267	0,2(▲)	2,1(▲)	0(▲)	0(▲)	0
	Nord occidentale	384	0,1(▲)	2,6(▲)	0(▲)	0(▲)	0
	Nord orientale	294	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0
	Sud-Isole	556	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0
	<i>TOTALE</i>	<i>1501</i>	<i>0,1(▲)</i>	<i>1,6(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al, 2002), Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1,A,n,1(c)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del gruppo alimentare "PASTI SOSTITUTIVI" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	11	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	10	0	0	0	0	0
	Nord orientale	10	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	21	0	0	0	0	0
	<i>TOTALE</i>	52	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	0
Bambini (3-9 anni)	Centro	29	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	48	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	0
	Nord orientale	29	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	87	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	0
	<i>TOTALE</i>	193	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	45	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	0
	Nord occidentale	61	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	0
	Nord orientale	44	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	0
	Sud-Isole	97	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	0
	<i>TOTALE</i>	247	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0
Adulti (18-64 anni)	Centro	435	0,1(▲)	1,6(▲)	0(▲)	0(▲)	0
	Nord occidentale	591	0,1(▲)	2,1(▲)	0(▲)	0(▲)	0
	Nord orientale	450	0,1(▲)	1,2(▲)	0(▲)	0(▲)	0
	Sud-Isole	837	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0(▲)
	<i>TOTALE</i>	2313	0,1(▲)	1,4(▲)	0(▲)	0(▲)	0(▲)
Anziani (65-97 anni)	Centro	103	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	0
	Nord occidentale	147	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	0
	Nord orientale	109	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	0
	Sud-Isole	159	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	0
	<i>TOTALE</i>	518	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0
TOTALE	Centro	623	0,1(▲)	1,4(▲)	0(▲)	0(▲)	0
	Nord occidentale	857	0,1(▲)	1,7(▲)	0(▲)	0(▲)	0(▲)
	Nord orientale	642	0,0(▲)	1,0(▲)	0(▲)	0(▲)	0
	Sud-Isole	1201	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0(▲)
	<i>TOTALE</i>	3323	0,0(▲)	1,1(▲)	0(▲)	0(▲)	0(▲)

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al, 2002), Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1,A,n,2(a)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del gruppo alimentare "PASTI SOSTITUTIVI" per classi di età e area geografica: FEMMINE dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% <sup>(*)</sup>	Media	DS <sup>(*)</sup>	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--
Bambini (3-9 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--
Adulti (18-64 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	1	0,4	26	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>1</i>	<i>0,1</i>	<i>26</i>	--	--	--	--
Anziani (65-97 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--
TOTALE	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	1	0,3	26	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>1</i>	<i>0,1</i>	<i>26</i>	--	--	--	--

(\*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(\*) Deviazione Standard

**Tabella 1,A,n,2(b)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del gruppo alimentare "PASTI SOSTITUTIVI" per classi di età e area geografica: MASCHI dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% <sup>(*)</sup>	Media	DS <sup>(*)</sup>	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--
Bambini (3-9 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--
Adulti (18-64 anni)	Centro	2	1,1	22	12	22	31	31
	Nord occidentale	1	0,4	50	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>3</i>	<i>0,3</i>	<i>32</i>	<i>18</i>	<i>31</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--
TOTALE	Centro	2	0,7	22	12	22	31	31
	Nord occidentale	1	0,2	50	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>3</i>	<i>0,3</i>	<i>32</i>	<i>18</i>	<i>31</i>	<i>50</i>	<i>50</i>

(\*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(\*) Deviazione Standard

**Tabella 1,A,n,2(c)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del gruppo alimentare "PASTI SOSTITUTIVI" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI dei sol consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% <sup>(*)</sup>	Media	DS <sup>(*)</sup>	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--
Bambini (3-9 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--
Adulti (18-64 anni)	Centro	2	0,5	22	12	22	31	31
	Nord occidentale	1	0,2	50	--	--	--	--
	Nord orientale	1	0,2	26	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>4</i>	<i>0,2</i>	<i>30</i>	<i>15</i>	<i>29</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--
TOTALE	Centro	2	0,3	22	12	22	31	31
	Nord occidentale	1	0,1	50	--	--	--	--
	Nord orientale	1	0,2	26	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>4</i>	<i>0,1</i>	<i>30</i>	<i>15</i>	<i>29</i>	<i>50</i>	<i>50</i>

(\*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al, 2002), Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

