

APPENDICE

14.B4

ACQUA ED ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE (g/kg peso corporeo/die)

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

ACQUA ED ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE**Tabella 1.A.p.1(a)** - *Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del gruppo alimentare "ACQUA ED ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE" per classi di età e area geografica: FEMMINE del campione totale*

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	5	33,97	13,92	29,87	57,44	57,44
	Nord occidentale	5	39,33	47,77	22,18	119,69	119,69
	Nord orientale	4	60,58	20,21	62,18	83,56	83,56
	Sud-Isole	9	29,53	26,21	31,70	83,89	83,89
	<i>TOTALE</i>	23	38,02	29,70	34,41	83,89	119,69
Bambini (3-9 anni)	Centro	14	30,45	23,53	22,13	98,56	98,56
	Nord occidentale	23	30,00	15,78	23,41	50,76	69,09
	Nord orientale	17	27,98	15,71	26,21	68,68	68,68
	Sud-Isole	45	23,71(▲)	11,27(▲)	21,76(▲)	45,64	65,31
	<i>TOTALE</i>	99	26,86(▲)	15,35(▲)	22,29(▲)	65,31	98,56
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	25	17,63	6,90	16,32	29,33	39,86
	Nord occidentale	29	17,11	7,79	15,38	28,40	43,30
	Nord orientale	25	19,32	7,40	19,96	30,87	36,25
	Sud-Isole	60	14,50(▲)	7,67(▲)	13,46(▲)	30,06	41,90
	<i>TOTALE</i>	139	16,47(▲)	7,66(▲)	15,31(▲)	30,87	41,90
Adulti (18-64 anni)	Centro	248	15,92(▲)	7,32(▲)	15,21(▲)	30,25(▲)	36,27
	Nord occidentale	320	17,04(▲)	8,83(▲)	15,58(▲)	34,15(▲)	41,99
	Nord orientale	237	16,12(▲)	7,38(▲)	14,72(▲)	31,05(▲)	35,06
	Sud-Isole(■)	439	11,30(▲)	5,55(▲)	10,62(▲)	20,54(▲)	32,56
	<i>TOTALE(■)</i>	1244	14,61(▲)	7,62(▲)	13,09(▲)	29,85(▲)	38,04(▲)
Anziani (65-97 anni)	Centro	64	12,97(▲)	5,08(▲)	12,00(▲)	21,78	26,77
	Nord occidentale	96	12,70(▲)	5,76(▲)	11,87(▲)	23,86	32,81
	Nord orientale	65	15,28(▲)	4,92(▲)	14,57(▲)	25,44	28,30
	Sud-Isole	91	10,46(▲)	4,57(▲)	10,04(▲)	18,03	28,87
	<i>TOTALE</i>	316	12,64(▲)	5,37(▲)	11,91(▲)	23,30(▲)	27,01
TOTALE	Centro	356	16,33(▲)	9,06(▲)	15,21(▲)	30,58(▲)	50,39
	Nord occidentale	473	17,03(▲)	10,54(▲)	15,14(▲)	35,56(▲)	48,69
	Nord orientale	348	17,28(▲)	9,46(▲)	14,98(▲)	32,12(▲)	60,26
	Sud-Isole(■)	644	12,60(▲)	7,83(▲)	11,00(▲)	26,29(▲)	41,90
	<i>TOTALE(■)</i>	1821	15,37(▲)	9,37(▲)	13,56(▲)	31,38(▲)	46,92(▲)

(*) Deviazione Standard

(■) La numerosità può non coincidere con quella riportata nelle tabelle della parte B2, in quanto il dato del peso risulta mancante per una femmina adulta del "Sud-Isole"

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

Tabella 1.A.p.1(b) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del gruppo alimentare "ACQUA ED ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE" per classi di età e area geografica: MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	6	28,23	20,77	26,42	58,26	58,26
	Nord occidentale	5	41,52	9,96	38,32	58,31	58,31
	Nord orientale	6	42,95	23,06	34,18	83,08	83,08
	Sud-Isole	12	62,74	72,80	43,51	284,44	284,44
	<i>TOTALE</i>	<i>29</i>	<i>47,85</i>	<i>49,58</i>	<i>38,32</i>	<i>87,01</i>	<i>284,44</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	15	27,28	10,39	24,55	59,17	59,17
	Nord occidentale	25	29,81	14,95	27,03	57,75	61,48
	Nord orientale	12	31,84	12,48	30,65	60,10	60,10
	Sud-Isole	42	23,55(▲)	8,89(▲)	21,71(▲)	40,10	41,22
	<i>TOTALE</i>	<i>94</i>	<i>26,87(▲)</i>	<i>11,74(▲)</i>	<i>25,32(▲)</i>	<i>55,94</i>	<i>61,48</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	20	15,24	5,68	15,12	25,30	26,97
	Nord occidentale	32	21,71(▲)	11,41(▲)	19,70(▲)	44,31	49,04
	Nord orientale	19	20,54	7,42	22,05	36,11	36,11
	Sud-Isole	37	14,64(▲)	8,11(▲)	13,28(▲)	33,24	36,75
	<i>TOTALE</i>	<i>108</i>	<i>17,89(▲)</i>	<i>9,24(▲)</i>	<i>15,98(▲)</i>	<i>36,75</i>	<i>44,31</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	187	10,94(▲)	5,19(▲)	10,57(▲)	19,79(▲)	27,66
	Nord occidentale	271	13,19(▲)	6,98(▲)	12,37(▲)	25,79(▲)	33,95
	Nord orientale	213	12,70(▲)	6,95(▲)	11,41(▲)	26,11(▲)	33,04
	Sud-Isole	397	8,66(▲)	4,70(▲)	7,93(▲)	17,45(▲)	25,95
	<i>TOTALE</i>	<i>1068</i>	<i>11,01(▲)</i>	<i>6,22(▲)</i>	<i>9,96(▲)</i>	<i>22,52(▲)</i>	<i>30,89(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	39	8,75(▲)	4,62(▲)	7,86(▲)	22,68	24,33
	Nord occidentale	51	11,16(▲)	6,57(▲)	10,00(▲)	25,02	33,78
	Nord orientale	44	11,84(▲)	4,34(▲)	12,09(▲)	19,44	20,23
	Sud-Isole	68	8,47(▲)	4,49(▲)	8,20(▲)	17,53	24,57
	<i>TOTALE</i>	<i>202</i>	<i>9,94(▲)</i>	<i>5,26(▲)</i>	<i>9,59(▲)</i>	<i>19,33(▲)</i>	<i>25,02</i>
TOTALE	Centro	267	12,25(▲)	7,76(▲)	10,65(▲)	26,97(▲)	42,90
	Nord occidentale	384	15,08(▲)	9,85(▲)	12,84(▲)	33,78(▲)	55,94
	Nord orientale	294	14,48(▲)	9,53(▲)	12,46(▲)	30,89(▲)	56,23
	Sud-Isole	556	11,33(▲)	14,44(▲)	8,77(▲)	29,00(▲)	47,36
	<i>TOTALE</i>	<i>1501</i>	<i>13,07(▲)</i>	<i>11,53(▲)</i>	<i>10,79(▲)</i>	<i>30,31(▲)</i>	<i>49,04(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

Tabella 1.A.p.1(c) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del gruppo alimentare "ACQUA ED ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	11	30,84	17,38	29,87	58,26	58,26
	Nord occidentale	10	40,42	32,55	36,67	119,69	119,69
	Nord orientale	10	50,00	22,69	48,28	83,56	83,56
	Sud-Isole	21	48,51	58,94	38,23	87,01	284,44
	TOTALE	52	43,50(▲)	41,88(▲)	34,74(▲)	87,01	284,44
Bambini (3-9 anni)	Centro	29	28,81	17,71	24,41	66,30	98,56
	Nord occidentale	48	29,90(▲)	15,19(▲)	26,54(▲)	57,75	69,09
	Nord orientale	29	29,58	14,35	27,24	60,10	68,68
	Sud-Isole	87	23,63(▲)	10,13(▲)	21,76(▲)	40,47	65,31
	TOTALE	193	26,86(▲)	13,67(▲)	24,41(▲)	57,75(▲)	69,09
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	45	16,57(▲)	6,43(▲)	15,31(▲)	27,88	39,86
	Nord occidentale	61	19,52(▲)	10,05(▲)	17,78(▲)	41,61	49,04
	Nord orientale	44	19,85(▲)	7,35(▲)	20,12(▲)	31,45	36,25
	Sud-Isole	97	14,55(▲)	7,80(▲)	13,33(▲)	32,39	41,90
	TOTALE	247	17,09(▲)	8,40(▲)	15,39(▲)	33,22(▲)	43,30
Adulti (18-64 anni)	Centro	435	13,77(▲)	6,94(▲)	12,38(▲)	27,64(▲)	35,79
	Nord occidentale	591	15,28(▲)	8,25(▲)	13,73(▲)	31,09(▲)	40,25
	Nord orientale	450	14,50(▲)	7,37(▲)	13,06(▲)	28,72(▲)	33,94
	Sud-Isole(♯)	836	10,04(▲)	5,33(▲)	9,08(▲)	19,37(▲)	27,34(▲)
	TOTALE(♯)	2312	12,95(▲)	7,23(▲)	11,63(▲)	27,34(▲)	36,15(▲)
Anziani (65-97 anni)	Centro	103	11,37(▲)	5,31(▲)	10,23(▲)	21,78	24,33
	Nord occidentale	147	12,17(▲)	6,07(▲)	11,19(▲)	23,97	32,81
	Nord orientale	109	13,89(▲)	4,97(▲)	13,27(▲)	24,43	25,97
	Sud-Isole	159	9,61(▲)	4,63(▲)	9,30(▲)	17,73	24,57
	TOTALE	518	11,59(▲)	5,49(▲)	10,88(▲)	22,22(▲)	27,01
TOTALE	Centro	623	14,58(▲)	8,76(▲)	12,76(▲)	29,26(▲)	42,90
	Nord occidentale	857	16,16(▲)	10,28(▲)	13,89(▲)	35,02(▲)	50,42(▲)
	Nord orientale	642	16,00(▲)	9,58(▲)	13,99(▲)	31,37(▲)	57,77
	Sud-Isole(♯)	1200	12,01(▲)	11,40(▲)	9,91(▲)	26,81(▲)	42,33(▲)
	TOTALE(♯)	3322	14,33(▲)	10,47(▲)	12,21(▲)	30,92(▲)	48,45(▲)

(*) Deviazione Standard

(♯) La numerosità può non coincidere con quella riportata nelle tabelle della parte B2, in quanto il dato del peso risulta mancante per una femmina adulta del "Sud-Isole"

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

Tabella 1.A.p.2(a) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del gruppo alimentare "ACQUA ED ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE" per classi di età e area geografica: FEMMINE dei soli consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% ^(*)	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	5	100	33,97	13,92	29,87	57,44	57,44
	Nord occidentale	4	80	49,16	48,97	33,02	119,69	119,69
	Nord orientale	4	100	60,58	20,21	62,18	83,56	83,56
	Sud-Isole	8	89	33,22	25,40	34,96	83,89	83,89
	<i>TOTALE</i>	<i>21</i>	<i>91</i>	<i>41,65</i>	<i>28,49</i>	<i>34,45</i>	<i>83,89</i>	<i>119,69</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	14	100	30,45	23,53	22,13	98,56	98,56
	Nord occidentale	23	100	30,00	15,78	23,41	50,76	69,09
	Nord orientale	17	100	27,98	15,71	26,21	68,68	68,68
	Sud-Isole	45	100	23,71 ^(▲)	11,27 ^(▲)	21,76 ^(▲)	45,64	65,31
	<i>TOTALE</i>	<i>99</i>	<i>100</i>	<i>26,86^(▲)</i>	<i>15,35^(▲)</i>	<i>22,29^(▲)</i>	<i>65,31</i>	<i>98,56</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	25	100	17,63	6,90	16,32	29,33	39,86
	Nord occidentale	29	100	17,11	7,79	15,38	28,40	43,30
	Nord orientale	25	100	19,32	7,40	19,96	30,87	36,25
	Sud-Isole	60	100	14,50 ^(▲)	7,67 ^(▲)	13,46 ^(▲)	30,06	41,90
	<i>TOTALE</i>	<i>139</i>	<i>100</i>	<i>16,47^(▲)</i>	<i>7,66^(▲)</i>	<i>15,31^(▲)</i>	<i>30,87</i>	<i>41,90</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	248	100	15,92 ^(▲)	7,32 ^(▲)	15,21 ^(▲)	30,25 ^(▲)	36,27
	Nord occidentale	320	100	17,04 ^(▲)	8,83 ^(▲)	15,58 ^(▲)	34,15 ^(▲)	41,99
	Nord orientale	237	100	16,12 ^(▲)	7,38 ^(▲)	14,72 ^(▲)	31,05 ^(▲)	35,06
	Sud-Isole ^(#)	439	100	11,30 ^(▲)	5,55 ^(▲)	10,62 ^(▲)	20,54 ^(▲)	32,56
	<i>TOTALE^(#)</i>	<i>1244</i>	<i>100</i>	<i>14,61^(▲)</i>	<i>7,62^(▲)</i>	<i>13,09^(▲)</i>	<i>29,85^(▲)</i>	<i>38,04^(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	64	100	12,97 ^(▲)	5,08 ^(▲)	12,00 ^(▲)	21,78	26,77
	Nord occidentale	96	100	12,70 ^(▲)	5,76 ^(▲)	11,87 ^(▲)	23,86	32,81
	Nord orientale	65	100	15,28 ^(▲)	4,92 ^(▲)	14,57 ^(▲)	25,44	28,30
	Sud-Isole	91	100	10,46 ^(▲)	4,57 ^(▲)	10,04 ^(▲)	18,03	28,87
	<i>TOTALE</i>	<i>316</i>	<i>100</i>	<i>12,64^(▲)</i>	<i>5,37^(▲)</i>	<i>11,91^(▲)</i>	<i>23,30^(▲)</i>	<i>27,01</i>
TOTALE	Centro	356	100	16,33 ^(▲)	9,06 ^(▲)	15,21 ^(▲)	30,58 ^(▲)	50,39
	Nord occidentale	472	100	17,07 ^(▲)	10,52 ^(▲)	15,18 ^(▲)	35,56 ^(▲)	48,69
	Nord orientale	348	100	17,28 ^(▲)	9,46 ^(▲)	14,98 ^(▲)	32,12 ^(▲)	60,26
	Sud-Isole ^(#)	643	100	12,62 ^(▲)	7,82 ^(▲)	11,00 ^(▲)	26,29 ^(▲)	41,90
	<i>TOTALE^(#)</i>	<i>1819</i>	<i>100</i>	<i>15,39^(▲)</i>	<i>9,36^(▲)</i>	<i>13,58^(▲)</i>	<i>31,61^(▲)</i>	<i>46,92^(▲)</i>

(*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(*) Deviazione Standard

(#) La numerosità può non coincidere con quella riportata nelle tabelle della parte B2, in quanto il dato del peso risulta mancante per una femmina adulta del "Sud-Isole"

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

Tabella 1.A.p.2(b) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del gruppo alimentare "ACQUA ED ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE" per classi di età e area geografica: MASCHI dei sol consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	%(*)	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	5	83	33,88	17,32	32,38	58,26	58,26
	Nord occidentale	5	100	41,52	9,96	38,32	58,31	58,31
	Nord orientale	6	100	42,95	23,06	34,18	83,08	83,08
	Sud-Isole	12	100	62,74	72,80	43,51	284,44	284,44
	<i>TOTALE</i>	<i>28</i>	<i>97</i>	<i>49,55</i>	<i>49,61</i>	<i>38,99</i>	<i>87,01</i>	<i>284,44</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	15	100	27,28	10,39	24,55	59,17	59,17
	Nord occidentale	25	100	29,81	14,95	27,03	57,75	61,48
	Nord orientale	12	100	31,84	12,48	30,65	60,10	60,10
	Sud-Isole	42	100	23,55(▲)	8,89(▲)	21,71(▲)	40,10	41,22
	<i>TOTALE</i>	<i>94</i>	<i>100</i>	<i>26,87(▲)</i>	<i>11,74(▲)</i>	<i>25,32(▲)</i>	<i>55,94</i>	<i>61,48</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	20	100	15,24	5,68	15,12	25,30	26,97
	Nord occidentale	32	100	21,71(▲)	11,41(▲)	19,70(▲)	44,31	49,04
	Nord orientale	19	100	20,54	7,42	22,05	36,11	36,11
	Sud-Isole	37	100	14,64(▲)	8,11(▲)	13,28(▲)	33,24	36,75
	<i>TOTALE</i>	<i>108</i>	<i>100</i>	<i>17,89(▲)</i>	<i>9,24(▲)</i>	<i>15,98(▲)</i>	<i>36,75</i>	<i>44,31</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	187	100	10,94(▲)	5,19(▲)	10,57(▲)	19,79(▲)	27,66
	Nord occidentale	271	100	13,19(▲)	6,98(▲)	12,37(▲)	25,79(▲)	33,95
	Nord orientale	213	100	12,70(▲)	6,95(▲)	11,41(▲)	26,11(▲)	33,04
	Sud-Isole	397	100	8,66(▲)	4,70(▲)	7,93(▲)	17,45(▲)	25,95
	<i>TOTALE</i>	<i>1068</i>	<i>100</i>	<i>11,01(▲)</i>	<i>6,22(▲)</i>	<i>9,96(▲)</i>	<i>22,52(▲)</i>	<i>30,89(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	39	100	8,75(▲)	4,62(▲)	7,86(▲)	22,68	24,33
	Nord occidentale	51	100	11,16(▲)	6,57(▲)	10,00(▲)	25,02	33,78
	Nord orientale	44	100	11,84(▲)	4,34(▲)	12,09(▲)	19,44	20,23
	Sud-Isole	68	100	8,47(▲)	4,49(▲)	8,20(▲)	17,53	24,57
	<i>TOTALE</i>	<i>202</i>	<i>100</i>	<i>9,94(▲)</i>	<i>5,26(▲)</i>	<i>9,59(▲)</i>	<i>19,33(▲)</i>	<i>25,02</i>
TOTALE	Centro	266	100	12,29(▲)	7,74(▲)	10,68(▲)	26,97(▲)	42,90
	Nord occidentale	384	100	15,08(▲)	9,85(▲)	12,84(▲)	33,78(▲)	55,94
	Nord orientale	294	100	14,48(▲)	9,53(▲)	12,46(▲)	30,89(▲)	56,23
	Sud-Isole	556	100	11,33(▲)	14,44(▲)	8,77(▲)	29,00(▲)	47,36
	<i>TOTALE</i>	<i>1500</i>	<i>100</i>	<i>13,08(▲)</i>	<i>11,53(▲)</i>	<i>10,80(▲)</i>	<i>30,33(▲)</i>	<i>50,26(▲)</i>

(*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: n ≥ 30 per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); n ≥ 160 per P95 e n ≥ 800 per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

Tabella 1.A.p.2(c) - *Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del gruppo alimentare "ACQUA ED ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI dei soli consumatori*

Classi di età (anni)	Area geografica	n	%(*)	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	10	91	33,92	14,81	31,12	58,26	58,26
	Nord occidentale	9	90	44,91	31,06	38,32	119,69	119,69
	Nord orientale	10	100	50,00	22,69	48,28	83,56	83,56
	Sud-Isole	20	95	50,93	59,39	38,95	185,73	284,44
	<i>TOTALE</i>	<i>49</i>	<i>94</i>	<i>46,17(▲)</i>	<i>41,69(▲)</i>	<i>38,23(▲)</i>	<i>87,01</i>	<i>284,44</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	29	100	28,81	17,71	24,41	66,30	98,56
	Nord occidentale	48	100	29,90(▲)	15,19(▲)	26,54(▲)	57,75	69,09
	Nord orientale	29	100	29,58	14,35	27,24	60,10	68,68
	Sud-Isole	87	100	23,63(▲)	10,13(▲)	21,76(▲)	40,47	65,31
	<i>TOTALE</i>	<i>193</i>	<i>100</i>	<i>26,86(▲)</i>	<i>13,67(▲)</i>	<i>24,41(▲)</i>	<i>57,75(▲)</i>	<i>69,09</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	45	100	16,57(▲)	6,43(▲)	15,31(▲)	27,88	39,86
	Nord occidentale	61	100	19,52(▲)	10,05(▲)	17,78(▲)	41,61	49,04
	Nord orientale	44	100	19,85(▲)	7,35(▲)	20,12(▲)	31,45	36,25
	Sud-Isole	97	100	14,55(▲)	7,80(▲)	13,33(▲)	32,39	41,90
	<i>TOTALE</i>	<i>247</i>	<i>100</i>	<i>17,09(▲)</i>	<i>8,40(▲)</i>	<i>15,39(▲)</i>	<i>33,22(▲)</i>	<i>43,30</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	435	100	13,77(▲)	6,94(▲)	12,38(▲)	27,64(▲)	35,79
	Nord occidentale	591	100	15,28(▲)	8,25(▲)	13,73(▲)	31,09(▲)	40,25
	Nord orientale	450	100	14,50(▲)	7,37(▲)	13,06(▲)	28,72(▲)	33,94
	Sud-Isole(##)	836	100	10,04(▲)	5,33(▲)	9,08(▲)	19,37(▲)	27,34(▲)
	<i>TOTALE(##)</i>	<i>2312</i>	<i>100</i>	<i>12,95(▲)</i>	<i>7,23(▲)</i>	<i>11,63(▲)</i>	<i>27,34(▲)</i>	<i>36,15(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	103	100	11,37(▲)	5,31(▲)	10,23(▲)	21,78	24,33
	Nord occidentale	147	100	12,17(▲)	6,07(▲)	11,19(▲)	23,97	32,81
	Nord orientale	109	100	13,89(▲)	4,97(▲)	13,27(▲)	24,43	25,97
	Sud-Isole	159	100	9,61(▲)	4,63(▲)	9,30(▲)	17,73	24,57
	<i>TOTALE</i>	<i>518</i>	<i>100</i>	<i>11,59(▲)</i>	<i>5,49(▲)</i>	<i>10,88(▲)</i>	<i>22,22(▲)</i>	<i>27,01</i>
TOTALE	Centro	622	100	14,60(▲)	8,74(▲)	12,78(▲)	29,26(▲)	42,90
	Nord occidentale	856	100	16,18(▲)	10,27(▲)	13,90(▲)	35,02(▲)	50,42(▲)
	Nord orientale	642	100	16,00(▲)	9,58(▲)	13,99(▲)	31,37(▲)	57,77
	Sud-Isole(##)	1199	100	12,02(▲)	11,40(▲)	9,92(▲)	26,82(▲)	42,76(▲)
	<i>TOTALE(##)</i>	<i>3319</i>	<i>100</i>	<i>14,35(▲)</i>	<i>10,46(▲)</i>	<i>12,21(▲)</i>	<i>31,04(▲)</i>	<i>48,45(▲)</i>

(*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(*) Deviazione Standard

##) La numerosità può non coincidere con quella riportata nelle tabelle della parte B2, in quanto il dato del peso risulta mancante per una femmina adulta del "Sud-Isole"

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

Tabella 1.A.p.3(a) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del sottogruppo alimentare "ACQUA" per classi di età e area geografica: FEMMINE del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	5	8,66	10,72	8,49	26,26	26,26
	Nord occidentale	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord orientale	4	8,65	6,07	10,21	14,19	14,19
	Sud-Isole	9	8,80	12,18	0,00	31,70	31,70
	<i>TOTALE</i>	<i>23</i>	<i>6,83</i>	<i>9,66</i>	<i>0,00</i>	<i>26,26</i>	<i>31,70</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	14	9,06	8,58	5,88	23,05	23,05
	Nord occidentale	23	10,11	14,66	4,80	41,86	53,33
	Nord orientale	17	5,51	9,84	0,27	36,41	36,41
	Sud-Isole	45	9,11 ^(▲)	8,72 ^(▲)	5,94 ^(▲)	22,83	33,17
	<i>TOTALE</i>	<i>99</i>	<i>8,72^(▲)</i>	<i>10,50^(▲)</i>	<i>4,80^(▲)</i>	<i>33,17</i>	<i>53,33</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	25	5,69	8,66	1,69	18,00	37,78
	Nord occidentale	29	5,28	8,94	0,00	24,00	40,30
	Nord orientale	25	3,76	5,82	0,00	16,53	19,30
	Sud-Isole	60	3,83 ^(▲)	5,47 ^(▲)	1,31 ^(▲)	15,32	23,84
	<i>TOTALE</i>	<i>139</i>	<i>4,46^(▲)</i>	<i>6,97^(▲)</i>	<i>1,19^(▲)</i>	<i>19,15</i>	<i>37,78</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	248	3,04 ^(▲)	5,62 ^(▲)	0,00 ^(▲)	16,76 ^(▲)	22,40
	Nord occidentale	320	3,33 ^(▲)	5,64 ^(▲)	0,83 ^(▲)	16,89 ^(▲)	26,67
	Nord orientale	237	3,04 ^(▲)	5,63 ^(▲)	0,00 ^(▲)	15,67 ^(▲)	22,99
	Sud-Isole ^(#)	439	3,25 ^(▲)	4,32 ^(▲)	1,21 ^(▲)	11,62 ^(▲)	17,51
	<i>TOTALE^(#)</i>	<i>1244</i>	<i>3,19^(▲)</i>	<i>5,20^(▲)</i>	<i>0,70^(▲)</i>	<i>14,81^(▲)</i>	<i>22,99^(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	64	4,38 ^(▲)	6,05 ^(▲)	1,45 ^(▲)	17,36	25,81
	Nord occidentale	96	4,23 ^(▲)	5,33 ^(▲)	2,24 ^(▲)	16,09	28,80
	Nord orientale	65	4,28 ^(▲)	4,62 ^(▲)	2,61 ^(▲)	12,41	22,46
	Sud-Isole	91	3,96 ^(▲)	5,01 ^(▲)	1,98 ^(▲)	12,38	27,90
	<i>TOTALE</i>	<i>316</i>	<i>4,19^(▲)</i>	<i>5,23^(▲)</i>	<i>2,23^(▲)</i>	<i>14,87^(▲)</i>	<i>23,42</i>
TOTALE	Centro	356	3,78 ^(▲)	6,30 ^(▲)	0,54 ^(▲)	18,11 ^(▲)	26,26
	Nord occidentale	473	3,93 ^(▲)	6,66 ^(▲)	1,26 ^(▲)	16,94 ^(▲)	29,22
	Nord orientale	348	3,51 ^(▲)	5,78 ^(▲)	0,89 ^(▲)	15,67 ^(▲)	22,99
	Sud-Isole ^(#)	644	3,89 ^(▲)	5,35 ^(▲)	1,43 ^(▲)	14,71 ^(▲)	25,00
	<i>TOTALE^(#)</i>	<i>1821</i>	<i>3,81^(▲)</i>	<i>5,98^(▲)</i>	<i>1,20^(▲)</i>	<i>16,76^(▲)</i>	<i>26,67^(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

(#) La numerosità può non coincidere con quella riportata nelle tabelle della parte B2, in quanto il dato del peso risulta mancante per una femmina adulta del "Sud-Isole"

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

Tabella 1.A.p.3(b) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del sottogruppo alimentare "ACQUA" per classi di età e area geografica: MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	6	11,84	15,70	6,23	42,90	42,90
	Nord occidentale	5	0,71	1,59	0,00	3,56	3,56
	Nord orientale	6	8,09	8,12	5,44	22,10	22,10
	Sud-Isole	12	13,63	16,22	9,38	47,56	47,56
	<i>TOTALE</i>	29	9,89	13,49	5,18	42,90	47,56
Bambini (3-9 anni)	Centro	15	4,89	5,89	2,90	17,33	17,33
	Nord occidentale	25	4,54	7,64	0,12	15,99	34,44
	Nord orientale	12	6,23	8,35	2,30	24,69	24,69
	Sud-Isole	42	8,46(▲)	9,34(▲)	5,19(▲)	28,44	34,38
	<i>TOTALE</i>	94	6,56(▲)	8,38(▲)	2,85(▲)	24,69	34,44
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	20	4,90	5,18	3,75	14,60	14,62
	Nord occidentale	32	4,85(▲)	6,32(▲)	1,35(▲)	18,95	19,17
	Nord orientale	19	2,86	5,55	0,03	22,86	22,86
	Sud-Isole	37	4,62(▲)	6,22(▲)	2,10(▲)	16,28	30,66
	<i>TOTALE</i>	108	4,43(▲)	5,92(▲)	1,62(▲)	15,05	22,86
Adulti (18-64 anni)	Centro	187	2,04(▲)	3,68(▲)	0,03(▲)	9,81(▲)	17,37
	Nord occidentale	271	2,70(▲)	4,55(▲)	0,47(▲)	11,18(▲)	22,54
	Nord orientale	213	1,82(▲)	3,86(▲)	0,00(▲)	10,24(▲)	16,47
	Sud-Isole	397	2,47(▲)	3,71(▲)	0,70(▲)	9,54(▲)	17,73
	<i>TOTALE</i>	1068	2,32(▲)	3,97(▲)	0,15(▲)	10,29(▲)	18,63(▲)
Anziani (65-97 anni)	Centro	39	2,27(▲)	4,44(▲)	0,00(▲)	16,90	18,20
	Nord occidentale	51	4,06(▲)	6,45(▲)	1,36(▲)	23,97	29,33
	Nord orientale	44	2,60(▲)	3,71(▲)	1,26(▲)	10,51	17,08
	Sud-Isole	68	3,00(▲)	4,56(▲)	1,19(▲)	10,67	24,52
	<i>TOTALE</i>	202	3,04(▲)	4,93(▲)	1,06(▲)	12,13(▲)	24,00
TOTALE	Centro	267	2,67(▲)	4,85(▲)	0,31(▲)	12,87(▲)	18,20
	Nord occidentale	384	3,15(▲)	5,26(▲)	0,73(▲)	14,12(▲)	24,00
	Nord orientale	294	2,31(▲)	4,47(▲)	0,05(▲)	13,10(▲)	22,86
	Sud-Isole	556	3,37(▲)	5,61(▲)	1,11(▲)	14,35(▲)	28,44
	<i>TOTALE</i>	1501	2,98(▲)	5,19(▲)	0,65(▲)	13,71(▲)	23,29(▲)

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

Tabella 1.A.p.3(c) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del sottogruppo alimentare "ACQUA" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	11	10,39	13,11	6,31	42,90	42,90
	Nord occidentale	10	0,36	1,13	0,00	3,56	3,56
	Nord orientale	10	8,31	7,00	7,81	22,10	22,10
	Sud-Isole	21	11,56	14,49	9,25	41,91	47,56
	<i>TOTALE</i>	<i>52</i>	<i>8,53(▲)</i>	<i>11,94(▲)</i>	<i>3,72(▲)</i>	<i>41,91</i>	<i>47,56</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	29	6,90	7,49	3,00	20,87	23,05
	Nord occidentale	48	7,21(▲)	11,76(▲)	3,01(▲)	38,01	53,33
	Nord orientale	29	5,81	9,10	2,25	24,69	36,41
	Sud-Isole	87	8,80(▲)	8,98(▲)	5,38(▲)	27,83	34,38
	<i>TOTALE</i>	<i>193</i>	<i>7,67(▲)</i>	<i>9,56(▲)</i>	<i>3,91(▲)</i>	<i>27,83(▲)</i>	<i>41,86</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	45	5,34(▲)	7,26(▲)	1,81(▲)	15,11	37,78
	Nord occidentale	61	5,06(▲)	7,61(▲)	0,14(▲)	18,95	40,30
	Nord orientale	44	3,37(▲)	5,66(▲)	0,03(▲)	16,53	22,86
	Sud-Isole	97	4,13(▲)	5,75(▲)	1,64(▲)	16,28	30,66
	<i>TOTALE</i>	<i>247</i>	<i>4,44(▲)</i>	<i>6,52(▲)</i>	<i>1,43(▲)</i>	<i>16,53(▲)</i>	<i>30,66</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	435	2,61(▲)	4,90(▲)	0,00(▲)	14,67(▲)	20,00
	Nord occidentale	591	3,04(▲)	5,17(▲)	0,63(▲)	14,97(▲)	25,33
	Nord orientale	450	2,46(▲)	4,91(▲)	0,00(▲)	14,96(▲)	21,73
	Sud-Isole(#)	836	2,88(▲)	4,06(▲)	1,01(▲)	10,94(▲)	17,51(▲)
	<i>TOTALE(#)</i>	<i>2312</i>	<i>2,79(▲)</i>	<i>4,69(▲)</i>	<i>0,47(▲)</i>	<i>13,08(▲)</i>	<i>21,52(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	103	3,58(▲)	5,57(▲)	0,41(▲)	16,90	19,42
	Nord occidentale	147	4,17(▲)	5,72(▲)	2,04(▲)	16,09	28,80
	Nord orientale	109	3,60(▲)	4,34(▲)	2,18(▲)	12,30	17,08
	Sud-Isole	159	3,55(▲)	4,83(▲)	1,43(▲)	12,38	24,52
	<i>TOTALE</i>	<i>518</i>	<i>3,74(▲)</i>	<i>5,15(▲)</i>	<i>1,65(▲)</i>	<i>14,45(▲)</i>	<i>24,00</i>
TOTALE	Centro	623	3,31(▲)	5,74(▲)	0,45(▲)	16,00(▲)	23,05
	Nord occidentale	857	3,58(▲)	6,08(▲)	0,99(▲)	15,71(▲)	27,17(▲)
	Nord orientale	642	2,96(▲)	5,25(▲)	0,28(▲)	14,97(▲)	22,86
	Sud-Isole(#)	1200	3,65(▲)	5,47(▲)	1,29(▲)	14,36(▲)	26,09(▲)
	<i>TOTALE(#)</i>	<i>3322</i>	<i>3,43(▲)</i>	<i>5,65(▲)</i>	<i>0,94(▲)</i>	<i>15,32(▲)</i>	<i>25,78(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

(#) La numerosità può non coincidere con quella riportata nelle tabelle della parte B2, in quanto il dato del peso risulta mancante per una femmina adulta del "Sud-Isole"

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.p.4(a) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del sottogruppo alimentare "ACQUA" per classi di età e area geografica: FEMMINE dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% ^(*)	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	3	60	14,43	10,25	8,53	26,26	26,26
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	3	75	11,53	2,32	10,50	14,19	14,19
	Sud-Isole	4	44	19,81	10,24	18,28	31,70	31,70
	<i>TOTALE</i>	<i>10</i>	<i>43</i>	<i>15,71</i>	<i>8,56</i>	<i>11,26</i>	<i>31,70</i>	<i>31,70</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	11	79	11,53	8,03	10,98	23,05	23,05
	Nord occidentale	15	65	15,50	15,76	10,00	53,33	53,33
	Nord orientale	10	59	9,37	11,48	4,51	36,41	36,41
	Sud-Isole	34	76	12,06 ^(▲)	8,05 ^(▲)	11,29 ^(▲)	27,83	33,17
	<i>TOTALE</i>	<i>70</i>	<i>71</i>	<i>12,33^(▲)</i>	<i>10,56^(▲)</i>	<i>9,97^(▲)</i>	<i>36,41</i>	<i>53,33</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	15	60	9,48	9,49	8,00	37,78	37,78
	Nord occidentale	14	48	10,95	10,27	7,87	40,30	40,30
	Nord orientale	12	48	7,84	6,25	6,89	19,30	19,30
	Sud-Isole	43	72	5,34 ^(▲)	5,82 ^(▲)	3,05 ^(▲)	19,15	23,84
	<i>TOTALE</i>	<i>84</i>	<i>60</i>	<i>7,37^(▲)</i>	<i>7,69^(▲)</i>	<i>5,86^(▲)</i>	<i>21,67</i>	<i>40,30</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	121	49	6,23 ^(▲)	6,70 ^(▲)	2,47 ^(▲)	19,78	27,65
	Nord occidentale	173	54	6,16 ^(▲)	6,44 ^(▲)	3,86 ^(▲)	21,52 ^(▲)	27,17
	Nord orientale	118	50	6,11 ^(▲)	6,71 ^(▲)	2,49 ^(▲)	20,38	27,47
	Sud-Isole ^(#)	265	60	5,38 ^(▲)	4,42 ^(▲)	4,92 ^(▲)	12,89 ^(▲)	19,80
	<i>TOTALE^(#)</i>	<i>677</i>	<i>54</i>	<i>5,86^(▲)</i>	<i>5,84^(▲)</i>	<i>4,03^(▲)</i>	<i>18,19^(▲)</i>	<i>27,17</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	39	61	7,19 ^(▲)	6,32 ^(▲)	5,52 ^(▲)	19,42	25,81
	Nord occidentale	70	73	5,80 ^(▲)	5,46 ^(▲)	4,23 ^(▲)	16,51	28,80
	Nord orientale	52	80	5,35 ^(▲)	4,58 ^(▲)	3,57 ^(▲)	12,98	22,46
	Sud-Isole	60	66	6,00 ^(▲)	5,07 ^(▲)	4,77 ^(▲)	14,69	27,90
	<i>TOTALE</i>	<i>221</i>	<i>70</i>	<i>5,99^(▲)</i>	<i>5,33^(▲)</i>	<i>4,38^(▲)</i>	<i>16,51^(▲)</i>	<i>25,81</i>
TOTALE	Centro	189	53	7,13 ^(▲)	7,14 ^(▲)	4,41 ^(▲)	20,00 ^(▲)	31,11
	Nord occidentale	272	58	6,83 ^(▲)	7,58 ^(▲)	4,43 ^(▲)	22,46 ^(▲)	40,30
	Nord orientale	195	56	6,27 ^(▲)	6,51 ^(▲)	3,00 ^(▲)	19,30 ^(▲)	27,53
	Sud-Isole ^(#)	406	63	6,17 ^(▲)	5,59 ^(▲)	5,02 ^(▲)	17,78 ^(▲)	27,78
	<i>TOTALE^(#)</i>	<i>1062</i>	<i>58</i>	<i>6,53^(▲)</i>	<i>6,60^(▲)</i>	<i>4,57^(▲)</i>	<i>19,30^(▲)</i>	<i>28,80^(▲)</i>

(^o) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(*) Deviazione Standard

(#) La numerosità può non coincidere con quella riportata nelle tabelle della parte B2, in quanto il dato del peso risulta mancante per una femmina adulta del "Sud-Isole"

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

Tabella 1.A.p.4(b) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del sottogruppo alimentare "ACQUA" per classi di età e area geografica: MASCHI dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% ^(*)	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	5	83	14,21	16,31	6,31	42,90	42,90
	Nord occidentale	1	20	3,56	--	--	--	--
	Nord orientale	5	83	9,70	7,93	5,70	22,10	22,10
	Sud-Isole	8	67	20,45	15,95	15,95	47,56	47,56
	<i>TOTALE</i>	<i>19</i>	<i>66</i>	<i>15,09</i>	<i>14,16</i>	<i>9,50</i>	<i>47,56</i>	<i>47,56</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	10	67	7,33	5,84	4,36	17,33	17,33
	Nord occidentale	13	52	8,73	8,78	5,97	34,44	34,44
	Nord orientale	7	58	10,67	8,51	11,94	24,69	24,69
	Sud-Isole	27	64	13,16	8,56	11,86	33,83	34,38
	<i>TOTALE</i>	<i>57</i>	<i>61</i>	<i>10,82^(▲)</i>	<i>8,35^(▲)</i>	<i>10,53^(▲)</i>	<i>33,83</i>	<i>34,44</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	13	65	7,54	4,58	7,09	14,62	14,62
	Nord occidentale	18	56	8,63	6,19	7,78	19,17	19,17
	Nord orientale	11	58	4,93	6,65	3,02	22,86	22,86
	Sud-Isole	28	76	6,10	6,49	5,04	16,28	30,66
	<i>TOTALE</i>	<i>70</i>	<i>65</i>	<i>6,83^(▲)</i>	<i>6,14^(▲)</i>	<i>5,53^(▲)</i>	<i>18,95</i>	<i>30,66</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	94	50	4,06 ^(▲)	4,33 ^(▲)	1,88 ^(▲)	13,72	19,05
	Nord occidentale	142	52	5,15 ^(▲)	5,19 ^(▲)	3,27 ^(▲)	15,35	23,29
	Nord orientale	99	46	3,91 ^(▲)	4,90 ^(▲)	1,86 ^(▲)	15,98	22,95
	Sud-Isole	227	57	4,32 ^(▲)	4,01 ^(▲)	3,42 ^(▲)	11,85 ^(▲)	18,13
	<i>TOTALE</i>	<i>562</i>	<i>53</i>	<i>4,41^(▲)</i>	<i>4,56^(▲)</i>	<i>2,93^(▲)</i>	<i>14,36^(▲)</i>	<i>21,08</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	17	44	5,21	5,52	3,76	18,20	18,20
	Nord occidentale	37	73	5,60 ^(▲)	6,99 ^(▲)	2,97 ^(▲)	24,00	29,33
	Nord orientale	29	66	3,95	3,95	2,50	12,13	17,08
	Sud-Isole	43	63	4,75 ^(▲)	4,96 ^(▲)	3,42 ^(▲)	15,56	24,52
	<i>TOTALE</i>	<i>126</i>	<i>62</i>	<i>4,88^(▲)</i>	<i>5,49^(▲)</i>	<i>3,20^(▲)</i>	<i>17,08</i>	<i>24,52</i>
TOTALE	Centro	139	52	5,12 ^(▲)	5,71 ^(▲)	3,08 ^(▲)	16,00	19,05
	Nord occidentale	211	55	5,74 ^(▲)	5,96 ^(▲)	3,68 ^(▲)	18,95 ^(▲)	26,18
	Nord orientale	151	51	4,50 ^(▲)	5,40 ^(▲)	2,31 ^(▲)	16,41	22,95
	Sud-Isole	333	60	5,63 ^(▲)	6,31 ^(▲)	3,83 ^(▲)	16,89 ^(▲)	33,83
	<i>TOTALE</i>	<i>834</i>	<i>56</i>	<i>5,37^(▲)</i>	<i>5,97^(▲)</i>	<i>3,38^(▲)</i>	<i>16,89^(▲)</i>	<i>28,44^(▲)</i>

(*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: n ≥ 30 per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); n ≥ 160 per P95 e n ≥ 800 per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

Tabella 1.A.p.4(c) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del sottogruppo alimentare "ACQUA" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% ^(*)	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	8	73	14,29	13,49	8,51	42,90	42,90
	Nord occidentale	1	10	3,56	--	--	--	--
	Nord orientale	8	80	10,39	6,19	10,21	22,10	22,10
	Sud-Isole	12	57	20,23	13,81	15,95	47,56	47,56
	<i>TOTALE</i>	<i>29</i>	<i>56</i>	<i>15,30</i>	<i>12,35</i>	<i>10,96</i>	<i>42,90</i>	<i>47,56</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	21	72	9,53	7,23	6,27	20,87	23,05
	Nord occidentale	28	58	12,36	13,22	7,83	41,86	53,33
	Nord orientale	17	59	9,91	10,09	5,27	36,41	36,41
	Sud-Isole	61	70	12,55 ^(▲)	8,23 ^(▲)	11,86 ^(▲)	28,44	34,38
	<i>TOTALE</i>	<i>127</i>	<i>66</i>	<i>11,65^(▲)</i>	<i>9,62^(▲)</i>	<i>10,18^(▲)</i>	<i>33,83</i>	<i>41,86</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	28	62	8,58	7,55	7,24	18,00	37,78
	Nord occidentale	32	52	9,64 ^(▲)	8,16 ^(▲)	7,78 ^(▲)	24,00	40,30
	Nord orientale	23	52	6,45	6,47	3,47	19,30	22,86
	Sud-Isole	71	73	5,64 ^(▲)	6,06 ^(▲)	4,21 ^(▲)	19,15	30,66
	<i>TOTALE</i>	<i>154</i>	<i>62</i>	<i>7,13^(▲)</i>	<i>7,01^(▲)</i>	<i>5,74^(▲)</i>	<i>19,30</i>	<i>37,78</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	215	49	5,28 ^(▲)	5,87 ^(▲)	2,16 ^(▲)	18,11 ^(▲)	22,40
	Nord occidentale	315	53	5,70 ^(▲)	5,92 ^(▲)	3,56 ^(▲)	19,15 ^(▲)	26,67
	Nord orientale	217	48	5,11 ^(▲)	6,04 ^(▲)	2,13 ^(▲)	18,78 ^(▲)	22,99
	Sud-Isole ^(#)	492	59	4,89 ^(▲)	4,26 ^(▲)	4,13 ^(▲)	12,63 ^(▲)	19,80
	<i>TOTALE^(#)</i>	<i>1239</i>	<i>54</i>	<i>5,20^(▲)</i>	<i>5,34^(▲)</i>	<i>3,33^(▲)</i>	<i>16,84^(▲)</i>	<i>25,33^(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	56	54	6,59 ^(▲)	6,11 ^(▲)	4,58 ^(▲)	18,20	25,81
	Nord occidentale	107	73	5,73 ^(▲)	6,00 ^(▲)	3,56 ^(▲)	18,06	28,80
	Nord orientale	81	74	4,85 ^(▲)	4,39 ^(▲)	2,92 ^(▲)	12,41	22,46
	Sud-Isole	103	65	5,48 ^(▲)	5,04 ^(▲)	4,38 ^(▲)	15,56	24,52
	<i>TOTALE</i>	<i>347</i>	<i>67</i>	<i>5,59^(▲)</i>	<i>5,41^(▲)</i>	<i>3,78^(▲)</i>	<i>16,90^(▲)</i>	<i>25,81</i>
TOTALE	Centro	328	53	6,28 ^(▲)	6,63 ^(▲)	3,79 ^(▲)	18,82 ^(▲)	27,65
	Nord occidentale	483	56	6,35 ^(▲)	6,93 ^(▲)	4,03 ^(▲)	19,46 ^(▲)	34,44
	Nord orientale	346	54	5,49 ^(▲)	6,10 ^(▲)	2,72 ^(▲)	17,95 ^(▲)	24,69
	Sud-Isole ^(#)	739	62	5,92 ^(▲)	5,93 ^(▲)	4,64 ^(▲)	17,51 ^(▲)	28,44
	<i>TOTALE^(#)</i>	<i>1896</i>	<i>57</i>	<i>6,02^(▲)</i>	<i>6,35^(▲)</i>	<i>3,96^(▲)</i>	<i>18,42^(▲)</i>	<i>28,80^(▲)</i>

(*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(*) Deviazione Standard

(#) La numerosità può non coincidere con quella riportata nelle tabelle della parte B2, in quanto il dato del peso risulta mancante per una femmina adulta del "Sud-Isole"

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: n ≥ 30 per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); n ≥ 160 per P95 e n ≥ 800 per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

Tabella 1.A.p.5(a) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del sottogruppo alimentare "ACQUA MINERALE" per classi di età e area geografica: FEMMINE del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	5	22,37	21,46	17,07	57,44	57,44
	Nord occidentale	5	36,39	46,92	21,82	117,62	117,62
	Nord orientale	4	31,64	14,49	32,84	48,00	48,00
	Sud-Isole	9	19,95	21,12	11,11	58,89	58,89
	<i>TOTALE</i>	<i>23</i>	<i>26,08</i>	<i>26,89</i>	<i>21,82</i>	<i>58,89</i>	<i>117,62</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	14	16,81	22,88	10,26	71,79	71,79
	Nord occidentale	23	15,39	11,62	15,24	30,67	42,96
	Nord orientale	17	14,21	11,72	14,22	40,00	40,00
	Sud-Isole	45	8,50 ^(▲)	8,93 ^(▲)	6,67 ^(▲)	21,33	37,50
	<i>TOTALE</i>	<i>99</i>	<i>12,26^(▲)</i>	<i>13,05^(▲)</i>	<i>10,81^(▲)</i>	<i>37,50</i>	<i>71,79</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	25	9,14	7,30	9,23	20,00	27,67
	Nord occidentale	29	7,54	7,44	5,49	20,44	26,00
	Nord orientale	25	9,56	7,28	10,16	20,00	25,11
	Sud-Isole	60	7,58 ^(▲)	6,60 ^(▲)	7,42 ^(▲)	18,46	23,62
	<i>TOTALE</i>	<i>139</i>	<i>8,21^(▲)</i>	<i>7,00^(▲)</i>	<i>8,24^(▲)</i>	<i>20,00</i>	<i>26,00</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	248	9,75 ^(▲)	7,29 ^(▲)	9,07 ^(▲)	23,56 ^(▲)	31,67
	Nord occidentale	320	9,86 ^(▲)	8,60 ^(▲)	8,39 ^(▲)	26,17 ^(▲)	35,71
	Nord orientale	237	8,95 ^(▲)	6,51 ^(▲)	8,89 ^(▲)	21,48 ^(▲)	26,76
	Sud-Isole ^(#)	439	5,79 ^(▲)	5,95 ^(▲)	4,95 ^(▲)	16,00 ^(▲)	22,14
	<i>TOTALE^(#)</i>	<i>1244</i>	<i>8,23^(▲)</i>	<i>7,31^(▲)</i>	<i>7,56^(▲)</i>	<i>21,70^(▲)</i>	<i>32,78^(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	64	6,46 ^(▲)	5,69 ^(▲)	7,05 ^(▲)	16,67	18,96
	Nord occidentale	96	5,27 ^(▲)	5,47 ^(▲)	3,98 ^(▲)	16,00	22,51
	Nord orientale	65	7,61 ^(▲)	5,26 ^(▲)	8,38 ^(▲)	16,00	20,48
	Sud-Isole	91	4,85 ^(▲)	5,00 ^(▲)	4,16 ^(▲)	12,87	20,70
	<i>TOTALE</i>	<i>316</i>	<i>5,87^(▲)</i>	<i>5,42^(▲)</i>	<i>5,55^(▲)</i>	<i>15,95^(▲)</i>	<i>19,28</i>
TOTALE	Centro	356	9,57 ^(▲)	8,77 ^(▲)	8,89 ^(▲)	23,59 ^(▲)	38,78
	Nord occidentale	473	9,34 ^(▲)	9,87 ^(▲)	7,36 ^(▲)	26,13 ^(▲)	37,53
	Nord orientale	348	9,26 ^(▲)	7,30 ^(▲)	8,99 ^(▲)	22,10 ^(▲)	31,07
	Sud-Isole ^(#)	644	6,21 ^(▲)	6,79 ^(▲)	5,10 ^(▲)	17,44 ^(▲)	30,92
	<i>TOTALE^(#)</i>	<i>1821</i>	<i>8,26^(▲)</i>	<i>8,31^(▲)</i>	<i>7,38^(▲)</i>	<i>21,98^(▲)</i>	<i>34,97^(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

(#) La numerosità può non coincidere con quella riportata nelle tabelle della parte B2, in quanto il dato del peso risulta mancante per una femmina adulta del "Sud-Isole"

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

Tabella 1.A.p.5(b) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del sottogruppo alimentare "ACQUA MINERALE" per classi di età e area geografica: MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	6	9,08	12,32	4,62	31,11	31,11
	Nord occidentale	5	33,24	7,30	36,83	38,22	38,22
	Nord orientale	6	30,21	26,54	22,54	83,08	83,08
	Sud-Isole	12	38,91	78,31	16,89	284,44	284,44
	<i>TOTALE</i>	<i>29</i>	<i>29,96</i>	<i>51,95</i>	<i>19,20</i>	<i>83,08</i>	<i>284,44</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	15	16,77	10,62	15,00	40,00	40,00
	Nord occidentale	25	17,48	9,44	16,00	33,33	40,00
	Nord orientale	12	17,94	14,73	18,09	47,18	47,18
	Sud-Isole	42	10,18(▲)	9,65(▲)	8,00(▲)	26,67	30,67
	<i>TOTALE</i>	<i>94</i>	<i>14,16(▲)</i>	<i>10,95(▲)</i>	<i>13,55(▲)</i>	<i>33,33</i>	<i>47,18</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	20	5,93	6,88	1,85	16,98	17,69
	Nord occidentale	32	9,97(▲)	9,41(▲)	9,60(▲)	29,86	36,56
	Nord orientale	19	10,49	6,65	9,70	23,11	23,11
	Sud-Isole	37	6,67(▲)	6,62(▲)	4,74(▲)	18,42	25,21
	<i>TOTALE</i>	<i>108</i>	<i>8,19(▲)</i>	<i>7,74(▲)</i>	<i>8,28(▲)</i>	<i>23,11</i>	<i>29,86</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	187	6,44(▲)	5,12(▲)	6,39(▲)	15,22(▲)	22,42
	Nord occidentale	271	7,29(▲)	6,18(▲)	6,27(▲)	19,33(▲)	23,17
	Nord orientale	213	7,68(▲)	5,66(▲)	7,47(▲)	17,78(▲)	26,19
	Sud-Isole	397	4,21(▲)	4,31(▲)	3,81(▲)	12,80(▲)	15,05
	<i>TOTALE</i>	<i>1068</i>	<i>6,08(▲)</i>	<i>5,45(▲)</i>	<i>5,47(▲)</i>	<i>15,96(▲)</i>	<i>22,42(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	39	4,62(▲)	4,11(▲)	5,07(▲)	11,67	12,93
	Nord occidentale	51	4,44(▲)	5,52(▲)	2,73(▲)	14,81	26,29
	Nord orientale	44	6,99(▲)	4,69(▲)	7,70(▲)	14,92	17,32
	Sud-Isole	68	4,12(▲)	4,35(▲)	2,88(▲)	11,92	17,97
	<i>TOTALE</i>	<i>202</i>	<i>4,92(▲)</i>	<i>4,80(▲)</i>	<i>4,17(▲)</i>	<i>12,95(▲)</i>	<i>17,32</i>
TOTALE	Centro	267	6,78(▲)	6,28(▲)	6,33(▲)	17,60(▲)	32,93
	Nord occidentale	384	8,14(▲)	7,80(▲)	6,49(▲)	21,88(▲)	36,83
	Nord orientale	294	8,63(▲)	7,98(▲)	7,74(▲)	21,62(▲)	34,89
	Sud-Isole	556	5,57(▲)	13,19(▲)	3,98(▲)	15,76(▲)	26,67
	<i>TOTALE</i>	<i>1501</i>	<i>7,04(▲)</i>	<i>10,05(▲)</i>	<i>5,77(▲)</i>	<i>19,33(▲)</i>	<i>32,00(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

Tabella 1.A.p.5(c) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del sottogruppo alimentare "ACQUA MINERALE" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	11	15,12	17,56	13,33	57,44	57,44
	Nord occidentale	10	34,81	31,70	32,62	117,62	117,62
	Nord orientale	10	30,78	21,49	24,00	83,08	83,08
	Sud-Isole	21	30,78	60,36	16,00	58,89	284,44
	<i>TOTALE</i>	<i>52</i>	<i>28,24^(▲)</i>	<i>42,40^(▲)</i>	<i>19,87^(▲)</i>	<i>83,08</i>	<i>284,44</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	29	16,79	17,31	13,76	63,33	71,79
	Nord occidentale	48	16,48 ^(▲)	10,48 ^(▲)	15,77 ^(▲)	33,33	42,96
	Nord orientale	29	15,75	12,93	17,78	40,00	47,18
	Sud-Isole	87	9,31 ^(▲)	9,27 ^(▲)	7,62 ^(▲)	25,88	37,50
	<i>TOTALE</i>	<i>193</i>	<i>13,19^(▲)</i>	<i>12,08^(▲)</i>	<i>12,06^(▲)</i>	<i>33,33</i>	<i>63,33</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	45	7,71 ^(▲)	7,22 ^(▲)	8,00 ^(▲)	17,69	27,67
	Nord occidentale	61	8,82 ^(▲)	8,55 ^(▲)	6,55 ^(▲)	26,00	36,56
	Nord orientale	44	9,96 ^(▲)	6,95 ^(▲)	9,86 ^(▲)	20,95	25,11
	Sud-Isole	97	7,23 ^(▲)	6,58 ^(▲)	7,38 ^(▲)	18,42	25,21
	<i>TOTALE</i>	<i>247</i>	<i>8,20^(▲)</i>	<i>7,32^(▲)</i>	<i>8,24^(▲)</i>	<i>20,00^(▲)</i>	<i>27,67</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	435	8,33 ^(▲)	6,65 ^(▲)	7,84 ^(▲)	20,61 ^(▲)	31,56
	Nord occidentale	591	8,68 ^(▲)	7,69 ^(▲)	7,35 ^(▲)	22,86 ^(▲)	35,39
	Nord orientale	450	8,35 ^(▲)	6,15 ^(▲)	8,10 ^(▲)	20,27 ^(▲)	26,76
	Sud-Isole ^(#)	836	5,04 ^(▲)	5,29 ^(▲)	4,11 ^(▲)	14,31 ^(▲)	20,36 ^(▲)
	<i>TOTALE^(#)</i>	<i>2312</i>	<i>7,23^(▲)</i>	<i>6,60^(▲)</i>	<i>6,40^(▲)</i>	<i>19,54^(▲)</i>	<i>28,77^(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	103	5,76 ^(▲)	5,20 ^(▲)	5,79 ^(▲)	15,43	18,26
	Nord occidentale	147	4,98 ^(▲)	5,48 ^(▲)	3,39 ^(▲)	15,11	22,51
	Nord orientale	109	7,36 ^(▲)	5,03 ^(▲)	8,07 ^(▲)	15,95	19,28
	Sud-Isole	159	4,54 ^(▲)	4,73 ^(▲)	3,56 ^(▲)	12,36	17,97
	<i>TOTALE</i>	<i>518</i>	<i>5,50^(▲)</i>	<i>5,20^(▲)</i>	<i>4,96^(▲)</i>	<i>14,93^(▲)</i>	<i>18,96</i>
TOTALE	Centro	623	8,38 ^(▲)	7,91 ^(▲)	7,73 ^(▲)	21,38 ^(▲)	32,93
	Nord occidentale	857	8,80 ^(▲)	9,02 ^(▲)	7,11 ^(▲)	25,95 ^(▲)	36,83 ^(▲)
	Nord orientale	642	8,98 ^(▲)	7,62 ^(▲)	8,38 ^(▲)	22,08 ^(▲)	32,00
	Sud-Isole ^(#)	1200	5,91 ^(▲)	10,27 ^(▲)	4,30 ^(▲)	16,91 ^(▲)	29,23 ^(▲)
	<i>TOTALE^(#)</i>	<i>3322</i>	<i>7,71^(▲)</i>	<i>9,16^(▲)</i>	<i>6,55^(▲)</i>	<i>20,95^(▲)</i>	<i>33,67^(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

(#) La numerosità può non coincidere con quella riportata nelle tabelle della parte B2, in quanto il dato del peso risulta mancante per una femmina adulta del "Sud-Isole"

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.p.6(a) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del sottogruppo alimentare "ACQUA MINERALE" per classi di età e area geografica: FEMMINE dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% ^(*)	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	4	80	27,96	20,14	20,53	57,44	57,44
	Nord occidentale	4	80	45,48	48,83	26,70	117,62	117,62
	Nord orientale	4	100	31,64	14,49	32,84	48,00	48,00
	Sud-Isole	6	67	29,93	18,86	29,23	58,89	58,89
	<i>TOTALE</i>	18	78	33,33	26,08	28,87	117,62	117,62
Bambini (3-9 anni)	Centro	10	71	23,53	24,10	14,76	71,79	71,79
	Nord occidentale	21	91	16,85	11,07	15,24	30,67	42,96
	Nord orientale	13	76	18,59	9,75	18,67	40,00	40,00
	Sud-Isole	29	64	13,20	7,81	15,19	21,82	37,50
	<i>TOTALE</i>	73	74	16,62 ^(▲)	12,58 ^(▲)	15,38 ^(▲)	40,00	71,79
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	19	76	12,03	5,87	10,67	27,67	27,67
	Nord occidentale	21	72	10,42	6,79	8,89	20,44	26,00
	Nord orientale	19	76	12,58	5,53	11,64	25,11	25,11
	Sud-Isole	43	72	10,57 ^(▲)	5,35 ^(▲)	10,49 ^(▲)	18,67	23,62
	<i>TOTALE</i>	102	73	11,19 ^(▲)	5,78 ^(▲)	10,58 ^(▲)	20,00	26,00
Adulti (18-64 anni)	Centro	207	83	11,68 ^(▲)	6,41 ^(▲)	10,32 ^(▲)	23,74 ^(▲)	31,67
	Nord occidentale	268	84	11,77 ^(▲)	8,10 ^(▲)	9,89 ^(▲)	26,27 ^(▲)	37,53
	Nord orientale	203	86	10,45 ^(▲)	5,81 ^(▲)	9,73 ^(▲)	22,08 ^(▲)	26,76
	Sud-Isole ^(#)	305	69	8,33 ^(▲)	5,45 ^(▲)	7,65 ^(▲)	16,97 ^(▲)	28,77
	<i>TOTALE^(#)</i>	983	79	10,41 ^(▲)	6,69 ^(▲)	9,24 ^(▲)	23,56 ^(▲)	34,91 ^(▲)
Anziani (65-97 anni)	Centro	43	67	9,61 ^(▲)	4,18 ^(▲)	9,40 ^(▲)	17,44	18,96
	Nord occidentale	64	67	7,90 ^(▲)	4,89 ^(▲)	6,87 ^(▲)	16,11	22,51
	Nord orientale	51	78	9,70 ^(▲)	3,85 ^(▲)	9,85 ^(▲)	17,78	20,48
	Sud-Isole	55	60	8,02 ^(▲)	3,96 ^(▲)	8,30 ^(▲)	14,93	20,70
	<i>TOTALE</i>	213	67	8,71 ^(▲)	4,33 ^(▲)	8,67 ^(▲)	16,19 ^(▲)	20,48
TOTALE	Centro	283	79	12,04 ^(▲)	8,18 ^(▲)	10,32 ^(▲)	24,10 ^(▲)	57,44
	Nord occidentale	378	80	11,68 ^(▲)	9,72 ^(▲)	9,81 ^(▲)	27,23 ^(▲)	42,96
	Nord orientale	290	83	11,12 ^(▲)	6,58 ^(▲)	10,02 ^(▲)	24,05 ^(▲)	34,62
	Sud-Isole ^(#)	438	68	9,13 ^(▲)	6,42 ^(▲)	8,22 ^(▲)	18,67 ^(▲)	34,91
	<i>TOTALE^(#)</i>	1389	76	10,83 ^(▲)	7,92 ^(▲)	9,50 ^(▲)	24,10 ^(▲)	37,53 ^(▲)

(^o) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(^{*}) Deviazione Standard

([#]) La numerosità può non coincidere con quella riportata nelle tabelle della parte B2, in quanto il dato del peso risulta mancante per una femmina adulta del "Sud-Isole"

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

Tabella 1.A.p.6(b) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del sottogruppo alimentare "ACQUA MINERALE" per classi di età e area geografica: MASCHI dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% ^(*)	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	3	50	18,17	11,48	14,16	31,11	31,11
	Nord occidentale	5	100	33,24	7,30	36,83	38,22	38,22
	Nord orientale	6	100	30,21	26,54	22,54	83,08	83,08
	Sud-Isole	10	83	46,69	84,21	18,06	284,44	284,44
	<i>TOTALE</i>	<i>24</i>	<i>83</i>	<i>36,20</i>	<i>55,23</i>	<i>21,78</i>	<i>83,08</i>	<i>284,44</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	14	93	17,97	9,91	15,28	40,00	40,00
	Nord occidentale	25	100	17,48	9,44	16,00	33,33	40,00
	Nord orientale	9	75	23,91	11,72	20,83	47,18	47,18
	Sud-Isole	29	69	14,74	8,17	13,33	29,70	30,67
	<i>TOTALE</i>	<i>77</i>	<i>82</i>	<i>17,29^(▲)</i>	<i>9,58^(▲)</i>	<i>16,00^(▲)</i>	<i>33,33</i>	<i>47,18</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	10	50	11,86	4,67	12,18	17,69	17,69
	Nord occidentale	26	81	12,28	8,96	10,25	29,86	36,56
	Nord orientale	17	89	11,73	5,87	9,94	23,11	23,11
	Sud-Isole	26	70	9,50	5,93	9,02	18,42	25,21
	<i>TOTALE</i>	<i>79</i>	<i>73</i>	<i>11,19^(▲)</i>	<i>6,93^(▲)</i>	<i>10,10^(▲)</i>	<i>25,21</i>	<i>36,56</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	156	83	7,72 ^(▲)	4,63 ^(▲)	7,44 ^(▲)	16,23	22,42
	Nord occidentale	222	82	8,90 ^(▲)	5,68 ^(▲)	7,92 ^(▲)	19,52 ^(▲)	23,17
	Nord orientale	191	90	8,56 ^(▲)	5,30 ^(▲)	7,82 ^(▲)	18,00 ^(▲)	29,66
	Sud-Isole	262	66	6,39 ^(▲)	3,77 ^(▲)	5,71 ^(▲)	13,93 ^(▲)	15,09
	<i>TOTALE</i>	<i>831</i>	<i>78</i>	<i>7,81^(▲)</i>	<i>4,96^(▲)</i>	<i>7,04^(▲)</i>	<i>17,19^(▲)</i>	<i>22,86^(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	26	67	6,93	3,01	7,40	11,67	12,93
	Nord occidentale	33	65	6,85 ^(▲)	5,52 ^(▲)	5,83 ^(▲)	14,85	26,29
	Nord orientale	36	82	8,54 ^(▲)	3,65 ^(▲)	8,28 ^(▲)	15,33	17,32
	Sud-Isole	45	66	6,22 ^(▲)	3,92 ^(▲)	5,56 ^(▲)	12,36	17,97
	<i>TOTALE</i>	<i>140</i>	<i>69</i>	<i>7,10^(▲)</i>	<i>4,20^(▲)</i>	<i>7,42^(▲)</i>	<i>14,75</i>	<i>17,97</i>
TOTALE	Centro	209	78	8,66 ^(▲)	5,84 ^(▲)	7,72 ^(▲)	19,16 ^(▲)	32,93
	Nord occidentale	311	81	10,05 ^(▲)	7,47 ^(▲)	8,42 ^(▲)	26,29 ^(▲)	36,83
	Nord orientale	259	88	9,80 ^(▲)	7,80 ^(▲)	8,35 ^(▲)	22,67 ^(▲)	34,89
	Sud-Isole	372	67	8,32 ^(▲)	15,41 ^(▲)	6,26 ^(▲)	17,97 ^(▲)	30,00
	<i>TOTALE</i>	<i>1151</i>	<i>77</i>	<i>9,18^(▲)</i>	<i>10,58^(▲)</i>	<i>7,62^(▲)</i>	<i>21,54^(▲)</i>	<i>33,67^(▲)</i>

(*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.p.6(c) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del sottogruppo alimentare "ACQUA MINERALE" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% ^(*)	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	7	64	23,76	16,56	17,07	57,44	57,44
	Nord occidentale	9	90	38,68	31,02	33,67	117,62	117,62
	Nord orientale	10	100	30,78	21,49	24,00	83,08	83,08
	Sud-Isole	16	76	40,40	66,66	19,83	284,44	284,44
	TOTALE	42	81	34,97 ^(▲)	44,67 ^(▲)	23,43 ^(▲)	83,08	284,44
Bambini (3-9 anni)	Centro	24	83	20,29	17,05	15,28	63,33	71,79
	Nord occidentale	46	96	17,20 ^(▲)	10,10 ^(▲)	15,92 ^(▲)	33,33	42,96
	Nord orientale	22	76	20,77	10,67	19,75	40,00	47,18
	Sud-Isole	58	67	13,97 ^(▲)	7,96 ^(▲)	14,26 ^(▲)	29,70	37,50
	TOTALE	150	78	16,97 ^(▲)	11,11 ^(▲)	15,92 ^(▲)	37,50	63,33
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	29	64	11,97	5,40	10,67	20,00	27,67
	Nord occidentale	47	77	11,45 ^(▲)	8,04 ^(▲)	10,06 ^(▲)	27,17	36,56
	Nord orientale	36	82	12,18 ^(▲)	5,62 ^(▲)	11,15 ^(▲)	23,11	25,11
	Sud-Isole	69	71	10,17 ^(▲)	5,56 ^(▲)	10,05 ^(▲)	18,67	25,21
	TOTALE	181	73	11,19 ^(▲)	6,29 ^(▲)	10,37 ^(▲)	23,11 ^(▲)	29,86
Adulti (18-64 anni)	Centro	363	83	9,98 ^(▲)	6,03 ^(▲)	8,94 ^(▲)	21,70 ^(▲)	31,67
	Nord occidentale	490	83	10,47 ^(▲)	7,25 ^(▲)	8,89 ^(▲)	25,43 ^(▲)	35,56
	Nord orientale	394	88	9,54 ^(▲)	5,64 ^(▲)	8,73 ^(▲)	20,82 ^(▲)	28,02
	Sud-Isole ^(#)	567	68	7,43 ^(▲)	4,84 ^(▲)	6,56 ^(▲)	15,05 ^(▲)	22,14
	TOTALE ^(#)	1814	78	9,22 ^(▲)	6,10 ^(▲)	8,19 ^(▲)	20,74 ^(▲)	30,92 ^(▲)
Anziani (65-97 anni)	Centro	69	67	8,60 ^(▲)	3,98 ^(▲)	8,44 ^(▲)	16,67	18,96
	Nord occidentale	97	66	7,54 ^(▲)	5,11 ^(▲)	6,67 ^(▲)	16,11	26,29
	Nord orientale	87	80	9,22 ^(▲)	3,79 ^(▲)	8,89 ^(▲)	16,00	20,48
	Sud-Isole	100	63	7,21 ^(▲)	4,03 ^(▲)	7,50 ^(▲)	13,78	19,33
	TOTALE	353	68	8,07 ^(▲)	4,35 ^(▲)	8,00 ^(▲)	16,00 ^(▲)	20,48
TOTALE	Centro	492	79	10,61 ^(▲)	7,46 ^(▲)	9,14 ^(▲)	23,23 ^(▲)	38,78
	Nord occidentale	689	80	10,94 ^(▲)	8,81 ^(▲)	9,13 ^(▲)	26,67 ^(▲)	37,53
	Nord orientale	549	86	10,50 ^(▲)	7,20 ^(▲)	9,28 ^(▲)	22,86 ^(▲)	34,62
	Sud-Isole ^(#)	810	67	8,76 ^(▲)	11,46 ^(▲)	7,47 ^(▲)	18,42 ^(▲)	30,92 ^(▲)
	TOTALE ^(#)	2540	76	10,08 ^(▲)	9,26 ^(▲)	8,55 ^(▲)	22,86 ^(▲)	35,71 ^(▲)

(^o) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(^{*}) Deviazione Standard

([#]) La numerosità può non coincidere con quella riportata nelle tabelle della parte B2, in quanto il dato del peso risulta mancante per una femmina adulta del "Sud-Isole"

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

Tabella 1.A.p.7(a) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del sottogruppo alimentare "TISANE, TE', CAFFE' E SOSTITUTI (INCLUSI DECAFFEINATI)" per classi di età e area geografica: FEMMINE del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	5	0,08	0,18	0,00	0,40	0,40
	Nord occidentale	5	0,41	0,93	0,00	2,07	2,07
	Nord orientale	4	7,34	9,15	5,07	19,23	19,23
	Sud-Isole	9	0,74	2,22	0,00	6,67	6,67
	<i>TOTALE</i>	<i>23</i>	<i>1,67</i>	<i>4,53</i>	<i>0,00</i>	<i>9,86</i>	<i>19,23</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	14	1,52	3,60	0,00	12,82	12,82
	Nord occidentale	23	1,64	3,38	0,00	5,71	14,52
	Nord orientale	17	1,90	2,82	0,00	7,50	7,50
	Sud-Isole	45	1,12(▲)	3,87(▲)	0,00(▲)	9,59	21,88
	<i>TOTALE</i>	<i>99</i>	<i>1,43(▲)</i>	<i>3,52(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>9,59</i>	<i>21,88</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	25	0,65	0,87	0,25	2,59	2,88
	Nord occidentale	29	1,74	1,75	1,76	5,15	5,21
	Nord orientale	25	2,09	2,89	0,39	8,73	10,04
	Sud-Isole	60	0,57(▲)	1,14(▲)	0,00(▲)	2,58	7,14
	<i>TOTALE</i>	<i>139</i>	<i>1,10(▲)</i>	<i>1,78(▲)</i>	<i>0,25(▲)</i>	<i>5,00</i>	<i>8,73</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	248	2,18(▲)	1,71(▲)	1,85(▲)	5,14(▲)	9,75
	Nord occidentale	320	2,93(▲)	2,31(▲)	2,34(▲)	7,77(▲)	11,30
	Nord orientale	237	2,92(▲)	2,41(▲)	2,30(▲)	7,92(▲)	10,00
	Sud-Isole(■)	439	1,56(▲)	1,28(▲)	1,22(▲)	4,06(▲)	5,96
	<i>TOTALE(■)</i>	<i>1244</i>	<i>2,30(▲)</i>	<i>2,00(▲)</i>	<i>1,84(▲)</i>	<i>5,96(▲)</i>	<i>10,00(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	64	1,70(▲)	1,42(▲)	1,24(▲)	3,86	6,55
	Nord occidentale	96	2,71(▲)	2,13(▲)	1,98(▲)	7,38	10,49
	Nord orientale	65	2,27(▲)	1,99(▲)	1,62(▲)	6,09	9,52
	Sud-Isole	91	1,43(▲)	1,18(▲)	1,00(▲)	3,67	5,37
	<i>TOTALE</i>	<i>316</i>	<i>2,04(▲)</i>	<i>1,80(▲)</i>	<i>1,56(▲)</i>	<i>5,65(▲)</i>	<i>7,98</i>
TOTALE	Centro	356	1,93(▲)	1,77(▲)	1,56(▲)	4,90(▲)	9,75
	Nord occidentale	473	2,72(▲)	2,33(▲)	2,16(▲)	7,38(▲)	11,30
	Nord orientale	348	2,74(▲)	2,59(▲)	2,00(▲)	7,92(▲)	10,04
	Sud-Isole(■)	644	1,41(▲)	1,62(▲)	1,00(▲)	3,87(▲)	6,67
	<i>TOTALE(■)</i>	<i>1821</i>	<i>2,11(▲)</i>	<i>2,14(▲)</i>	<i>1,60(▲)</i>	<i>5,96(▲)</i>	<i>10,04(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

(■) La numerosità può non coincidere con quella riportata nelle tabelle della parte B2, in quanto il dato del peso risulta mancante per una femmina adulta del "Sud-Isole"

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

Tabella 1.A.p.7(b) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del sottogruppo alimentare "TISANE, TE', CAFFE' E SOSTITUTI (INCLUSI DECAFFEINATI)" per classi di età e area geografica: MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord occidentale	5	2,90	6,48	0,00	14,49	14,49
	Nord orientale	6	0,37	0,91	0,00	2,23	2,23
	Sud-Isole	12	0,26	0,90	0,00	3,13	3,13
	<i>TOTALE</i>	<i>29</i>	<i>0,68</i>	<i>2,75</i>	<i>0,00</i>	<i>3,13</i>	<i>14,49</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	15	1,17	1,79	0,00	4,58	4,58
	Nord occidentale	25	2,38	6,24	0,00	19,44	24,64
	Nord orientale	12	2,68	3,22	0,55	8,42	8,42
	Sud-Isole	42	0,69(▲)	2,38(▲)	0,00(▲)	1,46	14,38
	<i>TOTALE</i>	<i>94</i>	<i>1,47(▲)</i>	<i>3,87(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>7,81</i>	<i>24,64</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	20	0,76	1,44	0,00	4,58	5,32
	Nord occidentale	32	2,61(▲)	3,24(▲)	1,04(▲)	9,44	9,94
	Nord orientale	19	2,80	2,32	2,67	6,45	6,45
	Sud-Isole	37	0,37(▲)	0,52(▲)	0,00(▲)	1,50	1,88
	<i>TOTALE</i>	<i>108</i>	<i>1,53(▲)</i>	<i>2,37(▲)</i>	<i>0,38(▲)</i>	<i>6,48</i>	<i>9,44</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	187	1,71(▲)	1,22(▲)	1,45(▲)	3,82(▲)	6,41
	Nord occidentale	271	2,30(▲)	1,88(▲)	1,86(▲)	5,46(▲)	8,48
	Nord orientale	213	1,93(▲)	1,50(▲)	1,52(▲)	5,04(▲)	5,89
	Sud-Isole	397	1,30(▲)	1,05(▲)	1,09(▲)	2,93(▲)	4,33
	<i>TOTALE</i>	<i>1068</i>	<i>1,75(▲)</i>	<i>1,47(▲)</i>	<i>1,42(▲)</i>	<i>4,38(▲)</i>	<i>6,76(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	39	1,56(▲)	1,42(▲)	1,18(▲)	5,79	6,14
	Nord occidentale	51	2,44(▲)	2,85(▲)	1,99(▲)	5,47	19,23
	Nord orientale	44	1,88(▲)	1,58(▲)	1,35(▲)	4,62	7,00
	Sud-Isole	68	1,09(▲)	0,78(▲)	0,89(▲)	2,50	3,83
	<i>TOTALE</i>	<i>202</i>	<i>1,69(▲)</i>	<i>1,85(▲)</i>	<i>1,25(▲)</i>	<i>4,44(▲)</i>	<i>6,84</i>
TOTALE	Centro	267	1,55(▲)	1,33(▲)	1,29(▲)	3,87(▲)	6,32
	Nord occidentale	384	2,36(▲)	2,70(▲)	1,79(▲)	6,25(▲)	16,67
	Nord orientale	294	1,98(▲)	1,69(▲)	1,50(▲)	5,52(▲)	7,00
	Sud-Isole	556	1,15(▲)	1,18(▲)	0,92(▲)	2,91(▲)	4,33
	<i>TOTALE</i>	<i>1501</i>	<i>1,69(▲)</i>	<i>1,87(▲)</i>	<i>1,28(▲)</i>	<i>4,82(▲)</i>	<i>8,23(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

Tabella 1.A.p.7(c) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del sottogruppo alimentare "TISANE, TE', CAFFE' E SOSTITUTI (INCLUSI DECAFFEINATI)" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	11	0,04	0,12	0,00	0,40	0,40
	Nord occidentale	10	1,66	4,56	0,00	14,49	14,49
	Nord orientale	10	3,16	6,43	0,00	19,23	19,23
	Sud-Isole	21	0,47	1,58	0,00	3,13	6,67
	<i>TOTALE</i>	<i>52</i>	<i>1,12(▲)</i>	<i>3,64(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>9,86</i>	<i>19,23</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	29	1,34	2,76	0,00	4,58	12,82
	Nord occidentale	48	2,03(▲)	5,04(▲)	0,00(▲)	14,52	24,64
	Nord orientale	29	2,22	2,96	0,00	7,50	8,42
	Sud-Isole	87	0,91(▲)	3,23(▲)	0,00(▲)	5,96	21,88
	<i>TOTALE</i>	<i>193</i>	<i>1,45(▲)</i>	<i>3,68(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>7,81(▲)</i>	<i>21,88</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	45	0,70(▲)	1,14(▲)	0,00(▲)	2,88	5,32
	Nord occidentale	61	2,20(▲)	2,65(▲)	1,10(▲)	8,23	9,94
	Nord orientale	44	2,40(▲)	2,65(▲)	1,43(▲)	6,45	10,04
	Sud-Isole	97	0,49(▲)	0,96(▲)	0,00(▲)	2,02	7,14
	<i>TOTALE</i>	<i>247</i>	<i>1,29(▲)</i>	<i>2,07(▲)</i>	<i>0,33(▲)</i>	<i>5,56(▲)</i>	<i>9,44</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	435	1,98(▲)	1,54(▲)	1,71(▲)	4,77(▲)	7,59
	Nord occidentale	591	2,64(▲)	2,14(▲)	2,16(▲)	6,47(▲)	11,23
	Nord orientale	450	2,45(▲)	2,09(▲)	1,84(▲)	6,73(▲)	9,48
	Sud-Isole(§)	836	1,44(▲)	1,18(▲)	1,14(▲)	3,43(▲)	5,73(▲)
	<i>TOTALE(§)</i>	<i>2312</i>	<i>2,05(▲)</i>	<i>1,80(▲)</i>	<i>1,60(▲)</i>	<i>5,33(▲)</i>	<i>9,22(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	103	1,65(▲)	1,41(▲)	1,18(▲)	3,86	6,14
	Nord occidentale	147	2,61(▲)	2,40(▲)	1,99(▲)	6,88	10,49
	Nord orientale	109	2,11(▲)	1,84(▲)	1,49(▲)	5,61	8,16
	Sud-Isole	159	1,28(▲)	1,04(▲)	0,95(▲)	3,46	3,87
	<i>TOTALE</i>	<i>518</i>	<i>1,91(▲)</i>	<i>1,83(▲)</i>	<i>1,43(▲)</i>	<i>5,40(▲)</i>	<i>7,69</i>
TOTALE	Centro	623	1,77(▲)	1,61(▲)	1,43(▲)	4,57(▲)	7,24
	Nord occidentale	857	2,56(▲)	2,51(▲)	1,97(▲)	6,96(▲)	11,63(▲)
	Nord orientale	642	2,39(▲)	2,26(▲)	1,75(▲)	6,76(▲)	9,86
	Sud-Isole(§)	1200	1,29(▲)	1,44(▲)	0,95(▲)	3,42(▲)	5,98(▲)
	<i>TOTALE(§)</i>	<i>3322</i>	<i>1,92(▲)</i>	<i>2,03(▲)</i>	<i>1,42(▲)</i>	<i>5,48(▲)</i>	<i>9,75(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

(§) La numerosità può non coincidere con quella riportata nelle tabelle della parte B2, in quanto il dato del peso risulta mancante per una femmina adulta del "Sud-Isole"

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

Tabella 1.A.p.8(a) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del sottogruppo alimentare "TISANE, TE', CAFFE' E SOSTITUTI (INCLUSI DECAFFEINATI)" per classi di età e area geografica: FEMMINE dei soli consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	%(*)	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	1	20	0,40	--	--	--	--
	Nord occidentale	1	20	2,07	--	--	--	--
	Nord orientale	3	75	9,79	9,47	9,86	19,23	19,23
	Sud-Isole	1	11	6,67	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	6	26	6,42	7,33	4,37	19,23	19,23
Bambini (3-9 anni)	Centro	3	21	7,11	4,94	4,29	12,82	12,82
	Nord occidentale	10	43	3,78	4,35	2,99	14,52	14,52
	Nord orientale	8	47	4,04	2,87	4,23	7,50	7,50
	Sud-Isole	12	27	4,20	6,77	0,56	21,88	21,88
	<i>TOTALE</i>	33	33	4,30(▲)	5,02(▲)	2,86(▲)	14,52	21,88
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	13	52	1,24	0,83	1,11	2,88	2,88
	Nord occidentale	21	72	2,40	1,61	2,70	5,15	5,21
	Nord orientale	17	68	3,08	3,04	1,80	10,04	10,04
	Sud-Isole	28	47	1,23	1,42	0,72	3,22	7,14
	<i>TOTALE</i>	79	57	1,94(▲)	2,00(▲)	1,28(▲)	5,33	10,04
Adulti (18-64 anni)	Centro	237	96	2,29(▲)	1,68(▲)	1,86(▲)	5,29(▲)	9,75
	Nord occidentale	310	97	3,03(▲)	2,28(▲)	2,41(▲)	8,02(▲)	11,30
	Nord orientale	227	96	3,05(▲)	2,38(▲)	2,38(▲)	7,92(▲)	10,00
	Sud-Isole(♯)	413	94	1,66(▲)	1,26(▲)	1,25(▲)	4,09(▲)	5,96
	<i>TOTALE(♯)</i>	1187	95	2,41(▲)	1,98(▲)	1,90(▲)	5,99(▲)	10,14(▲)
Anziani (65-97 anni)	Centro	60	94	1,81(▲)	1,40(▲)	1,35(▲)	4,19	6,55
	Nord occidentale	94	98	2,76(▲)	2,11(▲)	2,03(▲)	7,38	10,49
	Nord orientale	61	94	2,42(▲)	1,97(▲)	1,70(▲)	6,09	9,52
	Sud-Isole	81	89	1,60(▲)	1,14(▲)	1,33(▲)	3,67	5,37
	<i>TOTALE</i>	296	94	2,18(▲)	1,78(▲)	1,70(▲)	6,09(▲)	8,16
TOTALE	Centro	314	88	2,19(▲)	1,73(▲)	1,83(▲)	5,14(▲)	9,75
	Nord occidentale	436	92	2,95(▲)	2,28(▲)	2,33(▲)	7,48(▲)	11,30
	Nord orientale	316	91	3,02(▲)	2,56(▲)	2,22(▲)	8,16(▲)	10,04
	Sud-Isole(♯)	535	83	1,69(▲)	1,63(▲)	1,25(▲)	4,09(▲)	7,14
	<i>TOTALE(♯)</i>	1601	88	2,40(▲)	2,13(▲)	1,85(▲)	6,21(▲)	10,26(▲)

(*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(*) Deviazione Standard

(♯) La numerosità può non coincidere con quella riportata nelle tabelle della parte B2, in quanto il dato del peso risulta mancante per una femmina adulta del "Sud-Isole"

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

Tabella 1.A.p.8(b) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del sottogruppo alimentare "TISANE, TE', CAFFE' E SOSTITUTI (INCLUSI DECAFFEINATI)" per classi di età e area geografica: MASCHI dei soli consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	%(*)	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	1	20	14,49	--	--	--	--
	Nord orientale	1	17	2,23	--	--	--	--
	Sud-Isole	1	8	3,13	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>3</i>	<i>10</i>	<i>6,62</i>	<i>6,84</i>	<i>3,13</i>	<i>14,49</i>	<i>14,49</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	6	40	2,94	1,67	3,58	4,58	4,58
	Nord occidentale	5	20	11,91	9,58	7,81	24,64	24,64
	Nord orientale	6	50	5,36	2,37	5,64	8,42	8,42
	Sud-Isole	12	29	2,41	4,06	0,97	14,38	14,38
	<i>TOTALE</i>	<i>29</i>	<i>31</i>	<i>4,77</i>	<i>5,78</i>	<i>3,35</i>	<i>19,44</i>	<i>24,64</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	9	45	1,69	1,78	1,00	5,32	5,32
	Nord occidentale	22	69	3,80	3,29	3,01	9,44	9,94
	Nord orientale	14	74	3,80	1,84	4,17	6,45	6,45
	Sud-Isole	17	46	0,80	0,48	0,76	1,88	1,88
	<i>TOTALE</i>	<i>62</i>	<i>57</i>	<i>2,67(▲)</i>	<i>2,60(▲)</i>	<i>1,50(▲)</i>	<i>8,23</i>	<i>9,94</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	179	96	1,79(▲)	1,19(▲)	1,52(▲)	3,93(▲)	6,41
	Nord occidentale	259	96	2,41(▲)	1,85(▲)	1,94(▲)	5,48(▲)	8,48
	Nord orientale	204	96	2,01(▲)	1,48(▲)	1,56(▲)	5,04(▲)	5,89
	Sud-Isole	382	96	1,36(▲)	1,04(▲)	1,11(▲)	2,93(▲)	4,33
	<i>TOTALE</i>	<i>1024</i>	<i>96</i>	<i>1,83(▲)</i>	<i>1,46(▲)</i>	<i>1,47(▲)</i>	<i>4,44(▲)</i>	<i>6,76(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	38	97	1,60(▲)	1,41(▲)	1,24(▲)	5,79	6,14
	Nord occidentale	48	94	2,59(▲)	2,87(▲)	2,04(▲)	5,47	19,23
	Nord orientale	42	95	1,97(▲)	1,56(▲)	1,41(▲)	4,62	7,00
	Sud-Isole	65	96	1,14(▲)	0,76(▲)	0,92(▲)	2,50	3,83
	<i>TOTALE</i>	<i>193</i>	<i>96</i>	<i>1,77(▲)</i>	<i>1,85(▲)</i>	<i>1,34(▲)</i>	<i>4,61(▲)</i>	<i>7,00</i>
TOTALE	Centro	232	87	1,78(▲)	1,27(▲)	1,48(▲)	3,97(▲)	6,32
	Nord occidentale	335	87	2,70(▲)	2,72(▲)	2,00(▲)	6,76(▲)	16,67
	Nord orientale	267	91	2,18(▲)	1,65(▲)	1,68(▲)	5,61(▲)	7,00
	Sud-Isole	477	86	1,34(▲)	1,17(▲)	1,07(▲)	3,13(▲)	4,77
	<i>TOTALE</i>	<i>1311</i>	<i>87</i>	<i>1,94(▲)</i>	<i>1,88(▲)</i>	<i>1,45(▲)</i>	<i>5,14(▲)</i>	<i>8,33(▲)</i>

(*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: n ≥ 30 per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); n ≥ 160 per P95 e n ≥ 800 per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

Tabella 1.A.p.8(c) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del sottogruppo alimentare "TISANE, TE', CAFFE' E SOSTITUTI (INCLUSI DECAFFEINATI)" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% ^(*)	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	1	9	0,40	--	--	--	--
	Nord occidentale	2	20	8,28	8,78	8,28	14,49	14,49
	Nord orientale	4	40	7,90	8,61	6,04	19,23	19,23
	Sud-Isole	2	10	4,90	2,50	4,90	6,67	6,67
	<i>TOTALE</i>	9	17	6,48	6,73	3,13	19,23	19,23
Bambini (3-9 anni)	Centro	9	31	4,33	3,49	3,87	12,82	12,82
	Nord occidentale	15	31	6,49	7,36	4,29	24,64	24,64
	Nord orientale	14	48	4,61	2,66	5,56	8,42	8,42
	Sud-Isole	24	28	3,31	5,53	0,79	14,38	21,88
	<i>TOTALE</i>	62	32	4,52 ^(▲)	5,35 ^(▲)	3,22 ^(▲)	14,52	24,64
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	22	49	1,42	1,29	1,08	3,85	5,32
	Nord occidentale	43	70	3,12 ^(▲)	2,67 ^(▲)	2,70 ^(▲)	8,33	9,94
	Nord orientale	31	70	3,41 ^(▲)	2,56 ^(▲)	3,33 ^(▲)	8,73	10,04
	Sud-Isole	45	46	1,07 ^(▲)	1,17 ^(▲)	0,75 ^(▲)	2,86	7,14
	<i>TOTALE</i>	141	57	2,26 ^(▲)	2,30 ^(▲)	1,35 ^(▲)	7,14	9,94
Adulti (18-64 anni)	Centro	416	96	2,07 ^(▲)	1,51 ^(▲)	1,77 ^(▲)	4,81 ^(▲)	7,59
	Nord occidentale	569	96	2,74 ^(▲)	2,12 ^(▲)	2,24 ^(▲)	6,67 ^(▲)	11,23
	Nord orientale	431	96	2,56 ^(▲)	2,07 ^(▲)	1,92 ^(▲)	6,76 ^(▲)	9,48
	Sud-Isole ^(#)	795	95	1,51 ^(▲)	1,16 ^(▲)	1,22 ^(▲)	3,55 ^(▲)	5,94
	<i>TOTALE^(#)</i>	2211	96	2,14 ^(▲)	1,78 ^(▲)	1,68 ^(▲)	5,43 ^(▲)	9,48 ^(▲)
Anziani (65-97 anni)	Centro	98	95	1,73 ^(▲)	1,40 ^(▲)	1,31 ^(▲)	4,52	6,55
	Nord occidentale	142	97	2,70 ^(▲)	2,39 ^(▲)	2,03 ^(▲)	6,88	10,49
	Nord orientale	103	94	2,24 ^(▲)	1,82 ^(▲)	1,61 ^(▲)	5,61	8,16
	Sud-Isole	146	92	1,40 ^(▲)	1,01 ^(▲)	1,00 ^(▲)	3,46	3,87
	<i>TOTALE</i>	489	94	2,02 ^(▲)	1,82 ^(▲)	1,49 ^(▲)	5,43 ^(▲)	7,98
TOTALE	Centro	546	88	2,02 ^(▲)	1,57 ^(▲)	1,69 ^(▲)	4,77 ^(▲)	7,59
	Nord occidentale	771	90	2,85 ^(▲)	2,49 ^(▲)	2,22 ^(▲)	7,19 ^(▲)	12,07
	Nord orientale	583	91	2,63 ^(▲)	2,23 ^(▲)	1,92 ^(▲)	6,96 ^(▲)	10,00
	Sud-Isole ^(#)	1012	84	1,52 ^(▲)	1,44 ^(▲)	1,16 ^(▲)	3,59 ^(▲)	5,99 ^(▲)
	<i>TOTALE^(#)</i>	2912	88	2,19 ^(▲)	2,03 ^(▲)	1,64 ^(▲)	5,71 ^(▲)	9,98 ^(▲)

(*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(*) Deviazione Standard

(#)[#] La numerosità può non coincidere con quella riportata nelle tabelle della parte B2, in quanto il dato del peso risulta mancante per una femmina adulta del "Sud-Isole"

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: n ≥ 30 per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); n ≥ 160 per P95 e n ≥ 800 per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

Tabella 1.A.p.9(a) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del sottogruppo alimentare "SUCCHI DI FRUTTA E VERDURA" per classi di età e area geografica: FEMMINE del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	5	2,01	4,50	0,00	10,05	10,05
	Nord occidentale	5	2,53	5,45	0,00	12,28	12,28
	Nord orientale	4	12,96	9,69	12,49	25,06	25,06
	Sud-Isole	9	0,03	0,06	0,00	0,17	0,17
	<i>TOTALE</i>	<i>23</i>	<i>3,25</i>	<i>6,61</i>	<i>0,00</i>	<i>14,72</i>	<i>25,06</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	14	2,02	3,36	0,20	10,29	10,29
	Nord occidentale	23	1,97	3,06	0,08	6,44	12,22
	Nord orientale	17	4,20	5,43	2,84	21,33	21,33
	Sud-Isole	45	4,13 ^(▲)	5,51 ^(▲)	2,38 ^(▲)	15,87	22,22
	<i>TOTALE</i>	<i>99</i>	<i>3,34^(▲)</i>	<i>4,81^(▲)</i>	<i>0,46^(▲)</i>	<i>14,81</i>	<i>22,22</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	25	1,20	1,56	0,80	4,76	5,46
	Nord occidentale	29	0,75	1,14	0,07	3,60	3,89
	Nord orientale	25	2,09	2,52	1,18	7,81	8,17
	Sud-Isole	60	1,93 ^(▲)	2,89 ^(▲)	0,09 ^(▲)	8,01	11,11
	<i>TOTALE</i>	<i>139</i>	<i>1,58^(▲)</i>	<i>2,37^(▲)</i>	<i>0,12^(▲)</i>	<i>7,67</i>	<i>9,43</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	248	0,54 ^(▲)	1,08 ^(▲)	0,03 ^(▲)	2,80 ^(▲)	4,75
	Nord occidentale	320	0,52 ^(▲)	1,13 ^(▲)	0,03 ^(▲)	3,33 ^(▲)	4,76
	Nord orientale	237	0,69 ^(▲)	1,56 ^(▲)	0,01 ^(▲)	3,58 ^(▲)	5,67
	Sud-Isole ^(#)	439	0,35 ^(▲)	0,90 ^(▲)	0,01 ^(▲)	2,42 ^(▲)	4,30
	<i>TOTALE^(#)</i>	<i>1244</i>	<i>0,49^(▲)</i>	<i>1,15^(▲)</i>	<i>0,02^(▲)</i>	<i>2,90^(▲)</i>	<i>4,96^(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	64	0,26 ^(▲)	0,57 ^(▲)	0,00 ^(▲)	1,58	2,42
	Nord occidentale	96	0,41 ^(▲)	1,04 ^(▲)	0,00 ^(▲)	2,86	4,89
	Nord orientale	65	0,85 ^(▲)	1,58 ^(▲)	0,04 ^(▲)	4,31	7,61
	Sud-Isole	91	0,19 ^(▲)	0,42 ^(▲)	0,01 ^(▲)	1,11	2,34
	<i>TOTALE</i>	<i>316</i>	<i>0,41^(▲)</i>	<i>1,00^(▲)</i>	<i>0,00^(▲)</i>	<i>2,50^(▲)</i>	<i>4,76</i>
TOTALE	Centro	356	0,62 ^(▲)	1,35 ^(▲)	0,02 ^(▲)	3,33 ^(▲)	6,94
	Nord occidentale	473	0,60 ^(▲)	1,41 ^(▲)	0,02 ^(▲)	3,55 ^(▲)	6,17
	Nord orientale	348	1,13 ^(▲)	2,65 ^(▲)	0,03 ^(▲)	5,47 ^(▲)	14,72
	Sud-Isole ^(#)	644	0,73 ^(▲)	2,12 ^(▲)	0,02 ^(▲)	4,13 ^(▲)	10,11
	<i>TOTALE^(#)</i>	<i>1821</i>	<i>0,75^(▲)</i>	<i>1,96^(▲)</i>	<i>0,02^(▲)</i>	<i>3,77^(▲)</i>	<i>9,33^(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

(#) La numerosità può non coincidere con quella riportata nelle tabelle della parte B2, in quanto il dato del peso risulta mancante per una femmina adulta del "Sud-Isole"

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

Tabella 1.A.p.9(b) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del sottogruppo alimentare "SUCCHI DI FRUTTA E VERDURA" per classi di età e area geografica: MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	6	7,31	12,08	0,00	28,57	28,57
	Nord occidentale	5	4,67	7,75	0,10	17,92	17,92
	Nord orientale	6	4,28	6,66	0,00	13,79	13,79
	Sud-Isole	12	9,65	9,50	8,28	22,11	22,11
	<i>TOTALE</i>	<i>29</i>	<i>7,19</i>	<i>9,14</i>	<i>0,10</i>	<i>22,11</i>	<i>28,57</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	15	3,52	3,39	4,44	9,93	9,93
	Nord occidentale	25	3,86	4,47	2,38	12,60	15,83
	Nord orientale	12	3,39	4,12	1,52	12,50	12,50
	Sud-Isole	42	3,51 ^(▲)	4,50 ^(▲)	2,23 ^(▲)	11,11	20,25
	<i>TOTALE</i>	<i>94</i>	<i>3,59^(▲)</i>	<i>4,22^(▲)</i>	<i>2,51^(▲)</i>	<i>12,30</i>	<i>20,25</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	20	2,27	3,21	0,54	9,88	10,71
	Nord occidentale	32	2,40 ^(▲)	3,97 ^(▲)	0,02 ^(▲)	12,24	12,50
	Nord orientale	19	1,09	1,31	0,21	4,17	4,17
	Sud-Isole	37	1,84 ^(▲)	3,34 ^(▲)	0,10 ^(▲)	11,43	14,63
	<i>TOTALE</i>	<i>108</i>	<i>1,95^(▲)</i>	<i>3,26^(▲)</i>	<i>0,11^(▲)</i>	<i>10,71</i>	<i>12,50</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	187	0,29 ^(▲)	0,68 ^(▲)	0,00 ^(▲)	1,88 ^(▲)	3,25
	Nord occidentale	271	0,46 ^(▲)	0,99 ^(▲)	0,03 ^(▲)	2,50 ^(▲)	4,94
	Nord orientale	213	0,66 ^(▲)	1,38 ^(▲)	0,03 ^(▲)	2,82 ^(▲)	5,49
	Sud-Isole	397	0,26 ^(▲)	0,69 ^(▲)	0,00 ^(▲)	1,78 ^(▲)	3,65
	<i>TOTALE</i>	<i>1068</i>	<i>0,39^(▲)</i>	<i>0,95^(▲)</i>	<i>0,02^(▲)</i>	<i>2,37^(▲)</i>	<i>4,46^(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	39	0,26 ^(▲)	0,82 ^(▲)	0,00 ^(▲)	2,52	4,40
	Nord occidentale	51	0,21 ^(▲)	0,63 ^(▲)	0,00 ^(▲)	2,45	2,70
	Nord orientale	44	0,28 ^(▲)	0,62 ^(▲)	0,00 ^(▲)	1,75	2,78
	Sud-Isole	68	0,10 ^(▲)	0,35 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,14	2,22
	<i>TOTALE</i>	<i>202</i>	<i>0,20^(▲)</i>	<i>0,60^(▲)</i>	<i>0,00^(▲)</i>	<i>1,57^(▲)</i>	<i>2,70</i>
TOTALE	Centro	267	0,77 ^(▲)	2,50 ^(▲)	0,01 ^(▲)	4,51 ^(▲)	10,71
	Nord occidentale	384	0,86 ^(▲)	2,25 ^(▲)	0,03 ^(▲)	4,82 ^(▲)	12,50
	Nord orientale	294	0,82 ^(▲)	1,87 ^(▲)	0,03 ^(▲)	3,46 ^(▲)	12,50
	Sud-Isole	556	0,79 ^(▲)	2,64 ^(▲)	0,02 ^(▲)	4,24 ^(▲)	18,33
	<i>TOTALE</i>	<i>1501</i>	<i>0,81^(▲)</i>	<i>2,38^(▲)</i>	<i>0,02^(▲)</i>	<i>4,24^(▲)</i>	<i>12,50^(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

Tabella 1.A.p.9(c) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del sottogruppo alimentare "SUCCHI DI FRUTTA E VERDURA" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	11	4,90	9,42	0,00	28,57	28,57
	Nord occidentale	10	3,60	6,42	0,05	17,92	17,92
	Nord orientale	10	7,75	8,72	6,02	25,06	25,06
	Sud-Isole	21	5,53	8,57	0,00	20,83	22,11
	<i>TOTALE</i>	<i>52</i>	<i>5,45(▲)</i>	<i>8,29(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>22,11</i>	<i>28,57</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	29	2,80	3,40	0,46	9,93	10,29
	Nord occidentale	48	2,96(▲)	3,94(▲)	1,58(▲)	12,22	15,83
	Nord orientale	29	3,86	4,86	2,84	12,50	21,33
	Sud-Isole	87	3,83(▲)	5,02(▲)	2,38(▲)	14,81	22,22
	<i>TOTALE</i>	<i>193</i>	<i>3,46(▲)</i>	<i>4,52(▲)</i>	<i>2,08(▲)</i>	<i>12,30(▲)</i>	<i>21,33</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	45	1,68(▲)	2,46(▲)	0,80(▲)	5,85	10,71
	Nord occidentale	61	1,62(▲)	3,07(▲)	0,07(▲)	8,90	12,50
	Nord orientale	44	1,66(▲)	2,12(▲)	0,67(▲)	5,56	8,17
	Sud-Isole	97	1,90(▲)	3,05(▲)	0,10(▲)	9,13	14,63
	<i>TOTALE</i>	<i>247</i>	<i>1,75(▲)</i>	<i>2,80(▲)</i>	<i>0,12(▲)</i>	<i>8,17(▲)</i>	<i>12,24</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	435	0,43(▲)	0,94(▲)	0,02(▲)	2,46(▲)	4,17
	Nord occidentale	591	0,49(▲)	1,07(▲)	0,03(▲)	2,72(▲)	4,94
	Nord orientale	450	0,68(▲)	1,47(▲)	0,02(▲)	3,40(▲)	5,67
	Sud-Isole(§)	836	0,30(▲)	0,80(▲)	0,01(▲)	2,00(▲)	3,92(▲)
	<i>TOTALE(§)</i>	<i>2312</i>	<i>0,45(▲)</i>	<i>1,06(▲)</i>	<i>0,02(▲)</i>	<i>2,56(▲)</i>	<i>4,75(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	103	0,26(▲)	0,67(▲)	0,00(▲)	1,58	2,52
	Nord occidentale	147	0,34(▲)	0,92(▲)	0,00(▲)	2,54	4,70
	Nord orientale	109	0,62(▲)	1,31(▲)	0,01(▲)	3,67	5,50
	Sud-Isole	159	0,15(▲)	0,40(▲)	0,01(▲)	1,09	2,22
	<i>TOTALE</i>	<i>518</i>	<i>0,33(▲)</i>	<i>0,87(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>2,30(▲)</i>	<i>4,40</i>
TOTALE	Centro	623	0,68(▲)	1,93(▲)	0,02(▲)	3,36(▲)	9,05
	Nord occidentale	857	0,72(▲)	1,84(▲)	0,02(▲)	3,64(▲)	10,83(▲)
	Nord orientale	642	0,99(▲)	2,33(▲)	0,03(▲)	4,71(▲)	12,50
	Sud-Isole(§)	1200	0,76(▲)	2,37(▲)	0,02(▲)	4,18(▲)	11,86(▲)
	<i>TOTALE(§)</i>	<i>3322</i>	<i>0,78(▲)</i>	<i>2,16(▲)</i>	<i>0,02(▲)</i>	<i>3,92(▲)</i>	<i>10,98(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

(§) La numerosità può non coincidere con quella riportata nelle tabelle della parte B2, in quanto il dato del peso risulta mancante per una femmina adulta del "Sud-Isole"

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

Tabella 1.A.p.10(a) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del sottogruppo alimentare "SUCCHI DI FRUTTA E VERDURA" per classi di età e area geografica: FEMMINE dei sol consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	%(*)	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	1	20	10,05	--	--	--	--
	Nord occidentale	2	40	6,32	8,43	6,32	12,28	12,28
	Nord orientale	4	100	12,96	9,69	12,49	25,06	25,06
	Sud-Isole	2	22	0,14	0,03	0,14	0,17	0,17
	<i>TOTALE</i>	9	39	8,31	8,54	10,05	25,06	25,06
Bambini (3-9 anni)	Centro	8	57	3,54	3,84	2,70	10,29	10,29
	Nord occidentale	12	52	3,78	3,36	3,18	12,22	12,22
	Nord orientale	12	71	5,95	5,61	5,14	21,33	21,33
	Sud-Isole	30	67	6,20(▲)	5,72(▲)	4,85(▲)	18,52	22,22
	<i>TOTALE</i>	62	63	5,34(▲)	5,13(▲)	3,72(▲)	15,87	22,22
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	18	72	1,67	1,62	1,31	5,46	5,46
	Nord occidentale	19	66	1,15	1,24	1,19	3,89	3,89
	Nord orientale	18	72	2,90	2,54	2,47	8,17	8,17
	Sud-Isole	39	65	2,98(▲)	3,13(▲)	1,81(▲)	9,43	11,11
	<i>TOTALE</i>	94	68	2,34(▲)	2,56(▲)	1,52(▲)	7,81	11,11
Adulti (18-64 anni)	Centro	143	58	0,94(▲)	1,28(▲)	0,15(▲)	3,59	5,45
	Nord occidentale	188	59	0,88(▲)	1,36(▲)	0,12(▲)	3,64(▲)	6,17
	Nord orientale	126	53	1,30(▲)	1,95(▲)	0,87(▲)	4,37	9,15
	Sud-Isole(■)	240	55	0,63(▲)	1,14(▲)	0,08(▲)	3,09(▲)	5,13
	<i>TOTALE(■)</i>	697	56	0,88(▲)	1,42(▲)	0,12(▲)	3,64(▲)	5,96
Anziani (65-97 anni)	Centro	28	44	0,60	0,74	0,16	2,38	2,42
	Nord occidentale	39	41	1,01(▲)	1,44(▲)	0,07(▲)	4,70	4,89
	Nord orientale	36	55	1,54(▲)	1,86(▲)	0,89(▲)	5,50	7,61
	Sud-Isole	47	52	0,36(▲)	0,54(▲)	0,06(▲)	1,26	2,34
	<i>TOTALE</i>	150	47	0,86(▲)	1,32(▲)	0,12(▲)	3,70	5,50
TOTALE	Centro	198	56	1,11(▲)	1,66(▲)	0,30(▲)	4,17(▲)	10,05
	Nord occidentale	260	55	1,10(▲)	1,75(▲)	0,13(▲)	4,26(▲)	7,04
	Nord orientale	196	56	2,01(▲)	3,27(▲)	1,02(▲)	7,61(▲)	21,33
	Sud-Isole(■)	358	56	1,32(▲)	2,71(▲)	0,10(▲)	7,02(▲)	14,81
	<i>TOTALE(■)</i>	1012	56	1,35(▲)	2,47(▲)	0,15(▲)	5,56(▲)	11,20(▲)

(*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(*) Deviazione Standard

(■) La numerosità può non coincidere con quella riportata nelle tabelle della parte B2, in quanto il dato del peso risulta mancante per una femmina adulta del "Sud-Isole"

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

Tabella 1.A.p.10(b) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del sottogruppo alimentare "SUCCHI DI FRUTTA E VERDURA" per classi di età e area geografica: MASCHI dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% ^(*)	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	2	33	21,92	9,40	21,92	28,57	28,57
	Nord occidentale	3	60	7,78	9,16	5,33	17,92	17,92
	Nord orientale	2	33	12,85	1,34	12,85	13,79	13,79
	Sud-Isole	8	67	14,47	7,89	18,46	22,11	22,11
	<i>TOTALE</i>	<i>15</i>	<i>52</i>	<i>13,91</i>	<i>8,19</i>	<i>15,28</i>	<i>28,57</i>	<i>28,57</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	11	73	4,80	3,06	5,45	9,93	9,93
	Nord occidentale	19	76	5,08	4,49	3,70	15,83	15,83
	Nord orientale	7	58	5,81	3,83	6,14	12,50	12,50
	Sud-Isole	28	67	5,26	4,60	4,34	12,30	20,25
	<i>TOTALE</i>	<i>65</i>	<i>69</i>	<i>5,19^(▲)</i>	<i>4,18^(▲)</i>	<i>4,62^(▲)</i>	<i>12,50</i>	<i>20,25</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	17	85	2,68	3,33	1,15	10,71	10,71
	Nord occidentale	18	56	4,27	4,50	1,80	12,50	12,50
	Nord orientale	16	84	1,29	1,33	1,13	4,17	4,17
	Sud-Isole	30	81	2,26 ^(▲)	3,58 ^(▲)	0,99 ^(▲)	11,43	14,63
	<i>TOTALE</i>	<i>81</i>	<i>75</i>	<i>2,60^(▲)</i>	<i>3,54^(▲)</i>	<i>1,44^(▲)</i>	<i>10,83</i>	<i>14,63</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	100	53	0,53 ^(▲)	0,86 ^(▲)	0,06 ^(▲)	2,51	3,88
	Nord occidentale	165	61	0,75 ^(▲)	1,18 ^(▲)	0,10 ^(▲)	2,68 ^(▲)	5,00
	Nord orientale	133	62	1,06 ^(▲)	1,62 ^(▲)	0,72 ^(▲)	3,46	6,75
	Sud-Isole	203	51	0,50 ^(▲)	0,90 ^(▲)	0,07 ^(▲)	2,62 ^(▲)	3,92
	<i>TOTALE</i>	<i>601</i>	<i>56</i>	<i>0,70^(▲)</i>	<i>1,18^(▲)</i>	<i>0,09^(▲)</i>	<i>2,71^(▲)</i>	<i>5,00</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	17	44	0,61	1,17	0,06	4,40	4,40
	Nord occidentale	21	41	0,51	0,91	0,05	2,54	2,70
	Nord orientale	20	45	0,62	0,81	0,12	2,37	2,78
	Sud-Isole	34	50	0,20 ^(▲)	0,49 ^(▲)	0,06 ^(▲)	1,81	2,22
	<i>TOTALE</i>	<i>92</i>	<i>46</i>	<i>0,44^(▲)</i>	<i>0,82^(▲)</i>	<i>0,06^(▲)</i>	<i>2,52</i>	<i>4,40</i>
TOTALE	Centro	147	55	1,40 ^(▲)	3,25 ^(▲)	0,08 ^(▲)	5,85	15,28
	Nord occidentale	226	59	1,47 ^(▲)	2,77 ^(▲)	0,12 ^(▲)	7,84 ^(▲)	12,60
	Nord orientale	178	61	1,35 ^(▲)	2,26 ^(▲)	0,74 ^(▲)	5,49 ^(▲)	13,03
	Sud-Isole	303	54	1,45 ^(▲)	3,44 ^(▲)	0,08 ^(▲)	8,17 ^(▲)	18,94
	<i>TOTALE</i>	<i>854</i>	<i>57</i>	<i>1,42^(▲)</i>	<i>3,01^(▲)</i>	<i>0,11^(▲)</i>	<i>6,67^(▲)</i>	<i>15,83^(▲)</i>

(*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: n ≥ 30 per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); n ≥ 160 per P95 e n ≥ 800 per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

Tabella 1.A.p.10(c) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del sottogruppo alimentare "SUCCHI DI FRUTTA E VERDURA" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI dei sol consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% ^(*)	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	3	27	17,97	9,55	15,28	28,57	28,57
	Nord occidentale	5	50	7,20	7,77	5,33	17,92	17,92
	Nord orientale	6	60	12,92	7,53	12,85	25,06	25,06
	Sud-Isole	10	48	11,60	9,21	14,41	22,11	22,11
	<i>TOTALE</i>	<i>24</i>	<i>46</i>	<i>11,81</i>	<i>8,59</i>	<i>12,09</i>	<i>25,06</i>	<i>28,57</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	19	66	4,27	3,37	4,44	10,29	10,29
	Nord occidentale	31	65	4,58 ^(▲)	4,08 ^(▲)	3,33 ^(▲)	12,60	15,83
	Nord orientale	19	66	5,90	4,91	5,80	21,33	21,33
	Sud-Isole	58	67	5,75 ^(▲)	5,19 ^(▲)	4,62 ^(▲)	18,52	22,22
	<i>TOTALE</i>	<i>127</i>	<i>66</i>	<i>5,26^(▲)</i>	<i>4,65^(▲)</i>	<i>4,44^(▲)</i>	<i>14,81</i>	<i>21,33</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	35	78	2,16 ^(▲)	2,61 ^(▲)	1,15 ^(▲)	9,05	10,71
	Nord occidentale	37	61	2,67 ^(▲)	3,58 ^(▲)	1,42 ^(▲)	12,24	12,50
	Nord orientale	34	77	2,14 ^(▲)	2,19 ^(▲)	1,98 ^(▲)	7,81	8,17
	Sud-Isole	69	71	2,67 ^(▲)	3,33 ^(▲)	1,52 ^(▲)	9,43	14,63
	<i>TOTALE</i>	<i>175</i>	<i>71</i>	<i>2,46^(▲)</i>	<i>3,05^(▲)</i>	<i>1,48^(▲)</i>	<i>9,13^(▲)</i>	<i>12,50</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	243	56	0,77 ^(▲)	1,14 ^(▲)	0,10 ^(▲)	2,92 ^(▲)	4,75
	Nord occidentale	353	60	0,82 ^(▲)	1,28 ^(▲)	0,11 ^(▲)	3,42 ^(▲)	5,96
	Nord orientale	259	58	1,18 ^(▲)	1,79 ^(▲)	0,77 ^(▲)	3,89 ^(▲)	9,15
	Sud-Isole ^(#)	443	53	0,57 ^(▲)	1,03 ^(▲)	0,07 ^(▲)	2,84 ^(▲)	4,71
	<i>TOTALE^(#)</i>	<i>1298</i>	<i>56</i>	<i>0,80^(▲)</i>	<i>1,32^(▲)</i>	<i>0,10^(▲)</i>	<i>3,39^(▲)</i>	<i>5,49^(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	45	44	0,60 ^(▲)	0,91 ^(▲)	0,09 ^(▲)	2,42	4,40
	Nord occidentale	60	41	0,83 ^(▲)	1,29 ^(▲)	0,05 ^(▲)	3,65	4,89
	Nord orientale	56	51	1,21 ^(▲)	1,62 ^(▲)	0,75 ^(▲)	4,76	7,61
	Sud-Isole	81	51	0,29 ^(▲)	0,52 ^(▲)	0,06 ^(▲)	1,26	2,34
	<i>TOTALE</i>	<i>242</i>	<i>47</i>	<i>0,70^(▲)</i>	<i>1,17^(▲)</i>	<i>0,08^(▲)</i>	<i>3,17^(▲)</i>	<i>4,89</i>
TOTALE	Centro	345	55	1,23 ^(▲)	2,46 ^(▲)	0,14 ^(▲)	5,06 ^(▲)	10,29
	Nord occidentale	486	57	1,27 ^(▲)	2,29 ^(▲)	0,13 ^(▲)	5,00 ^(▲)	12,28
	Nord orientale	374	58	1,70 ^(▲)	2,85 ^(▲)	0,87 ^(▲)	6,75 ^(▲)	14,72
	Sud-Isole ^(#)	661	55	1,38 ^(▲)	3,06 ^(▲)	0,09 ^(▲)	7,02 ^(▲)	18,52
	<i>TOTALE^(#)</i>	<i>1866</i>	<i>56</i>	<i>1,39^(▲)</i>	<i>2,73^(▲)</i>	<i>0,13^(▲)</i>	<i>5,97^(▲)</i>	<i>14,63^(▲)</i>

(*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(*) Deviazione Standard

(#) La numerosità può non coincidere con quella riportata nelle tabelle della parte B2, in quanto il dato del peso risulta mancante per una femmina adulta del "Sud-Isole"

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: n ≥ 30 per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); n ≥ 160 per P95 e n ≥ 800 per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

Tabella 1.A.p.11(a) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del sottogruppo alimentare "ALTRE BEVANDE" per classi di età e area geografica: FEMMINE del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	5	0,85	1,91	0,00	4,27	4,27
	Nord occidentale	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord orientale	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sud-Isole	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE</i>	23	0,19	0,89	0,00	0,00	4,27
Bambini (3-9 anni)	Centro	14	1,04	1,58	0,00	4,85	4,85
	Nord occidentale	23	0,88	1,97	0,00	3,93	8,00
	Nord orientale	17	2,15	4,94	0,00	20,00	20,00
	Sud-Isole	45	0,84 ^(▲)	1,48 ^(▲)	0,00 ^(▲)	3,95	5,56
	<i>TOTALE</i>	99	1,10 ^(▲)	2,53 ^(▲)	0,00 ^(▲)	5,33	20,00
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	25	0,96	1,41	0,00	3,13	4,76
	Nord occidentale	29	1,78	2,31	1,21	6,18	9,17
	Nord orientale	25	1,82	2,72	1,19	6,67	12,12
	Sud-Isole	60	0,58 ^(▲)	1,16 ^(▲)	0,00 ^(▲)	3,39	5,68
	<i>TOTALE</i>	139	1,12 ^(▲)	1,90 ^(▲)	0,00 ^(▲)	4,76	9,17
Adulti (18-64 anni)	Centro	248	0,40 ^(▲)	1,00 ^(▲)	0,00 ^(▲)	2,58 ^(▲)	5,56
	Nord occidentale	320	0,40 ^(▲)	1,16 ^(▲)	0,00 ^(▲)	2,83 ^(▲)	4,84
	Nord orientale	237	0,51 ^(▲)	1,53 ^(▲)	0,00 ^(▲)	2,67 ^(▲)	7,62
	Sud-Isole ^(#)	439	0,36 ^(▲)	0,84 ^(▲)	0,00 ^(▲)	2,22 ^(▲)	3,73
	<i>TOTALE^(#)</i>	1244	0,41 ^(▲)	1,11 ^(▲)	0,00 ^(▲)	2,48 ^(▲)	4,84 ^(▲)
Anziani (65-97 anni)	Centro	64	0,17 ^(▲)	0,93 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00	5,52
	Nord occidentale	96	0,09 ^(▲)	0,45 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,98	3,64
	Nord orientale	65	0,27 ^(▲)	0,86 ^(▲)	0,00 ^(▲)	1,52	5,00
	Sud-Isole	91	0,04 ^(▲)	0,24 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00	1,92
	<i>TOTALE</i>	316	0,13 ^(▲)	0,64 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,89 ^(▲)	4,07
TOTALE	Centro	356	0,43 ^(▲)	1,08 ^(▲)	0,00 ^(▲)	2,79 ^(▲)	5,52
	Nord occidentale	473	0,44 ^(▲)	1,26 ^(▲)	0,00 ^(▲)	2,89 ^(▲)	7,62
	Nord orientale	348	0,63 ^(▲)	1,90 ^(▲)	0,00 ^(▲)	2,88 ^(▲)	9,87
	Sud-Isole ^(#)	644	0,36 ^(▲)	0,89 ^(▲)	0,00 ^(▲)	2,24 ^(▲)	4,00
	<i>TOTALE^(#)</i>	1821	0,45 ^(▲)	1,27 ^(▲)	0,00 ^(▲)	2,67 ^(▲)	5,56 ^(▲)

(*) Deviazione Standard

(#) La numerosità può non coincidere con quella riportata nelle tabelle della parte B2, in quanto il dato del peso risulta mancante per una femmina adulta del "Sud-Isole"

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

Tabella 1.A.p.11(b) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del sottogruppo alimentare "ALTRE BEVANDE" per classi di età e area geografica: MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord occidentale	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord orientale	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sud-Isole	12	0,30	1,03	0,00	3,56	3,56
	<i>TOTALE</i>	<i>29</i>	<i>0,12</i>	<i>0,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3,56</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	15	0,93	1,58	0,00	4,74	4,74
	Nord occidentale	25	1,54	2,09	0,00	6,11	6,22
	Nord orientale	12	1,61	2,27	0,23	6,32	6,32
	Sud-Isole	42	0,71(▲)	1,67(▲)	0,00(▲)	4,14	6,83
	<i>TOTALE</i>	<i>94</i>	<i>1,08(▲)</i>	<i>1,87(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>6,11</i>	<i>6,83</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	20	1,38	1,67	0,68	4,64	5,90
	Nord occidentale	32	1,87(▲)	1,87(▲)	2,11(▲)	6,00	6,82
	Nord orientale	19	3,30	5,21	1,43	21,33	21,33
	Sud-Isole	37	1,15(▲)	3,05(▲)	0,00(▲)	6,89	16,76
	<i>TOTALE</i>	<i>108</i>	<i>1,78(▲)</i>	<i>3,13(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>6,82</i>	<i>16,76</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	187	0,45(▲)	1,01(▲)	0,00(▲)	2,70(▲)	4,44
	Nord occidentale	271	0,45(▲)	1,18(▲)	0,00(▲)	2,95(▲)	5,37
	Nord orientale	213	0,62(▲)	1,39(▲)	0,00(▲)	2,89(▲)	6,04
	Sud-Isole	397	0,42(▲)	1,38(▲)	0,00(▲)	2,18(▲)	5,41
	<i>TOTALE</i>	<i>1068</i>	<i>0,47(▲)</i>	<i>1,28(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>2,67(▲)</i>	<i>5,37(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	39	0,03(▲)	0,11(▲)	0,00(▲)	0,44	0,56
	Nord occidentale	51	0,02(▲)	0,09(▲)	0,00(▲)	0,00	0,56
	Nord orientale	44	0,08(▲)	0,28(▲)	0,00(▲)	0,65	1,43
	Sud-Isole	68	0,16(▲)	0,54(▲)	0,00(▲)	1,57	3,05
	<i>TOTALE</i>	<i>202</i>	<i>0,08(▲)</i>	<i>0,35(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>0,59(▲)</i>	<i>1,67</i>
TOTALE	Centro	267	0,48(▲)	1,07(▲)	0,00(▲)	3,02(▲)	4,55
	Nord occidentale	384	0,57(▲)	1,34(▲)	0,00(▲)	3,67(▲)	6,22
	Nord orientale	294	0,74(▲)	1,96(▲)	0,00(▲)	3,70(▲)	8,02
	Sud-Isole	556	0,45(▲)	1,51(▲)	0,00(▲)	2,48(▲)	6,83
	<i>TOTALE</i>	<i>1501</i>	<i>0,54(▲)</i>	<i>1,50(▲)</i>	<i>0,00(▲)</i>	<i>3,19(▲)</i>	<i>6,67(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

Tabella 1.A.p.11(c) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del sottogruppo alimentare "ALTRE BEVANDE" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	11	0,39	1,29	0,00	4,27	4,27
	Nord occidentale	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nord orientale	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sud-Isole	21	0,17	0,78	0,00	0,00	3,56
	<i>TOTALE</i>	<i>52</i>	<i>0,15^(▲)</i>	<i>0,76^(▲)</i>	<i>0,00^(▲)</i>	<i>0,00</i>	<i>4,27</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	29	0,98	1,55	0,00	4,74	4,85
	Nord occidentale	48	1,23 ^(▲)	2,04 ^(▲)	0,00 ^(▲)	6,11	8,00
	Nord orientale	29	1,93	4,00	0,00	6,32	20,00
	Sud-Isole	87	0,78 ^(▲)	1,57 ^(▲)	0,00 ^(▲)	4,14	6,83
	<i>TOTALE</i>	<i>193</i>	<i>1,09^(▲)</i>	<i>2,23^(▲)</i>	<i>0,00^(▲)</i>	<i>5,33^(▲)</i>	<i>8,00</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	45	1,14 ^(▲)	1,52 ^(▲)	0,00 ^(▲)	3,38	5,90
	Nord occidentale	61	1,83 ^(▲)	2,07 ^(▲)	1,60 ^(▲)	6,00	9,17
	Nord orientale	44	2,46 ^(▲)	4,01 ^(▲)	1,31 ^(▲)	8,02	21,33
	Sud-Isole	97	0,80 ^(▲)	2,10 ^(▲)	0,00 ^(▲)	4,00	16,76
	<i>TOTALE</i>	<i>247</i>	<i>1,41^(▲)</i>	<i>2,53^(▲)</i>	<i>0,00^(▲)</i>	<i>6,00^(▲)</i>	<i>12,12</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	435	0,42 ^(▲)	1,01 ^(▲)	0,00 ^(▲)	2,58 ^(▲)	4,55
	Nord occidentale	591	0,42 ^(▲)	1,17 ^(▲)	0,00 ^(▲)	2,88 ^(▲)	5,37
	Nord orientale	450	0,56 ^(▲)	1,46 ^(▲)	0,00 ^(▲)	2,75 ^(▲)	7,62
	Sud-Isole ^(#)	836	0,39 ^(▲)	1,13 ^(▲)	0,00 ^(▲)	2,18 ^(▲)	3,92 ^(▲)
	<i>TOTALE^(#)</i>	<i>2312</i>	<i>0,44^(▲)</i>	<i>1,19^(▲)</i>	<i>0,00^(▲)</i>	<i>2,56^(▲)</i>	<i>5,11^(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	103	0,12 ^(▲)	0,74 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00	5,08
	Nord occidentale	147	0,07 ^(▲)	0,37 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,00	1,52
	Nord orientale	109	0,19 ^(▲)	0,69 ^(▲)	0,00 ^(▲)	1,43	4,07
	Sud-Isole	159	0,09 ^(▲)	0,40 ^(▲)	0,00 ^(▲)	0,89	1,92
	<i>TOTALE</i>	<i>518</i>	<i>0,11^(▲)</i>	<i>0,55^(▲)</i>	<i>0,00^(▲)</i>	<i>0,76^(▲)</i>	<i>3,05</i>
TOTALE	Centro	623	0,45 ^(▲)	1,08 ^(▲)	0,00 ^(▲)	2,82 ^(▲)	4,87
	Nord occidentale	857	0,50 ^(▲)	1,30 ^(▲)	0,00 ^(▲)	3,24 ^(▲)	6,22 ^(▲)
	Nord orientale	642	0,68 ^(▲)	1,93 ^(▲)	0,00 ^(▲)	3,39 ^(▲)	8,02
	Sud-Isole ^(#)	1200	0,41 ^(▲)	1,22 ^(▲)	0,00 ^(▲)	2,33 ^(▲)	5,37 ^(▲)
	<i>TOTALE^(#)</i>	<i>3322</i>	<i>0,49^(▲)</i>	<i>1,38^(▲)</i>	<i>0,00^(▲)</i>	<i>2,86^(▲)</i>	<i>6,11^(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

(#) La numerosità può non coincidere con quella riportata nelle tabelle della parte B2, in quanto il dato del peso risulta mancante per una femmina adulta del "Sud-Isole"

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

Tabella 1.A.p.12(a) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del sottogruppo alimentare "ALTRE BEVANDE" per classi di età e area geografica: FEMMINE dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% ^(°)	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	1	20	4,27	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>4,27</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	5	36	2,90	1,17	2,38	4,85	4,85
	Nord occidentale	5	22	4,07	2,25	2,86	8,00	8,00
	Nord orientale	6	35	6,10	7,01	3,90	20,00	20,00
	Sud-Isole	14	31	2,71	1,41	2,22	5,56	5,56
	<i>TOTALE</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>3,64^(▲)</i>	<i>3,47^(▲)</i>	<i>2,71^(▲)</i>	<i>8,00</i>	<i>20,00</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	9	36	2,66	0,93	2,50	4,76	4,76
	Nord occidentale	17	59	3,04	2,29	2,00	9,17	9,17
	Nord orientale	14	56	3,25	2,95	2,21	12,12	12,12
	Sud-Isole	17	28	2,05	1,34	1,74	5,68	5,68
	<i>TOTALE</i>	<i>57</i>	<i>41</i>	<i>2,74^(▲)</i>	<i>2,10^(▲)</i>	<i>2,20^(▲)</i>	<i>6,67</i>	<i>12,12</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	53	21	1,86 ^(▲)	1,42 ^(▲)	1,37 ^(▲)	5,56	6,33
	Nord occidentale	59	18	2,17 ^(▲)	1,88 ^(▲)	1,61 ^(▲)	7,62	9,36
	Nord orientale	50	21	2,41 ^(▲)	2,56 ^(▲)	1,86 ^(▲)	7,62	15,89
	Sud-Isole ^(#)	97	22	1,63 ^(▲)	1,06 ^(▲)	1,27 ^(▲)	3,73	6,28
	<i>TOTALE^(#)</i>	<i>259</i>	<i>21</i>	<i>1,95^(▲)</i>	<i>1,72^(▲)</i>	<i>1,54^(▲)</i>	<i>4,84^(▲)</i>	<i>9,36</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	3	5	3,65	2,86	5,08	5,52	5,52
	Nord occidentale	5	5	1,75	1,08	1,47	3,64	3,64
	Nord orientale	9	14	1,93	1,54	1,48	5,00	5,00
	Sud-Isole	3	3	1,23	0,60	0,89	1,92	1,92
	<i>TOTALE</i>	<i>20</i>	<i>6</i>	<i>2,04</i>	<i>1,64</i>	<i>1,47</i>	<i>5,30</i>	<i>5,52</i>
TOTALE	Centro	71	20	2,14 ^(▲)	1,49 ^(▲)	1,78 ^(▲)	5,52	6,33
	Nord occidentale	86	18	2,43 ^(▲)	2,00 ^(▲)	1,81 ^(▲)	7,62	9,36
	Nord orientale	79	23	2,78 ^(▲)	3,16 ^(▲)	1,90 ^(▲)	9,87	20,00
	Sud-Isole ^(#)	131	20	1,79 ^(▲)	1,17 ^(▲)	1,52 ^(▲)	4,00	5,72
	<i>TOTALE^(#)</i>	<i>367</i>	<i>20</i>	<i>2,22^(▲)</i>	<i>2,03^(▲)</i>	<i>1,74^(▲)</i>	<i>5,56^(▲)</i>	<i>9,87</i>

(°) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(*) Deviazione Standard

(#) La numerosità può non coincidere con quella riportata nelle tabelle della parte B2, in quanto il dato del peso risulta mancante per una femmina adulta del "Sud-Isole"

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

Tabella 1.A.p.12(b) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del sottogruppo alimentare "ALTRE BEVANDE" per classi di età e area geografica: MASCHI dei soli consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% ^(*)	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	1	8	3,56	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>3,56</i>	--	--	--	--
Bambini (3-9 anni)	Centro	5	33	2,78	1,51	2,67	4,74	4,74
	Nord occidentale	12	48	3,21	1,91	2,74	6,22	6,22
	Nord orientale	6	50	3,22	2,25	3,82	6,32	6,32
	Sud-Isole	9	21	3,32	2,13	2,35	6,83	6,83
	<i>TOTALE</i>	<i>32</i>	<i>34</i>	<i>3,17^(▲)</i>	<i>1,90^(▲)</i>	<i>2,86^(▲)</i>	<i>6,67</i>	<i>6,83</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	10	50	2,75	1,28	2,53	5,90	5,90
	Nord occidentale	21	66	2,84	1,58	2,38	6,00	6,82
	Nord orientale	10	53	6,27	5,81	4,94	21,33	21,33
	Sud-Isole	11	30	3,87	4,68	2,16	16,76	16,76
	<i>TOTALE</i>	<i>52</i>	<i>48</i>	<i>3,70^(▲)</i>	<i>3,65^(▲)</i>	<i>2,62^(▲)</i>	<i>8,02</i>	<i>21,33</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	45	24	1,89 ^(▲)	1,25 ^(▲)	1,67 ^(▲)	4,43	4,55
	Nord occidentale	60	22	2,02 ^(▲)	1,76 ^(▲)	1,50 ^(▲)	5,26	9,11
	Nord orientale	67	31	1,97 ^(▲)	1,88 ^(▲)	1,40 ^(▲)	5,57	11,99
	Sud-Isole	86	22	1,92 ^(▲)	2,45 ^(▲)	1,29 ^(▲)	5,11	14,48
	<i>TOTALE</i>	<i>258</i>	<i>24</i>	<i>1,95^(▲)</i>	<i>1,97^(▲)</i>	<i>1,40^(▲)</i>	<i>5,11^(▲)</i>	<i>12,86</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	2	5	0,50	0,08	0,50	0,56	0,56
	Nord occidentale	2	4	0,48	0,12	0,48	0,56	0,56
	Nord orientale	4	9	0,90	0,38	0,80	1,43	1,43
	Sud-Isole	7	10	1,60	0,77	1,57	3,05	3,05
	<i>TOTALE</i>	<i>15</i>	<i>7</i>	<i>1,12</i>	<i>0,73</i>	<i>0,82</i>	<i>3,05</i>	<i>3,05</i>
TOTALE	Centro	62	23	2,06 ^(▲)	1,32 ^(▲)	1,72 ^(▲)	4,44	5,90
	Nord occidentale	95	25	2,32 ^(▲)	1,79 ^(▲)	1,93 ^(▲)	6,11	9,11
	Nord orientale	87	30	2,50 ^(▲)	2,93 ^(▲)	1,43 ^(▲)	7,62	21,33
	Sud-Isole	114	21	2,21 ^(▲)	2,70 ^(▲)	1,41 ^(▲)	6,83	14,48
	<i>TOTALE</i>	<i>358</i>	<i>24</i>	<i>2,28^(▲)</i>	<i>2,35^(▲)</i>	<i>1,53^(▲)</i>	<i>6,22^(▲)</i>	<i>12,95</i>

(*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

I consumi in termini di gruppi e sottogruppi alimentari per aree geografiche (g/kg pc/die)

Tabella 1.A.p.12(c) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/kg di peso corporeo/die) del sottogruppo alimentare "ALTRE BEVANDE" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI dei sol consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	%(*)	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	1	9	4,27	--	4,27	4,27	4,27
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	1	5	3,56	--	3,56	3,56	3,56
	<i>TOTALE</i>	2	4	3,91	0,50	3,91	4,27	4,27
Bambini (3-9 anni)	Centro	10	34	2,84	1,28	2,52	4,85	4,85
	Nord occidentale	17	35	3,46	1,99	2,86	8,00	8,00
	Nord orientale	12	41	4,66	5,19	3,82	20,00	20,00
	Sud-Isole	23	26	2,95	1,71	2,35	6,67	6,83
	<i>TOTALE</i>	62	32	3,40(▲)	2,76(▲)	2,71(▲)	6,67	20,00
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	19	42	2,71	1,10	2,50	5,90	5,90
	Nord occidentale	38	62	2,93(▲)	1,90(▲)	2,36(▲)	6,82	9,17
	Nord orientale	24	55	4,51	4,52	2,63	12,12	21,33
	Sud-Isole	28	29	2,76	3,16	1,74	6,89	16,76
	<i>TOTALE</i>	109	44	3,20(▲)	2,96(▲)	2,34(▲)	7,62	16,76
Adulti (18-64 anni)	Centro	98	23	1,87(▲)	1,34(▲)	1,51(▲)	4,55	6,33
	Nord occidentale	119	20	2,10(▲)	1,81(▲)	1,53(▲)	5,37	9,11
	Nord orientale	117	26	2,16(▲)	2,20(▲)	1,57(▲)	6,04	11,99
	Sud-Isole(■)	183	22	1,76(▲)	1,85(▲)	1,28(▲)	3,90(▲)	12,95
	<i>TOTALE(■)</i>	517	22	1,95(▲)	1,85(▲)	1,45(▲)	4,84(▲)	9,87
Anziani (65-97 anni)	Centro	5	5	2,39	2,66	0,56	5,52	5,52
	Nord occidentale	7	5	1,39	1,08	1,16	3,64	3,64
	Nord orientale	13	12	1,61	1,36	1,38	5,00	5,00
	Sud-Isole	10	6	1,49	0,71	1,56	3,05	3,05
	<i>TOTALE</i>	35	7	1,64(▲)	1,39(▲)	1,38(▲)	5,08	5,52
TOTALE	Centro	133	21	2,10(▲)	1,41(▲)	1,75(▲)	4,87	5,90
	Nord occidentale	181	21	2,37(▲)	1,89(▲)	1,83(▲)	6,18(▲)	9,17
	Nord orientale	166	26	2,64(▲)	3,04(▲)	1,70(▲)	7,62(▲)	20,00
	Sud-Isole(■)	245	20	1,98(▲)	2,04(▲)	1,42(▲)	5,33(▲)	12,95
	<i>TOTALE(■)</i>	725	22	2,25(▲)	2,19(▲)	1,61(▲)	5,90(▲)	12,12

(*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(*) Deviazione Standard

(■) La numerosità può non coincidere con quella riportata nelle tabelle della parte B2, in quanto il dato del peso risulta mancante per una femmina adulta del "Sud-Isole"

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

