

# APPENDICE

## 7.B3

### *PESCE E FRUTTI DI MARE (g/ die)*

### PESCE E FRUTTI DI MARE

**Tabella 1.A.g.1(a)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del gruppo alimentare "PESCE E FRUTTI DI MARE" per classi di età e area geografica: FEMMINE del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	5	29	19	38	49	49
	Nord occidentale	5	13	22	0	50	50
	Nord orientale	4	32	39	24	80	80
	Sud-Isole	9	29	37	0	86	86
	<i>TOTALE</i>	23	26	30	13	86	86
Bambini (3-9 anni)	Centro	14	30	29	30	88	88
	Nord occidentale	23	23	25	17	52	102
	Nord orientale	17	30	29	38	91	91
	Sud-Isole	45	44(▲)	53(▲)	38(▲)	158	211
	<i>TOTALE</i>	99	35(▲)	41(▲)	30(▲)	117	211
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	25	49	60	30	206	206
	Nord occidentale	29	26	44	1	152	170
	Nord orientale	25	30	32	23	89	92
	Sud-Isole	60	69(▲)	63(▲)	58(▲)	183	256
	<i>TOTALE</i>	139	49(▲)	57(▲)	38(▲)	174	256
Adulti (18-64 anni)	Centro	248	42(▲)	46(▲)	33(▲)	133(▲)	181
	Nord occidentale	320	37(▲)	47(▲)	19(▲)	131(▲)	226
	Nord orientale	237	43(▲)	46(▲)	40(▲)	139(▲)	182
	Sud-Isole	440	53(▲)	53(▲)	50(▲)	158(▲)	191
	<i>TOTALE</i>	1245	45(▲)	49(▲)	37(▲)	143(▲)	199(▲)
Anziani (65-97 anni)	Centro	64	44(▲)	40(▲)	50(▲)	119	138
	Nord occidentale	96	29(▲)	36(▲)	7(▲)	107	125
	Nord orientale	65	23(▲)	34(▲)	0(▲)	75	200
	Sud-Isole	91	36(▲)	44(▲)	16(▲)	121	250
	<i>TOTALE</i>	316	33(▲)	40(▲)	17(▲)	110(▲)	138
TOTALE	Centro	356	42(▲)	45(▲)	37(▲)	133(▲)	206
	Nord occidentale	473	34(▲)	44(▲)	15(▲)	124(▲)	215
	Nord orientale	348	38(▲)	43(▲)	28(▲)	119(▲)	182
	Sud-Isole	645	51(▲)	53(▲)	50(▲)	159(▲)	211
	<i>TOTALE</i>	1822	42(▲)	48(▲)	30(▲)	138(▲)	200(▲)

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.g.1(b)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del gruppo alimentare "PESCE E FRUTTI DI MARE" per classi di età e area geografica: MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	6	20	20	18	50	50
	Nord occidentale	5	25	28	13	57	57
	Nord orientale	6	11	17	1	38	38
	Sud-Isole	12	28	45	0	118	118
	<i>TOTALE</i>	29	22	33	0	96	118
Bambini (3-9 anni)	Centro	15	39	30	38	96	96
	Nord occidentale	25	46	50	43	138	192
	Nord orientale	12	26	33	19	110	110
	Sud-Isole	42	55(▲)	54(▲)	52(▲)	133	216
	<i>TOTALE</i>	94	46(▲)	48(▲)	41(▲)	133	216
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	20	43	51	25	148	173
	Nord occidentale	32	37(▲)	53(▲)	11(▲)	151	231
	Nord orientale	19	25	40	0	131	131
	Sud-Isole	37	74(▲)	59(▲)	63(▲)	182	198
	<i>TOTALE</i>	108	48(▲)	56(▲)	37(▲)	165	198
Adulti (18-64 anni)	Centro	187	41(▲)	48(▲)	23(▲)	124(▲)	206
	Nord occidentale	271	43(▲)	56(▲)	23(▲)	149(▲)	261
	Nord orientale	213	45(▲)	52(▲)	31(▲)	151(▲)	203
	Sud-Isole	397	57(▲)	60(▲)	50(▲)	182(▲)	240
	<i>TOTALE</i>	1068	48(▲)	56(▲)	35(▲)	160(▲)	244(▲)
Anziani (65-97 anni)	Centro	39	41(▲)	36(▲)	42(▲)	117	128
	Nord occidentale	51	46(▲)	53(▲)	30(▲)	165	207
	Nord orientale	44	44(▲)	55(▲)	29(▲)	145	269
	Sud-Isole	68	56(▲)	57(▲)	52(▲)	178	201
	<i>TOTALE</i>	202	48(▲)	52(▲)	38(▲)	150(▲)	201
TOTALE	Centro	267	41(▲)	45(▲)	30(▲)	122(▲)	195
	Nord occidentale	384	43(▲)	55(▲)	26(▲)	149(▲)	261
	Nord orientale	294	42(▲)	51(▲)	27(▲)	146(▲)	215
	Sud-Isole	556	57(▲)	59(▲)	50(▲)	180(▲)	224
	<i>TOTALE</i>	1501	48(▲)	54(▲)	35(▲)	155(▲)	225(▲)

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.g.1(c)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del gruppo alimentare "PESCE E FRUTTI DI MARE" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	11	24	19	25	50	50
	Nord occidentale	10	19	24	7	57	57
	Nord orientale	10	19	28	1	80	80
	Sud-Isole	21	29	41	0	96	118
	<i>TOTALE</i>	<i>52</i>	<i>24(▲)</i>	<i>31(▲)</i>	<i>1(▲)</i>	<i>86</i>	<i>118</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	29	35	30	36	88	96
	Nord occidentale	48	35(▲)	41(▲)	28(▲)	114	192
	Nord orientale	29	28	30	27	91	110
	Sud-Isole	87	49(▲)	53(▲)	41(▲)	158	216
	<i>TOTALE</i>	<i>193</i>	<i>40(▲)</i>	<i>45(▲)</i>	<i>38(▲)</i>	<i>132</i>	<i>211</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	45	46(▲)	56(▲)	30(▲)	173	206
	Nord occidentale	61	32(▲)	49(▲)	6(▲)	151	231
	Nord orientale	44	28(▲)	35(▲)	0(▲)	92	131
	Sud-Isole	97	71(▲)	62(▲)	58(▲)	182	256
	<i>TOTALE</i>	<i>247</i>	<i>49(▲)</i>	<i>56(▲)</i>	<i>38(▲)</i>	<i>170(▲)</i>	<i>231</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	435	42(▲)	47(▲)	30(▲)	132(▲)	195
	Nord occidentale	591	39(▲)	51(▲)	19(▲)	144(▲)	244
	Nord orientale	450	44(▲)	49(▲)	38(▲)	144(▲)	194
	Sud-Isole	837	55(▲)	56(▲)	50(▲)	172(▲)	220(▲)
	<i>TOTALE</i>	<i>2313</i>	<i>46(▲)</i>	<i>52(▲)</i>	<i>35(▲)</i>	<i>150(▲)</i>	<i>217(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	103	43(▲)	38(▲)	50(▲)	119	138
	Nord occidentale	147	35(▲)	43(▲)	19(▲)	120	172
	Nord orientale	109	32(▲)	45(▲)	18(▲)	119	200
	Sud-Isole	159	44(▲)	51(▲)	27(▲)	139	201
	<i>TOTALE</i>	<i>518</i>	<i>39(▲)</i>	<i>45(▲)</i>	<i>27(▲)</i>	<i>126(▲)</i>	<i>199</i>
TOTALE	Centro	623	42(▲)	45(▲)	32(▲)	124(▲)	195
	Nord occidentale	857	38(▲)	49(▲)	19(▲)	138(▲)	231(▲)
	Nord orientale	642	40(▲)	47(▲)	27(▲)	136(▲)	194
	Sud-Isole	1201	54(▲)	56(▲)	50(▲)	168(▲)	217(▲)
	<i>TOTALE</i>	<i>3323</i>	<i>45(▲)</i>	<i>51(▲)</i>	<i>32(▲)</i>	<i>147(▲)</i>	<i>214(▲)</i>

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.g.2(a)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del gruppo alimentare "PESCE E FRUTTI DI MARE" per classi di età e area geografica: FEMMINE dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% <sup>(*)</sup>	Media	DS <sup>(*)</sup>	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	4	80	37	12	38	49	49
	Nord occidentale	2	40	32	26	32	50	50
	Nord orientale	2	50	64	22	64	80	80
	Sud-Isole	4	44	65	25	68	86	86
	<i>TOTALE</i>	<i>12</i>	<i>52</i>	<i>50</i>	<i>23</i>	<i>49</i>	<i>86</i>	<i>86</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	11	79	39	27	36	88	88
	Nord occidentale	16	70	33	24	38	102	102
	Nord orientale	10	59	50	19	43	91	91
	Sud-Isole	29	64	68	52	54	182	211
	<i>TOTALE</i>	<i>66</i>	<i>67</i>	<i>52<sup>(▲)</sup></i>	<i>41<sup>(▲)</sup></i>	<i>43<sup>(▲)</sup></i>	<i>158</i>	<i>211</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	21	84	59	61	30	206	206
	Nord occidentale	15	52	51	51	43	170	170
	Nord orientale	14	56	53	23	45	92	92
	Sud-Isole	51	85	81 <sup>(▲)</sup>	61 <sup>(▲)</sup>	63 <sup>(▲)</sup>	184	256
	<i>TOTALE</i>	<i>101</i>	<i>73</i>	<i>68<sup>(▲)</sup></i>	<i>57<sup>(▲)</sup></i>	<i>53<sup>(▲)</sup></i>	<i>182</i>	<i>256</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	170	69	61 <sup>(▲)</sup>	43 <sup>(▲)</sup>	58 <sup>(▲)</sup>	150 <sup>(▲)</sup>	206
	Nord occidentale	208	65	56 <sup>(▲)</sup>	48 <sup>(▲)</sup>	50 <sup>(▲)</sup>	147 <sup>(▲)</sup>	231
	Nord orientale	157	66	66 <sup>(▲)</sup>	42 <sup>(▲)</sup>	58 <sup>(▲)</sup>	146	194
	Sud-Isole	317	72	73 <sup>(▲)</sup>	48 <sup>(▲)</sup>	62 <sup>(▲)</sup>	172 <sup>(▲)</sup>	199
	<i>TOTALE</i>	<i>852</i>	<i>68</i>	<i>65<sup>(▲)</sup></i>	<i>47<sup>(▲)</sup></i>	<i>58<sup>(▲)</sup></i>	<i>157<sup>(▲)</sup></i>	<i>214<sup>(▲)</sup></i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	46	72	62 <sup>(▲)</sup>	34 <sup>(▲)</sup>	57 <sup>(▲)</sup>	120	138
	Nord occidentale	51	53	55 <sup>(▲)</sup>	33 <sup>(▲)</sup>	50 <sup>(▲)</sup>	110	125
	Nord orientale	30	46	50 <sup>(▲)</sup>	35 <sup>(▲)</sup>	50 <sup>(▲)</sup>	83	200
	Sud-Isole	58	64	56 <sup>(▲)</sup>	44 <sup>(▲)</sup>	52 <sup>(▲)</sup>	131	250
	<i>TOTALE</i>	<i>185</i>	<i>59</i>	<i>56<sup>(▲)</sup></i>	<i>37<sup>(▲)</sup></i>	<i>50<sup>(▲)</sup></i>	<i>121<sup>(▲)</sup></i>	<i>200</i>
TOTALE	Centro	252	71	60 <sup>(▲)</sup>	43 <sup>(▲)</sup>	54 <sup>(▲)</sup>	143 <sup>(▲)</sup>	206
	Nord occidentale	292	62	54 <sup>(▲)</sup>	45 <sup>(▲)</sup>	50 <sup>(▲)</sup>	137 <sup>(▲)</sup>	231
	Nord orientale	213	61	62 <sup>(▲)</sup>	40 <sup>(▲)</sup>	56 <sup>(▲)</sup>	144 <sup>(▲)</sup>	194
	Sud-Isole	459	71	72 <sup>(▲)</sup>	50 <sup>(▲)</sup>	62 <sup>(▲)</sup>	174 <sup>(▲)</sup>	225
	<i>TOTALE</i>	<i>1216</i>	<i>67</i>	<i>63<sup>(▲)</sup></i>	<i>46<sup>(▲)</sup></i>	<i>56<sup>(▲)</sup></i>	<i>157<sup>(▲)</sup></i>	<i>213<sup>(▲)</sup></i>

(<sup>o</sup>) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: n ≥ 30 per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); n ≥ 160 per P95 e n ≥ 800 per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.g.2(b)** - *Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del gruppo alimentare "PESCE E FRUTTI DI MARE" per classi di età e area geografica: MASCHI dei soli consumatori*

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% <sup>(*)</sup>	Media	DS <sup>(*)</sup>	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	4	67	30	17	30	50	50
	Nord occidentale	3	60	41	24	52	57	57
	Nord orientale	3	50	22	19	27	38	38
	Sud-Isole	4	33	85	29	86	118	118
	<i>TOTALE</i>	<i>14</i>	<i>48</i>	<i>46</i>	<i>33</i>	<i>44</i>	<i>118</i>	<i>118</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	11	73	53	22	55	96	96
	Nord occidentale	17	68	68	47	57	192	192
	Nord orientale	7	58	45	32	40	110	110
	Sud-Isole	31	74	74 <sup>(▲)</sup>	49 <sup>(▲)</sup>	58 <sup>(▲)</sup>	155	216
	<i>TOTALE</i>	<i>66</i>	<i>70</i>	<i>66<sup>(▲)</sup></i>	<i>44<sup>(▲)</sup></i>	<i>57<sup>(▲)</sup></i>	<i>138</i>	<i>216</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	13	65	66	49	71	173	173
	Nord occidentale	18	56	65	56	50	231	231
	Nord orientale	7	37	67	38	50	131	131
	Sud-Isole	32	86	85 <sup>(▲)</sup>	55 <sup>(▲)</sup>	75 <sup>(▲)</sup>	182	198
	<i>TOTALE</i>	<i>70</i>	<i>65</i>	<i>75<sup>(▲)</sup></i>	<i>53<sup>(▲)</sup></i>	<i>60<sup>(▲)</sup></i>	<i>174</i>	<i>231</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	132	71	59 <sup>(▲)</sup>	48 <sup>(▲)</sup>	57 <sup>(▲)</sup>	134	206
	Nord occidentale	179	66	65 <sup>(▲)</sup>	58 <sup>(▲)</sup>	50 <sup>(▲)</sup>	192 <sup>(▲)</sup>	280
	Nord orientale	144	68	67 <sup>(▲)</sup>	50 <sup>(▲)</sup>	58 <sup>(▲)</sup>	167	215
	Sud-Isole	295	74	77 <sup>(▲)</sup>	57 <sup>(▲)</sup>	63 <sup>(▲)</sup>	195 <sup>(▲)</sup>	252
	<i>TOTALE</i>	<i>750</i>	<i>70</i>	<i>69<sup>(▲)</sup></i>	<i>55<sup>(▲)</sup></i>	<i>58<sup>(▲)</sup></i>	<i>182<sup>(▲)</sup></i>	<i>255</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	30	77	53 <sup>(▲)</sup>	32 <sup>(▲)</sup>	50 <sup>(▲)</sup>	117	128
	Nord occidentale	35	69	68 <sup>(▲)</sup>	51 <sup>(▲)</sup>	56 <sup>(▲)</sup>	172	207
	Nord orientale	31	70	63 <sup>(▲)</sup>	57 <sup>(▲)</sup>	43 <sup>(▲)</sup>	155	269
	Sud-Isole	48	71	79 <sup>(▲)</sup>	53 <sup>(▲)</sup>	67 <sup>(▲)</sup>	183	201
	<i>TOTALE</i>	<i>144</i>	<i>71</i>	<i>67<sup>(▲)</sup></i>	<i>50<sup>(▲)</sup></i>	<i>57<sup>(▲)</sup></i>	<i>165</i>	<i>207</i>
TOTALE	Centro	190	71	57 <sup>(▲)</sup>	44 <sup>(▲)</sup>	55 <sup>(▲)</sup>	128 <sup>(▲)</sup>	206
	Nord occidentale	252	66	65 <sup>(▲)</sup>	55 <sup>(▲)</sup>	50 <sup>(▲)</sup>	172 <sup>(▲)</sup>	261
	Nord orientale	192	65	65 <sup>(▲)</sup>	50 <sup>(▲)</sup>	56 <sup>(▲)</sup>	160 <sup>(▲)</sup>	255
	Sud-Isole	410	74	78 <sup>(▲)</sup>	55 <sup>(▲)</sup>	66 <sup>(▲)</sup>	187 <sup>(▲)</sup>	234
	<i>TOTALE</i>	<i>1044</i>	<i>70</i>	<i>69<sup>(▲)</sup></i>	<i>53<sup>(▲)</sup></i>	<i>58<sup>(▲)</sup></i>	<i>179<sup>(▲)</sup></i>	<i>252<sup>(▲)</sup></i>

(\*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: n ≥ 30 per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); n ≥ 160 per P95 e n ≥ 800 per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.g.2(c)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del gruppo alimentare "PESCE E FRUTTI DI MARE" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% <sup>(*)</sup>	Media	DS <sup>(*)</sup>	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	8	73	33	14	37	50	50
	Nord occidentale	5	50	37	22	50	57	57
	Nord orientale	5	50	39	29	38	80	80
	Sud-Isole	8	38	75	27	81	118	118
	<i>TOTALE</i>	<i>26</i>	<i>50</i>	<i>48</i>	<i>28</i>	<i>49</i>	<i>96</i>	<i>118</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	22	76	46	25	41	88	96
	Nord occidentale	33	69	51 <sup>(▲)</sup>	41 <sup>(▲)</sup>	41 <sup>(▲)</sup>	138	192
	Nord orientale	17	59	48	24	42	110	110
	Sud-Isole	60	69	71 <sup>(▲)</sup>	50 <sup>(▲)</sup>	57 <sup>(▲)</sup>	170	216
	<i>TOTALE</i>	<i>132</i>	<i>68</i>	<i>59<sup>(▲)</sup></i>	<i>43<sup>(▲)</sup></i>	<i>51<sup>(▲)</sup></i>	<i>155</i>	<i>211</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	34	76	62 <sup>(▲)</sup>	56 <sup>(▲)</sup>	40 <sup>(▲)</sup>	206	206
	Nord occidentale	33	54	59 <sup>(▲)</sup>	53 <sup>(▲)</sup>	50 <sup>(▲)</sup>	170	231
	Nord orientale	21	48	58	29	47	109	131
	Sud-Isole	83	86	83 <sup>(▲)</sup>	59 <sup>(▲)</sup>	65 <sup>(▲)</sup>	182	256
	<i>TOTALE</i>	<i>171</i>	<i>69</i>	<i>71<sup>(▲)</sup></i>	<i>55<sup>(▲)</sup></i>	<i>57<sup>(▲)</sup></i>	<i>182<sup>(▲)</sup></i>	<i>256</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	302	69	60 <sup>(▲)</sup>	45 <sup>(▲)</sup>	57 <sup>(▲)</sup>	143 <sup>(▲)</sup>	206
	Nord occidentale	387	65	60 <sup>(▲)</sup>	53 <sup>(▲)</sup>	50 <sup>(▲)</sup>	159 <sup>(▲)</sup>	261
	Nord orientale	301	67	66 <sup>(▲)</sup>	46 <sup>(▲)</sup>	58 <sup>(▲)</sup>	157 <sup>(▲)</sup>	203
	Sud-Isole	612	73	75 <sup>(▲)</sup>	53 <sup>(▲)</sup>	63 <sup>(▲)</sup>	182 <sup>(▲)</sup>	225
	<i>TOTALE</i>	<i>1602</i>	<i>69</i>	<i>67<sup>(▲)</sup></i>	<i>51<sup>(▲)</sup></i>	<i>58<sup>(▲)</sup></i>	<i>167<sup>(▲)</sup></i>	<i>231<sup>(▲)</sup></i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	76	74	58 <sup>(▲)</sup>	33 <sup>(▲)</sup>	54 <sup>(▲)</sup>	120	138
	Nord occidentale	86	59	60 <sup>(▲)</sup>	41 <sup>(▲)</sup>	50 <sup>(▲)</sup>	128	207
	Nord orientale	61	56	57 <sup>(▲)</sup>	47 <sup>(▲)</sup>	50 <sup>(▲)</sup>	145	269
	Sud-Isole	106	67	66 <sup>(▲)</sup>	49 <sup>(▲)</sup>	58 <sup>(▲)</sup>	155	201
	<i>TOTALE</i>	<i>329</i>	<i>64</i>	<i>61<sup>(▲)</sup></i>	<i>43<sup>(▲)</sup></i>	<i>50<sup>(▲)</sup></i>	<i>139<sup>(▲)</sup></i>	<i>201</i>
TOTALE	Centro	442	71	59 <sup>(▲)</sup>	43 <sup>(▲)</sup>	55 <sup>(▲)</sup>	138 <sup>(▲)</sup>	206
	Nord occidentale	544	63	59 <sup>(▲)</sup>	50 <sup>(▲)</sup>	50 <sup>(▲)</sup>	152 <sup>(▲)</sup>	244
	Nord orientale	405	63	63 <sup>(▲)</sup>	45 <sup>(▲)</sup>	56 <sup>(▲)</sup>	151 <sup>(▲)</sup>	203
	Sud-Isole	869	72	75 <sup>(▲)</sup>	53 <sup>(▲)</sup>	63 <sup>(▲)</sup>	182 <sup>(▲)</sup>	234 <sup>(▲)</sup>
	<i>TOTALE</i>	<i>2260</i>	<i>68</i>	<i>66<sup>(▲)</sup></i>	<i>49<sup>(▲)</sup></i>	<i>57<sup>(▲)</sup></i>	<i>165<sup>(▲)</sup></i>	<i>231<sup>(▲)</sup></i>

(\*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.g.3(a)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "PESCE E FRUTTI DI MARE, FRESCHI E SURGELATI" per classi di età e area geografica: FEMMINE del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	5	29	19	38	49	49
	Nord occidentale	5	10	22	0	50	50
	Nord orientale	4	25	30	22	57	57
	Sud-Isole	9	29	37	0	86	86
	<i>TOTALE</i>	<i>23</i>	<i>24</i>	<i>29</i>	<i>0</i>	<i>86</i>	<i>86</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	14	26	27	30	88	88
	Nord occidentale	23	18	23	0	51	79
	Nord orientale	17	27	27	38	91	91
	Sud-Isole	45	41(▲)	52(▲)	38(▲)	158	205
	<i>TOTALE</i>	<i>99</i>	<i>31(▲)</i>	<i>40(▲)</i>	<i>30(▲)</i>	<i>103</i>	<i>205</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	25	44	61	30	206	206
	Nord occidentale	29	24	43	0	150	166
	Nord orientale	25	23	32	0	89	91
	Sud-Isole	60	63(▲)	65(▲)	52(▲)	178	256
	<i>TOTALE</i>	<i>139</i>	<i>44(▲)</i>	<i>58(▲)</i>	<i>27(▲)</i>	<i>170</i>	<i>256</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	248	35(▲)	44(▲)	3(▲)	127(▲)	165
	Nord occidentale	320	30(▲)	45(▲)	0(▲)	127(▲)	203
	Nord orientale	237	36(▲)	43(▲)	27(▲)	135(▲)	157
	Sud-Isole	440	48(▲)	52(▲)	50(▲)	155(▲)	183
	<i>TOTALE</i>	<i>1245</i>	<i>39(▲)</i>	<i>48(▲)</i>	<i>15(▲)</i>	<i>137(▲)</i>	<i>185(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	64	38(▲)	38(▲)	48(▲)	115	136
	Nord occidentale	96	26(▲)	36(▲)	0(▲)	104	125
	Nord orientale	65	19(▲)	34(▲)	0(▲)	66	200
	Sud-Isole	91	32(▲)	41(▲)	1(▲)	113	196
	<i>TOTALE</i>	<i>316</i>	<i>29(▲)</i>	<i>38(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>108(▲)</i>	<i>132</i>
TOTALE	Centro	356	35(▲)	44(▲)	18(▲)	125(▲)	206
	Nord occidentale	473	28(▲)	42(▲)	0(▲)	116(▲)	200
	Nord orientale	348	32(▲)	40(▲)	2(▲)	109(▲)	157
	Sud-Isole	645	47(▲)	52(▲)	44(▲)	159(▲)	199
	<i>TOTALE</i>	<i>1822</i>	<i>37(▲)</i>	<i>47(▲)</i>	<i>13(▲)</i>	<i>134(▲)</i>	<i>196(▲)</i>

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.



**Tabella 1.A.g.3(b)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "PESCE E FRUTTI DI MARE, FRESCHI E SURGELATI" per classi di età e area geografica: MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS <sup>(*)</sup>	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	6	20	20	18	50	50
	Nord occidentale	5	23	26	13	57	57
	Nord orientale	6	11	17	0	38	38
	Sud-Isole	12	22	35	0	96	96
	<i>TOTALE</i>	<i>29</i>	<i>20</i>	<i>27</i>	<i>0</i>	<i>74</i>	<i>96</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	15	38	29	38	82	82
	Nord occidentale	25	45	48	43	115	190
	Nord orientale	12	23	28	13	83	83
	Sud-Isole	42	51 <sup>(▲)</sup>	53 <sup>(▲)</sup>	52 <sup>(▲)</sup>	132	216
	<i>TOTALE</i>	<i>94</i>	<i>44<sup>(▲)</sup></i>	<i>46<sup>(▲)</sup></i>	<i>41<sup>(▲)</sup></i>	<i>131</i>	<i>216</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	20	40	48	16	134	154
	Nord occidentale	32	33 <sup>(▲)</sup>	53 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	151	230
	Nord orientale	19	18	35	0	109	109
	Sud-Isole	37	68 <sup>(▲)</sup>	61 <sup>(▲)</sup>	59 <sup>(▲)</sup>	182	198
	<i>TOTALE</i>	<i>108</i>	<i>44<sup>(▲)</sup></i>	<i>55<sup>(▲)</sup></i>	<i>11<sup>(▲)</sup></i>	<i>154</i>	<i>198</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	187	34 <sup>(▲)</sup>	46 <sup>(▲)</sup>	1 <sup>(▲)</sup>	122 <sup>(▲)</sup>	206
	Nord occidentale	271	35 <sup>(▲)</sup>	54 <sup>(▲)</sup>	1 <sup>(▲)</sup>	144 <sup>(▲)</sup>	252
	Nord orientale	213	38 <sup>(▲)</sup>	50 <sup>(▲)</sup>	4 <sup>(▲)</sup>	137 <sup>(▲)</sup>	192
	Sud-Isole	397	50 <sup>(▲)</sup>	60 <sup>(▲)</sup>	46 <sup>(▲)</sup>	174 <sup>(▲)</sup>	227
	<i>TOTALE</i>	<i>1068</i>	<i>41<sup>(▲)</sup></i>	<i>54<sup>(▲)</sup></i>	<i>6<sup>(▲)</sup></i>	<i>152<sup>(▲)</sup></i>	<i>227<sup>(▲)</sup></i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	39	33 <sup>(▲)</sup>	33 <sup>(▲)</sup>	32 <sup>(▲)</sup>	97	111
	Nord occidentale	51	43 <sup>(▲)</sup>	52 <sup>(▲)</sup>	29 <sup>(▲)</sup>	147	200
	Nord orientale	44	36 <sup>(▲)</sup>	56 <sup>(▲)</sup>	2 <sup>(▲)</sup>	137	269
	Sud-Isole	68	51 <sup>(▲)</sup>	54 <sup>(▲)</sup>	45 <sup>(▲)</sup>	150	201
	<i>TOTALE</i>	<i>202</i>	<i>42<sup>(▲)</sup></i>	<i>51<sup>(▲)</sup></i>	<i>30<sup>(▲)</sup></i>	<i>142<sup>(▲)</sup></i>	<i>200</i>
TOTALE	Centro	267	34 <sup>(▲)</sup>	43 <sup>(▲)</sup>	3 <sup>(▲)</sup>	115 <sup>(▲)</sup>	185
	Nord occidentale	384	37 <sup>(▲)</sup>	53 <sup>(▲)</sup>	2 <sup>(▲)</sup>	145 <sup>(▲)</sup>	230
	Nord orientale	294	35 <sup>(▲)</sup>	49 <sup>(▲)</sup>	2 <sup>(▲)</sup>	127 <sup>(▲)</sup>	215
	Sud-Isole	556	51 <sup>(▲)</sup>	58 <sup>(▲)</sup>	50 <sup>(▲)</sup>	172 <sup>(▲)</sup>	221
	<i>TOTALE</i>	<i>1501</i>	<i>41<sup>(▲)</sup></i>	<i>53<sup>(▲)</sup></i>	<i>13<sup>(▲)</sup></i>	<i>148<sup>(▲)</sup></i>	<i>220<sup>(▲)</sup></i>

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.g.3(c)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "PESCE E FRUTTI DI MARE, FRESCHI E SURGELATI" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	11	24	19	25	50	50
	Nord occidentale	10	16	24	0	57	57
	Nord orientale	10	17	23	0	57	57
	Sud-Isole	21	25	35	0	86	96
	<i>TOTALE</i>	<i>52</i>	<i>22(▲)</i>	<i>28(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>86</i>	<i>96</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	29	32	28	36	82	88
	Nord occidentale	48	32(▲)	40(▲)	19(▲)	114	190
	Nord orientale	29	25	27	27	83	91
	Sud-Isole	87	46(▲)	52(▲)	41(▲)	155	216
	<i>TOTALE</i>	<i>193</i>	<i>37(▲)</i>	<i>44(▲)</i>	<i>38(▲)</i>	<i>126(▲)</i>	<i>205</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	45	42(▲)	55(▲)	30(▲)	158	206
	Nord occidentale	61	29(▲)	48(▲)	0(▲)	150	230
	Nord orientale	44	21(▲)	33(▲)	0(▲)	91	109
	Sud-Isole	97	65(▲)	63(▲)	57(▲)	182	256
	<i>TOTALE</i>	<i>247</i>	<i>44(▲)</i>	<i>57(▲)</i>	<i>23(▲)</i>	<i>165(▲)</i>	<i>230</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	435	34(▲)	45(▲)	1(▲)	125(▲)	185
	Nord occidentale	591	33(▲)	49(▲)	0(▲)	135(▲)	230
	Nord orientale	450	37(▲)	46(▲)	10(▲)	135(▲)	185
	Sud-Isole	837	49(▲)	56(▲)	50(▲)	165(▲)	218(▲)
	<i>TOTALE</i>	<i>2313</i>	<i>40(▲)</i>	<i>51(▲)</i>	<i>11(▲)</i>	<i>144(▲)</i>	<i>209(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	103	36(▲)	36(▲)	42(▲)	113	119
	Nord occidentale	147	32(▲)	43(▲)	0(▲)	120	165
	Nord orientale	109	26(▲)	45(▲)	0(▲)	113	200
	Sud-Isole	159	40(▲)	48(▲)	26(▲)	135	196
	<i>TOTALE</i>	<i>518</i>	<i>34(▲)</i>	<i>44(▲)</i>	<i>2(▲)</i>	<i>123(▲)</i>	<i>183</i>
TOTALE	Centro	623	35(▲)	44(▲)	13(▲)	119(▲)	185
	Nord occidentale	857	32(▲)	48(▲)	0(▲)	130(▲)	214(▲)
	Nord orientale	642	33(▲)	45(▲)	2(▲)	117(▲)	185
	Sud-Isole	1201	49(▲)	55(▲)	46(▲)	165(▲)	212(▲)
	<i>TOTALE</i>	<i>3323</i>	<i>39(▲)</i>	<i>50(▲)</i>	<i>13(▲)</i>	<i>141(▲)</i>	<i>206(▲)</i>

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.g.4(a)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "PESCE E FRUTTI DI MARE, FRESCHI E SURGELATI" per classi di età e area geografica: FEMMINE dei soli consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% <sup>(*)</sup>	Media	DS <sup>(*)</sup>	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	4	80	37	12	38	49	49
	Nord occidentale	1	20	50	--	--	--	--
	Nord orientale	2	50	51	9	51	57	57
	Sud-Isole	4	44	65	25	68	86	86
	<i>TOTALE</i>	<i>11</i>	<i>48</i>	<i>51</i>	<i>20</i>	<i>49</i>	<i>86</i>	<i>86</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	9	64	40	23	38	88	88
	Nord occidentale	10	43	41	16	38	79	79
	Nord orientale	10	59	46	19	43	91	91
	Sud-Isole	24	53	76	48	54	179	205
	<i>TOTALE</i>	<i>53</i>	<i>54</i>	<i>58<sup>(*)</sup></i>	<i>39<sup>(*)</sup></i>	<i>43<sup>(*)</sup></i>	<i>158</i>	<i>205</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	17	68	65	65	38	206	206
	Nord occidentale	11	38	63	50	50	166	166
	Nord orientale	11	44	53	26	50	91	91
	Sud-Isole	42	70	90 <sup>(*)</sup>	60 <sup>(*)</sup>	65 <sup>(*)</sup>	182	256
	<i>TOTALE</i>	<i>81</i>	<i>58</i>	<i>76<sup>(*)</sup></i>	<i>58<sup>(*)</sup></i>	<i>58<sup>(*)</sup></i>	<i>182</i>	<i>256</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	133	54	64 <sup>(*)</sup>	42 <sup>(*)</sup>	58 <sup>(*)</sup>	151	206
	Nord occidentale	145	45	66 <sup>(*)</sup>	46 <sup>(*)</sup>	57 <sup>(*)</sup>	150	214
	Nord orientale	137	58	63 <sup>(*)</sup>	39 <sup>(*)</sup>	58 <sup>(*)</sup>	146	160
	Sud-Isole	265	60	80 <sup>(*)</sup>	44 <sup>(*)</sup>	65 <sup>(*)</sup>	172 <sup>(*)</sup>	212
	<i>TOTALE</i>	<i>680</i>	<i>55</i>	<i>71<sup>(*)</sup></i>	<i>44<sup>(*)</sup></i>	<i>58<sup>(*)</sup></i>	<i>158<sup>(*)</sup></i>	<i>209</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	40	63	60 <sup>(*)</sup>	30 <sup>(*)</sup>	50 <sup>(*)</sup>	119	136
	Nord occidentale	42	44	59 <sup>(*)</sup>	30 <sup>(*)</sup>	50 <sup>(*)</sup>	108	125
	Nord orientale	24	37	51	39	50	76	200
	Sud-Isole	46	51	63 <sup>(*)</sup>	37 <sup>(*)</sup>	56 <sup>(*)</sup>	126	196
	<i>TOTALE</i>	<i>152</i>	<i>48</i>	<i>59<sup>(*)</sup></i>	<i>34<sup>(*)</sup></i>	<i>50<sup>(*)</sup></i>	<i>121</i>	<i>196</i>
TOTALE	Centro	203	57	62 <sup>(*)</sup>	41 <sup>(*)</sup>	57 <sup>(*)</sup>	150 <sup>(*)</sup>	206
	Nord occidentale	209	44	64 <sup>(*)</sup>	42 <sup>(*)</sup>	51 <sup>(*)</sup>	147 <sup>(*)</sup>	209
	Nord orientale	184	53	60 <sup>(*)</sup>	38 <sup>(*)</sup>	56 <sup>(*)</sup>	140 <sup>(*)</sup>	200
	Sud-Isole	381	59	79 <sup>(*)</sup>	46 <sup>(*)</sup>	63 <sup>(*)</sup>	174 <sup>(*)</sup>	218
	<i>TOTALE</i>	<i>977</i>	<i>54</i>	<i>69<sup>(*)</sup></i>	<i>43<sup>(*)</sup></i>	<i>58<sup>(*)</sup></i>	<i>159<sup>(*)</sup></i>	<i>206<sup>(*)</sup></i>

(\*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (\*) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.g.4(b)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "PESCE E FRUTTI DI MARE, FRESCHI E SURGELATI" per classi di età e area geografica: MASCHI dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% <sup>(*)</sup>	Media	DS <sup>(*)</sup>	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	4	67	30	17	30	50	50
	Nord occidentale	3	60	38	22	43	57	57
	Nord orientale	2	33	32	8	32	38	38
	Sud-Isole	4	33	67	22	62	96	96
	<i>TOTALE</i>	<i>13</i>	<i>45</i>	<i>44</i>	<i>24</i>	<i>43</i>	<i>96</i>	<i>96</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	11	73	52	19	55	82	82
	Nord occidentale	17	68	66	45	57	190	190
	Nord orientale	6	50	46	21	40	83	83
	Sud-Isole	27	64	79	45	58	155	216
	<i>TOTALE</i>	<i>61</i>	<i>65</i>	<i>68<sup>(*)</sup></i>	<i>41<sup>(*)</sup></i>	<i>57<sup>(*)</sup></i>	<i>132</i>	<i>216</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	12	60	67	46	71	154	154
	Nord occidentale	15	47	71	58	57	230	230
	Nord orientale	5	26	69	33	50	109	109
	Sud-Isole	25	68	101	47	102	182	198
	<i>TOTALE</i>	<i>57</i>	<i>53</i>	<i>83<sup>(*)</sup></i>	<i>50<sup>(*)</sup></i>	<i>69<sup>(*)</sup></i>	<i>182</i>	<i>230</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	98	52	65 <sup>(*)</sup>	45 <sup>(*)</sup>	62 <sup>(*)</sup>	146	234
	Nord occidentale	136	50	71 <sup>(*)</sup>	58 <sup>(*)</sup>	58 <sup>(*)</sup>	195	278
	Nord orientale	117	55	68 <sup>(*)</sup>	49 <sup>(*)</sup>	58 <sup>(*)</sup>	181	215
	Sud-Isole	236	59	85 <sup>(*)</sup>	55 <sup>(*)</sup>	71 <sup>(*)</sup>	199 <sup>(*)</sup>	243
	<i>TOTALE</i>	<i>587</i>	<i>55</i>	<i>75<sup>(*)</sup></i>	<i>54<sup>(*)</sup></i>	<i>63<sup>(*)</sup></i>	<i>185<sup>(*)</sup></i>	<i>252</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	25	64	52	27	50	97	111
	Nord occidentale	29	57	75	49	63	165	200
	Nord orientale	24	55	67	62	56	145	269
	Sud-Isole	43	63	80 <sup>(*)</sup>	48 <sup>(*)</sup>	67 <sup>(*)</sup>	172	201
	<i>TOTALE</i>	<i>121</i>	<i>60</i>	<i>71<sup>(*)</sup></i>	<i>48<sup>(*)</sup></i>	<i>58<sup>(*)</sup></i>	<i>150</i>	<i>201</i>
TOTALE	Centro	150	56	61 <sup>(*)</sup>	41 <sup>(*)</sup>	57 <sup>(*)</sup>	134	206
	Nord occidentale	200	52	70 <sup>(*)</sup>	55 <sup>(*)</sup>	58 <sup>(*)</sup>	193 <sup>(*)</sup>	265
	Nord orientale	154	52	67 <sup>(*)</sup>	50 <sup>(*)</sup>	57 <sup>(*)</sup>	160	255
	Sud-Isole	335	60	85 <sup>(*)</sup>	53 <sup>(*)</sup>	70 <sup>(*)</sup>	193 <sup>(*)</sup>	227
	<i>TOTALE</i>	<i>839</i>	<i>56</i>	<i>74<sup>(*)</sup></i>	<i>52<sup>(*)</sup></i>	<i>62<sup>(*)</sup></i>	<i>182<sup>(*)</sup></i>	<i>234<sup>(*)</sup></i>

(\*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (\*) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.g.4(c)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "PESCE E FRUTTI DI MARE, FRESCHI E SURGELATI" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI dei sol  
consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	%(*)	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	8	73	33	14	37	50	50
	Nord occidentale	4	40	41	19	46	57	57
	Nord orientale	4	40	41	13	41	57	57
	Sud-Isole	8	38	66	22	62	96	96
	<i>TOTALE</i>	<i>24</i>	<i>46</i>	<i>47</i>	<i>22</i>	<i>47</i>	<i>86</i>	<i>96</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	20	69	47	21	43	85	88
	Nord occidentale	27	56	57	39	43	115	190
	Nord orientale	16	55	46	19	42	91	91
	Sud-Isole	51	59	78(▲)	46(▲)	58(▲)	179	216
	<i>TOTALE</i>	<i>114</i>	<i>59</i>	<i>63(▲)</i>	<i>40(▲)</i>	<i>51(▲)</i>	<i>155</i>	<i>205</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	29	64	66	57	54	206	206
	Nord occidentale	26	43	68	53	51	166	230
	Nord orientale	16	36	58	28	50	109	109
	Sud-Isole	67	69	94(▲)	55(▲)	70(▲)	182	256
	<i>TOTALE</i>	<i>138</i>	<i>56</i>	<i>79(▲)</i>	<i>55(▲)</i>	<i>62(▲)</i>	<i>182</i>	<i>256</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	231	53	65(▲)	43(▲)	58(▲)	150(▲)	206
	Nord occidentale	281	48	68(▲)	52(▲)	57(▲)	185(▲)	252
	Nord orientale	254	56	66(▲)	44(▲)	58(▲)	150(▲)	203
	Sud-Isole	501	60	83(▲)	50(▲)	70(▲)	181(▲)	224
	<i>TOTALE</i>	<i>1267</i>	<i>55</i>	<i>73(▲)</i>	<i>49(▲)</i>	<i>61(▲)</i>	<i>170(▲)</i>	<i>230(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	65	63	57(▲)	29(▲)	50(▲)	115	136
	Nord occidentale	71	48	66(▲)	39(▲)	56(▲)	145	200
	Nord orientale	48	44	59(▲)	52(▲)	50(▲)	145	269
	Sud-Isole	89	56	71(▲)	43(▲)	58(▲)	150	201
	<i>TOTALE</i>	<i>273</i>	<i>53</i>	<i>64(▲)</i>	<i>41(▲)</i>	<i>56(▲)</i>	<i>139(▲)</i>	<i>200</i>
TOTALE	Centro	353	57	62(▲)	41(▲)	57(▲)	146(▲)	206
	Nord occidentale	409	48	67(▲)	49(▲)	56(▲)	165(▲)	230
	Nord orientale	338	53	63(▲)	43(▲)	56(▲)	146(▲)	203
	Sud-Isole	716	60	82(▲)	49(▲)	65(▲)	181(▲)	224
	<i>TOTALE</i>	<i>1816</i>	<i>55</i>	<i>71(▲)</i>	<i>47(▲)</i>	<i>58(▲)</i>	<i>166(▲)</i>	<i>224(▲)</i>

(\*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: n ≥ 30 per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); n ≥ 160 per P95 e n ≥ 800 per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.g.5(a)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "PESCE E FRUTTI DI MARE, CONSERVATI" per classi di età e area geografica: FEMMINE del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS <sup>(*)</sup>	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	5	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	5	3	6	0	13	13
	Nord orientale	4	7	11	2	23	23
	Sud-Isole	9	0	0	0	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>23</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>13</i>	<i>23</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	14	4	9	0	23	23
	Nord occidentale	23	5	9	0	23	30
	Nord orientale	17	2	6	0	23	23
	Sud-Isole	45	3 <sup>(▲)</sup>	5 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	14	17
	<i>TOTALE</i>	<i>99</i>	<i>4<sup>(▲)</sup></i>	<i>7<sup>(▲)</sup></i>	<i>0<sup>(▲)</sup></i>	<i>23</i>	<i>30</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	25	5	10	0	23	41
	Nord occidentale	29	2	5	0	12	22
	Nord orientale	25	7	13	0	40	41
	Sud-Isole	60	6 <sup>(▲)</sup>	13 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	23	73
	<i>TOTALE</i>	<i>139</i>	<i>5<sup>(▲)</sup></i>	<i>11<sup>(▲)</sup></i>	<i>0<sup>(▲)</sup></i>	<i>23</i>	<i>58</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	248	8 <sup>(▲)</sup>	15 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	38 <sup>(▲)</sup>	67
	Nord occidentale	320	6 <sup>(▲)</sup>	12 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	31 <sup>(▲)</sup>	50
	Nord orientale	237	7 <sup>(▲)</sup>	13 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	40 <sup>(▲)</sup>	51
	Sud-Isole	440	4 <sup>(▲)</sup>	10 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	26 <sup>(▲)</sup>	47
	<i>TOTALE</i>	<i>1245</i>	<i>6<sup>(▲)</sup></i>	<i>12<sup>(▲)</sup></i>	<i>0<sup>(▲)</sup></i>	<i>32<sup>(▲)</sup></i>	<i>58<sup>(▲)</sup></i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	64	7 <sup>(▲)</sup>	12 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	30	58
	Nord occidentale	96	3 <sup>(▲)</sup>	9 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	23	50
	Nord orientale	65	4 <sup>(▲)</sup>	10 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	27	48
	Sud-Isole	91	4 <sup>(▲)</sup>	9 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	20	54
	<i>TOTALE</i>	<i>316</i>	<i>4<sup>(▲)</sup></i>	<i>10<sup>(▲)</sup></i>	<i>0<sup>(▲)</sup></i>	<i>27<sup>(▲)</sup></i>	<i>48</i>
TOTALE	Centro	356	7 <sup>(▲)</sup>	14 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	37 <sup>(▲)</sup>	66
	Nord occidentale	473	5 <sup>(▲)</sup>	11 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	30 <sup>(▲)</sup>	50
	Nord orientale	348	6 <sup>(▲)</sup>	12 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	37 <sup>(▲)</sup>	51
	Sud-Isole	645	4 <sup>(▲)</sup>	10 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	23 <sup>(▲)</sup>	54
	<i>TOTALE</i>	<i>1822</i>	<i>5<sup>(▲)</sup></i>	<i>12<sup>(▲)</sup></i>	<i>0<sup>(▲)</sup></i>	<i>30<sup>(▲)</sup></i>	<i>54<sup>(▲)</sup></i>

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.g.5(b)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "PESCE E FRUTTI DI MARE, CONSERVATI" per classi di età e area geografica: MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS <sup>(*)</sup>	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	6	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	5	2	4	0	9	9
	Nord orientale	6	0	0	0	1	1
	Sud-Isole	12	6	14	0	44	44
	<i>TOTALE</i>	<i>29</i>	<i>3</i>	<i>9</i>	<i>0</i>	<i>27</i>	<i>44</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	15	1	3	0	14	14
	Nord occidentale	25	1	5	0	4	23
	Nord orientale	12	3	8	0	27	27
	Sud-Isole	42	4 <sup>(▲)</sup>	7 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	18	23
	<i>TOTALE</i>	<i>94</i>	<i>3<sup>(▲)</sup></i>	<i>6<sup>(▲)</sup></i>	<i>0<sup>(▲)</sup></i>	<i>18</i>	<i>27</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	20	3	6	0	19	19
	Nord occidentale	32	3 <sup>(▲)</sup>	9 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	30	37
	Nord orientale	19	6	16	0	62	62
	Sud-Isole	37	5 <sup>(▲)</sup>	9 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	27	44
	<i>TOTALE</i>	<i>108</i>	<i>4<sup>(▲)</sup></i>	<i>10<sup>(▲)</sup></i>	<i>0<sup>(▲)</sup></i>	<i>30</i>	<i>44</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	187	7 <sup>(▲)</sup>	15 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	35 <sup>(▲)</sup>	73
	Nord occidentale	271	7 <sup>(▲)</sup>	13 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	32 <sup>(▲)</sup>	63
	Nord orientale	213	8 <sup>(▲)</sup>	15 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	40 <sup>(▲)</sup>	62
	Sud-Isole	397	7 <sup>(▲)</sup>	13 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	33 <sup>(▲)</sup>	66
	<i>TOTALE</i>	<i>1068</i>	<i>7<sup>(▲)</sup></i>	<i>14<sup>(▲)</sup></i>	<i>0<sup>(▲)</sup></i>	<i>34<sup>(▲)</sup></i>	<i>66<sup>(▲)</sup></i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	39	8 <sup>(▲)</sup>	13 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	40	45
	Nord occidentale	51	4 <sup>(▲)</sup>	9 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	20	50
	Nord orientale	44	8 <sup>(▲)</sup>	12 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	30	40
	Sud-Isole	68	5 <sup>(▲)</sup>	12 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	36	52
	<i>TOTALE</i>	<i>202</i>	<i>6<sup>(▲)</sup></i>	<i>12<sup>(▲)</sup></i>	<i>0<sup>(▲)</sup></i>	<i>31<sup>(▲)</sup></i>	<i>45</i>
TOTALE	Centro	267	6 <sup>(▲)</sup>	14 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	33 <sup>(▲)</sup>	73
	Nord occidentale	384	6 <sup>(▲)</sup>	12 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	31 <sup>(▲)</sup>	60
	Nord orientale	294	7 <sup>(▲)</sup>	14 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	38 <sup>(▲)</sup>	62
	Sud-Isole	556	6 <sup>(▲)</sup>	12 <sup>(▲)</sup>	0 <sup>(▲)</sup>	32 <sup>(▲)</sup>	58
	<i>TOTALE</i>	<i>1501</i>	<i>6<sup>(▲)</sup></i>	<i>13<sup>(▲)</sup></i>	<i>0<sup>(▲)</sup></i>	<i>33<sup>(▲)</sup></i>	<i>62<sup>(▲)</sup></i>

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.g.5(c)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "PESCE E FRUTTI DI MARE, CONSERVATI" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	11	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	10	2	5	0	13	13
	Nord orientale	10	3	7	0	23	23
	Sud-Isole	21	3	11	0	27	44
	<i>TOTALE</i>	<i>52</i>	<i>2(▲)</i>	<i>8(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>23</i>	<i>44</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	29	3	7	0	23	23
	Nord occidentale	48	3(▲)	7(▲)	0(▲)	23	30
	Nord orientale	29	3	7	0	23	27
	Sud-Isole	87	3(▲)	6(▲)	0(▲)	17	23
	<i>TOTALE</i>	<i>193</i>	<i>3(▲)</i>	<i>6(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>19(▲)</i>	<i>27</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	45	4(▲)	8(▲)	0(▲)	19	41
	Nord occidentale	61	3(▲)	8(▲)	0(▲)	22	37
	Nord orientale	44	7(▲)	14(▲)	0(▲)	40	62
	Sud-Isole	97	6(▲)	12(▲)	0(▲)	23	73
	<i>TOTALE</i>	<i>247</i>	<i>5(▲)</i>	<i>11(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>27(▲)</i>	<i>58</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	435	7(▲)	15(▲)	0(▲)	38(▲)	73
	Nord occidentale	591	7(▲)	13(▲)	0(▲)	31(▲)	58
	Nord orientale	450	7(▲)	14(▲)	0(▲)	40(▲)	60
	Sud-Isole	837	6(▲)	12(▲)	0(▲)	30(▲)	58(▲)
	<i>TOTALE</i>	<i>2313</i>	<i>7(▲)</i>	<i>13(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>33(▲)</i>	<i>62(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	103	7(▲)	12(▲)	0(▲)	30	45
	Nord occidentale	147	3(▲)	9(▲)	0(▲)	21	50
	Nord orientale	109	6(▲)	11(▲)	0(▲)	30	40
	Sud-Isole	159	4(▲)	10(▲)	0(▲)	27	52
	<i>TOTALE</i>	<i>518</i>	<i>5(▲)</i>	<i>11(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>30(▲)</i>	<i>48</i>
TOTALE	Centro	623	7(▲)	14(▲)	0(▲)	35(▲)	67
	Nord occidentale	857	6(▲)	12(▲)	0(▲)	30(▲)	50(▲)
	Nord orientale	642	7(▲)	13(▲)	0(▲)	37(▲)	58
	Sud-Isole	1201	5(▲)	11(▲)	0(▲)	27(▲)	58(▲)
	<i>TOTALE</i>	<i>3323</i>	<i>6(▲)</i>	<i>12(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>30(▲)</i>	<i>58(▲)</i>

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.



**Tabella 1.A.g.6(a)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "PESCE E FRUTTI DI MARE, CONSERVATI" per classi di età e area geografica: FEMMINE dei soli consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% <sup>(*)</sup>	Media	DS <sup>(*)</sup>	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	1	20	13	--	--	--	--
	Nord orientale	2	50	13	13	13	23	23
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>3</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>9</i>	<i>13</i>	<i>23</i>	<i>23</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	4	29	16	11	20	23	23
	Nord occidentale	8	35	15	9	16	30	30
	Nord orientale	4	24	10	9	6	23	23
	Sud-Isole	15	33	9	5	7	17	17
	<i>TOTALE</i>	<i>31</i>	<i>31</i>	<i>11<sup>(*)</sup></i>	<i>8<sup>(*)</sup></i>	<i>8<sup>(*)</sup></i>	<i>23</i>	<i>30</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	9	36	14	12	10	41	41
	Nord occidentale	10	34	7	6	6	22	22
	Nord orientale	7	28	24	15	23	41	41
	Sud-Isole	21	35	16	18	10	58	73
	<i>TOTALE</i>	<i>47</i>	<i>34</i>	<i>15<sup>(*)</sup></i>	<i>15<sup>(*)</sup></i>	<i>10<sup>(*)</sup></i>	<i>41</i>	<i>73</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	84	34	22 <sup>(*)</sup>	18 <sup>(*)</sup>	17 <sup>(*)</sup>	62	83
	Nord occidentale	120	38	17 <sup>(*)</sup>	15 <sup>(*)</sup>	15 <sup>(*)</sup>	41	57
	Nord orientale	78	33	21 <sup>(*)</sup>	15 <sup>(*)</sup>	21 <sup>(*)</sup>	51	67
	Sud-Isole	132	30	15 <sup>(*)</sup>	13 <sup>(*)</sup>	10 <sup>(*)</sup>	42	58
	<i>TOTALE</i>	<i>414</i>	<i>33</i>	<i>18<sup>(*)</sup></i>	<i>15<sup>(*)</sup></i>	<i>14<sup>(*)</sup></i>	<i>50<sup>(*)</sup></i>	<i>67</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	22	34	19	13	18	30	58
	Nord occidentale	18	19	17	14	13	50	50
	Nord orientale	14	22	20	13	23	48	48
	Sud-Isole	24	26	15	12	13	36	54
	<i>TOTALE</i>	<i>78</i>	<i>25</i>	<i>17<sup>(*)</sup></i>	<i>13<sup>(*)</sup></i>	<i>17<sup>(*)</sup></i>	<i>48</i>	<i>58</i>
TOTALE	Centro	119	33	21 <sup>(*)</sup>	17 <sup>(*)</sup>	18 <sup>(*)</sup>	58	82
	Nord occidentale	157	33	16 <sup>(*)</sup>	14 <sup>(*)</sup>	14 <sup>(*)</sup>	41	57
	Nord orientale	105	30	21 <sup>(*)</sup>	14 <sup>(*)</sup>	23 <sup>(*)</sup>	48	60
	Sud-Isole	192	30	14 <sup>(*)</sup>	13 <sup>(*)</sup>	10 <sup>(*)</sup>	42 <sup>(*)</sup>	73
	<i>TOTALE</i>	<i>573</i>	<i>31</i>	<i>17<sup>(*)</sup></i>	<i>15<sup>(*)</sup></i>	<i>14<sup>(*)</sup></i>	<i>45<sup>(*)</sup></i>	<i>67</i>

(<sup>o</sup>) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (\*) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: n ≥ 30 per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); n ≥ 160 per P95 e n ≥ 800 per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.g.6(b)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "PESCE E FRUTTI DI MARE, CONSERVATI" per classi di età e area geografica: MASCHI dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% <sup>(*)</sup>	Media	DS <sup>(*)</sup>	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	1	20	9	--	--	--	--
	Nord orientale	1	17	1	--	--	--	--
	Sud-Isole	2	17	35	12	35	44	44
	<i>TOTALE</i>	4	14	20	19	18	44	44
Bambini (3-9 anni)	Centro	1	7	14	--	--	--	--
	Nord occidentale	3	12	9	12	4	23	23
	Nord orientale	2	17	19	11	19	27	27
	Sud-Isole	15	36	11	7	9	23	23
	<i>TOTALE</i>	21	22	11	8	11	23	27
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	5	25	12	7	14	19	19
	Nord occidentale	5	16	20	16	27	37	37
	Nord orientale	3	16	41	18	30	62	62
	Sud-Isole	16	43	13	10	9	44	44
	<i>TOTALE</i>	29	27	17	14	12	44	62
Adulti (18-64 anni)	Centro	64	34	21 <sup>(▲)</sup>	20 <sup>(▲)</sup>	14 <sup>(▲)</sup>	71	89
	Nord occidentale	100	37	20 <sup>(▲)</sup>	14 <sup>(▲)</sup>	18 <sup>(▲)</sup>	54	65
	Nord orientale	80	38	20 <sup>(▲)</sup>	18 <sup>(▲)</sup>	12 <sup>(▲)</sup>	55	89
	Sud-Isole	157	40	18 <sup>(▲)</sup>	15 <sup>(▲)</sup>	14 <sup>(▲)</sup>	54	73
	<i>TOTALE</i>	401	38	19 <sup>(▲)</sup>	17 <sup>(▲)</sup>	14 <sup>(▲)</sup>	58 <sup>(▲)</sup>	73
Anziani (65-97 anni)	Centro	14	36	21	15	24	45	45
	Nord occidentale	13	25	15	13	10	50	50
	Nord orientale	18	41	19	12	22	40	40
	Sud-Isole	15	22	22	15	19	52	52
	<i>TOTALE</i>	60	30	19 <sup>(▲)</sup>	13 <sup>(▲)</sup>	18 <sup>(▲)</sup>	45	52
TOTALE	Centro	84	31	20 <sup>(▲)</sup>	18 <sup>(▲)</sup>	14 <sup>(▲)</sup>	62	89
	Nord occidentale	122	32	19 <sup>(▲)</sup>	14 <sup>(▲)</sup>	18 <sup>(▲)</sup>	50	63
	Nord orientale	104	35	20 <sup>(▲)</sup>	17 <sup>(▲)</sup>	16 <sup>(▲)</sup>	53	83
	Sud-Isole	205	37	17 <sup>(▲)</sup>	15 <sup>(▲)</sup>	14 <sup>(▲)</sup>	47 <sup>(▲)</sup>	73
	<i>TOTALE</i>	515	34	19 <sup>(▲)</sup>	16 <sup>(▲)</sup>	14 <sup>(▲)</sup>	53 <sup>(▲)</sup>	73

(<sup>o</sup>) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato:  $n \geq 30$  per media, DS e mediana (Rizzi, 1992);  $n \geq 160$  per P95 e  $n \geq 800$  per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

**Tabella 1.A.g.6(c)** - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "PESCE E FRUTTI DI MARE, CONSERVATI" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI dei sol consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	%(*)	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	2	20	11	3	11	13	13
	Nord orientale	3	30	9	12	4	23	23
	Sud-Isole	2	10	35	12	35	44	44
	<i>TOTALE</i>	7	13	17	15	13	44	44
Bambini (3-9 anni)	Centro	5	17	15	9	18	23	23
	Nord occidentale	11	23	13	10	14	30	30
	Nord orientale	6	21	13	10	9	27	27
	Sud-Isole	30	34	10(▲)	6(▲)	8(▲)	19	23
	<i>TOTALE</i>	52	27	11(▲)	8(▲)	10(▲)	23	30
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	14	31	13	10	12	41	41
	Nord occidentale	15	25	11	12	6	37	37
	Nord orientale	10	23	29	17	28	62	62
	Sud-Isole	37	38	14(▲)	15(▲)	10(▲)	58	73
	<i>TOTALE</i>	76	31	16(▲)	15(▲)	10(▲)	44	73
Adulti (18-64 anni)	Centro	148	34	22(▲)	19(▲)	15(▲)	66	83
	Nord occidentale	220	37	18(▲)	15(▲)	17(▲)	41(▲)	63
	Nord orientale	158	35	21(▲)	17(▲)	18(▲)	51	83
	Sud-Isole	289	35	16(▲)	15(▲)	12(▲)	47(▲)	73
	<i>TOTALE</i>	815	35	19(▲)	16(▲)	14(▲)	53(▲)	73(▲)
Anziani (65-97 anni)	Centro	36	35	20(▲)	14(▲)	18(▲)	45	58
	Nord occidentale	31	21	16(▲)	13(▲)	12(▲)	50	50
	Nord orientale	32	29	19(▲)	12(▲)	23(▲)	40	48
	Sud-Isole	39	25	18(▲)	13(▲)	14(▲)	52	54
	<i>TOTALE</i>	138	27	18(▲)	13(▲)	17(▲)	45	54
TOTALE	Centro	203	33	21(▲)	18(▲)	17(▲)	58(▲)	82
	Nord occidentale	279	33	18(▲)	14(▲)	15(▲)	42(▲)	63
	Nord orientale	209	33	21(▲)	16(▲)	20(▲)	51(▲)	67
	Sud-Isole	397	33	16(▲)	14(▲)	12(▲)	45(▲)	73
	<i>TOTALE</i>	1088	33	18(▲)	15(▲)	14(▲)	50(▲)	73(▲)

(\*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(\*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: n ≥ 30 per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); n ≥ 160 per P95 e n ≥ 800 per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

