

<b>Carattere / Punteggio</b>	<b>Docilità</b>	<b>Sciamatura</b>	<b>Tenuta del favo</b>	<b>Ripresa primaverile</b>
<b>4</b>	Molto docili: si può lavorare senza fumo e maschera.	Nessun segno di sciamatura: non ci sono celle reali contenenti uova, larve o pupe.	Ottima: le api stanno attaccate al favo "stile pelliccia", anche quando il favo viene manipolato.	Ottima: la famiglia si sviluppa molto rapidamente ed è tra le prime a necessitare la posa del melario
<b>3</b>	Docili: con un po' di fumo si può lavorare senza ricevere punture.	Bassa tendenza: alcune celle reali con uova o larve presenti, ma la sciamatura non è imminente e può essere impedita distruggendo le celle reali e offrendo spazio.	Buona: le api sono in movimento ma non lasciano il favo durante la manipolazione.	Buona
<b>2</b>	Attaccano: singole api attaccano e pungono mentre si visita l'alveare, anche con abbondante uso di fumo	Forte tendenza alla sciamatura: costruzione ripetuta di celle reali e sintomi avanzati di preparazione alla sciamatura (riduzione della covata, dimagrimento della regina, scarsa costruzione dei fogli cerei).	Sufficiente: parte delle api lasciano i favi e si agglomerano ai lati dei favi e nei melari.	Sufficiente
<b>1</b>	Pungono: la colonia mostra una forte reazione difensiva durante la visita, o le api attaccano anche senza essere disturbate.	Sciamatura attiva: la colonia è sciamata o la sciamatura è stata impedita tramite interventi estesi (prelievo covata, formazione di un nucleo temporaneo etc).	Scarsa: le api lasciano i favi e i melari e si agglomerano dentro o fuori dall'arnia.	Scarsa